

Σημειώσεις Αμπελουργίας



Σ. Πετροπούλου Καραγιαννοπούλου

Γεωπόνος

Καθηγήτρια ΤΕΙ Πελοποννήσου

Καλαμάτα, 2016

Περιεχόμενα

Κεφάλαια	Σελ.
1 ^ο Ιστορική ανασκόπηση	3
2 ^ο Εξάπλωση της αμπελοκαλλιέργειας- Παραγωγή αμπελοκομικών προϊόντων	5
3 ^ο Θρεπτική αξία αμπελοκομικών προϊόντων-Οινοποίηση	27
4 ^ο Περιγραφή φυτού	37
5 ^ο Ο βιολογικός κύκλος του αμπελιού	56
6 ^ο Επιτραπέζιες ποικιλίες	62
7 ^ο Ελληνικές ποικιλίες οινοποίησης	85
8 ^ο Διεθνείς ποικιλίες οινοποίησης	109
9 ^ο Κορινθιακή Σταφίδα	124
10 ^ο Υποκείμενα αμπέλου	132
11 ^ο Εγκατάσταση αμπελώνων	144
12 ^ο Πολλαπλασιασμός αμπέλου	169
13 ^ο Κλάδεμα αμπέλου	194
14 ^ο Ζιζανιοκτονία-Κατεργασία εδάφους-Πότισμα	229
15 ^ο Θρέψη-Λίπανση του αμπελιού	250
16 ^ο Ωρίμανση – Συγκομιδή σταφυλιών	266
 Βιβλιογραφία	 287

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το αμπέλι είναι μία από τις αρχαιότερες καλλιέργειες. Η καταγωγή της αμπέλου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Απ' ό,τι δείχνουν τα διάφορα ευρήματα, το αμπέλι ευδοκίμούσε στην πολική ζώνη πριν από την εποχή των παγετώνων και κυρίως στην Ισλανδία, στη βόρεια Ευρώπη και στη βορειοδυτική Ασία. Οι παγετώνες όμως περιόρισαν την εξάπλωσή του, ωθώντας διάφορα είδη άγριων αμπέλων προς θερμότερες ζώνες, όπως στην κεντρική και ανατολική Ασία, στην κεντρική και νότια Ευρώπη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Καυκάσου. Εκεί γεννήθηκε το είδος "Άμπελος η Οινοφόρος", *Vitis vinifera*. Στην Ελλάδα πρέπει να εμφανίστηκε την 4η χιλιετία π.χ.

Οι επιστήμονες δέχονται ότι ο πολιτισμός αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος σταμάτησε να ζει νομαδική ζωή και καλλιέργησε τη γη. Επίσης θεωρούν ότι το πέρασμα από τη νομαδική ζωή στον πολιτισμό άρχισε όταν οι πρώτοι καλλιεργητές "δούλεψαν" το αμπέλι.

Η τέχνη της αμπελουργίας εικάζεται ότι ξεκίνησε με την αγροτική επανάσταση γύρω στο 5.000 π.χ. Από τους πρώτους γνωστούς καλλιεργητές θεωρούνται οι Άριοι (πρόγονοι των Περσών και των Ινδών που ζούσαν στην περιοχή Καυκάσου-Κασπίας), οι Σημιτικοί λαοί και οι Ασσύριοι. Το κρασί την εποχή εκείνη ήταν γνωστό ακόμη και στην αρχαία Κίνα. Κατόπιν οι τέχνες της αμπελουργίας και της οινοποιίας πέρασαν στους Αιγυπτίους, στους λαούς της Παλαιστίνης, της Φοινίκης και στους Έλληνες. Οι Έλληνες ανέπτυξαν ιδιαίτερα την οινοποιία, σχεδόν μονοπωλώντας την αγορά για αιώνες. Δεν είμαστε βέβαιοι από που διδάχτηκαν την τέχνη της οινοποιίας, σύμφωνα όμως με μια από τις επικρατέστερες θεωρίες, την έμαθαν από τους ανατολικούς λαούς (Φοίνικες ή Αιγυπτίους) με τους οποίους είχαν αναπτυγμένες εμπορικές σχέσεις. Το κρασί έπαιζε πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Η καθημερινή ζωή τους ήταν αναπόσπαστα δεμένη με αυτό. Έδιναν μεγάλη σημασία στο καλό κρασί και γι' αυτό το λόγο φρόντιζαν να υπάρχει πάντοτε στο σπίτι τους άφθονη ποσότητα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τα συμπόσιά τους τα οποία άλλωστε ήταν μια από τις αγαπημένες τους συνήθειες.


Η λέξη κρασί προέρχεται από τη λέξη κράσις= ανάμειξη. Η λέξη κράσις προέρχεται από το ρήμα κεράννυμι= αναμειγνύω και η λέξη κρατήρ σημαίνει το σκεύος στο οποίο γινόταν η ανάμειξη του κρασιού με το νερό.

Η αμπελοκαλλιέργεια έγινε γνωστή πολύ γρήγορα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται από πλήθος νομισμάτων που απεικονίζουν σταφύλια στη μια όψη και το Διόνυσο στην άλλη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



World vineyards = παγκόσμιοι αμπελώνες το 2000-2010 trends=τάση.




Αμπελοοινικές περιοχές της Ελλάδας το 2014 (1 εκτάριο = 10 στρεμ.)

1. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σύμφωνα με τη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (International Organisation of vine and wine: OIV), που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015, ο παγκόσμιος αμπελώνας (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα) το 2014 έφθασε συνολικά τα 7.550.000 εκτάρια (ένα εκτάριο ισοδυναμεί με 10 στρέμματα). Αν και αυτή η έκταση παραμένει σταθερή τα τελευταία έτη, υπάρχει μια προοδευτική μείωση των αμπελώνων της ευρωπαϊκής ηπείρου προς όφελος των αμπελώνων του τρίτου κόσμου (εικ. 2.2).

Επίσης, σύμφωνα με τον OIV, το 2014 η Ισπανία ήταν η πρώτη χώρα καλλιέργειας της αμπέλου (1.020.000 εκτάρια), η Κίνα η δεύτερη (με 799.000 εκτάρια) και η Γαλλία η τρίτη (792.000 εκτάρια). Σύμφωνα με τα στοιχεία του OIV, οι παγκόσμιες εκτάσεις με αμπελοκαλλιέργεια μειώθηκαν μεταξύ 1995 και 2013 κατά 4%. Η μόνη ήπειρος στην οποία κατεγράφη μείωση είναι η Ευρώπη (μείωση κατά 500.000 εκτάρια εκ των οποίων 269.000 εκριζώθηκαν με πριμοδότηση το διάστημα 2008-2011). Αντίθετα σε Ασία, Αμερική, Αφρική και Ωκεανία κατεγράφη μικρή αύξηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων) αν και η Ευρώπη μείωσε την επιφάνεια των αμπελώνων της, παρουσιάζει αύξηση της παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει αύξηση των μέσων αποδόσεων του ευρωπαϊκού αμπελώνα, μέσω των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης.

Στην παρακάτω εικόνα (εικ. 2.1) αντικατοπτρίζεται η εξάπλωση της καλλιέργειας της αμπέλου στον κόσμο. Όπως φαίνεται το αμπέλι καλλιεργείται στις μεσογειακές χώρες, στην Κίνα, στις Η.Π.Α., στις χώρες της Νοτίου Αμερικής και στην Ινδία.




Εικ. 2.1 Εξάπλωση της καλλιέργειας της αμπέλου στον κόσμο και κυριότερες χώρες παραγωγής σταφυλιών το έτος 2010. Πηγή: FAO (Country = χώρα, grape production= παραγωγή σταφυλιών)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες χώρες παραγωγής σταφυλιών το έτος 2013. Πρώτη παραγωγός χώρα είναι η Κίνα.

Πιν.2.1 Κυριότερες χώρες παραγωγής σταφυλιών το 2013 Πηγή:FAO


	χώρα	παραγωγή (σε τον.)
1	Κίνα	11.550,024
2	Ιταλία	8.010,364
3	Η.Π.Α.	7.744,997
4	Ισπανία	7.480,000
5	Γαλλία	5.518,371
6	Τουρκία	4.011,409
7	Χιλή	3.297,981
8	Αργεντινή	2.881,346
9	Ινδία	2.483,000
10	Ιράν	2.046,420

Η παρακάτω εικόνα (εικ.2.2) παρουσιάζει την εξέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας στις σπουδαιότερες αμπελουργικές χώρες το διάστημα 2000-2013. Διακρίνεται πτωτική τάση στις μεσογειακές χώρες και ανοδική τάση στην Κίνα. Στις ΗΠΑ η καλλιεργούμενη έκταση παρέμεινε σταθερή.




Εικ.2.2 Καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια (σε χιλιάδες εκτάρια) στις κυριότερες αμπελουργικές χώρες του κόσμου μεταξύ 2000-2013. (% of world total=ποσοστό συμμετοχής κάθε χώρας στην παγκόσμια καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια). Η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια "καθαρά" οινοποίησης το διάστημα αυτό ήταν περίπου 70 χιλιάδες εκτάρια. Διακρίνεται πτωτική τάση στις μεσογειακές χώρες και ανοδική τάση στην Κίνα.

Στο παρακάτω ιστόγραμμα (εικ.2.3) απεικονίζεται το ποσοστό συμμετοχής των σπουδαιότερων αμπελουργικών χωρών στην παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών το 2011.



Εικ.2.3 Ποσοστό συμμετοχής των σπουδαιότερων αμπελουργικών χωρών στην παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών το έτος 2011. Η παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών το 2011 ήταν 69.093.293 τόνοι.

Στην εικόνα 2.4 διακρίνονται οι παλιές και οι καινούργιες χώρες παραγωγής κρασιού.



Εικ.2.4 Με το μώβ χρώμα απεικονίζονται οι παλιές χώρες που παράγουν κρασί και με το κόκκινο οι καινούργιες. Στις καινούργιες συμπεριλαμβάνεται και η Κίνα, με το πράσινο χρώμα. Στο γράφημα κάτω αριστερά (με την πράσινη γραμμή) διακρίνεται η ανοδική τάση της Κίνας στην παραγωγή κρασιού. Επάνω αριστερά φαίνονται οι κυριότερες χώρες παραγωγής οίνου στον κόσμο το 2012. Πρώτη έρχεται η Γαλλία και ακολουθούν Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ και Κίνα. Στην Κίνα, το αμπέλι καλλιεργείται στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν σχεδόν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τις μεσογειακές χώρες και με τις αμπελουργικές περιοχές της Καλιφόρνιας.

Στον πίνακα 2.2 φαίνεται η παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών μεταξύ 2000-2012, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διεθνούς οργανισμού αμπέλου και οίνου.


Πιν.2.2 Παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών (σε εκατομμύρια εκατόκιλα). Πηγή :ΟΙV

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	M.O
648	611	615	631	681	674	670	655	674	682	688	714	691	664

OIV: International organization of vine and wine

Στο παρακάτω ιστόγραμμα φαίνεται η κατανομή της παραγωγής σταφυλιών στις πέντε ηπείρους.


Development of total grapes production



Εικ.2.5 Εξέλιξη της παραγωγής (σε εκατ. εκατόκιλα) σταφυλιών στις πέντε ηπείρους μεταξύ 2000-2012. Πρώτη σε παραγωγή είναι η Ευρώπη και ακολουθεί η Ασία, η Αμερική, η Αφρική και η Ωκεανία (Forecast=πρόβλεψη). Η παγκόσμια παραγωγή (που απεικονίζεται με την καφέ γραμμή) το ίδιο διάστημα παρουσιάζει μια ελαφρά αυξητική τάση. (1ql=quintal =100 κιλά).

Στο παρακάτω ιστόγραμμα παρουσιάζεται η "τάση" που επικράτησε στο μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων με αμπελώνες, στις σπουδαιότερες αμπελουργικές χώρες της Ασίας το διάστημα 2000-2012.

Asian vineyards




Source: OIV

Εικ.2.6

Εξέλιξη της καλλιεργούμενης έκτασης με αμπελίες στις κυριότερες αμπελουργικές χώρες της Ασίας τα έτη 2000-2012.

Στο παραπάνω ιστόγραμμα φαίνεται καθαρά ότι στην Κίνα μεταξύ 2000 και 2012 υπήρχε μια συνεχής αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με αμπέλια. Συγκεκριμένα μεταξύ 2000 και 2012 οι καλλιεργούμενη έκταση αυξήθηκε κατά 90%. Αντίθετα στο Ιράν και στην Τουρκία, το ίδιο διάστημα, η καλλιεργούμενη έκταση ελαττώθηκε κατά 18% και 10% αντίστοιχα.


Στο παρακάτω ιστόγραμμα (Εικ.2.7) φαίνονται τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης της παραγωγής σταφυλιών, στις σπουδαιότερες αμπελουργικές χώρες το έτος 2012 συγκριτικά με το 2000. Την μεγαλύτερη αύξηση την παρουσίασε η Κίνα, με ποσοστό αύξησης της παραγωγής πάνω από 200%, ακολουθούμενη από την Ινδία με ποσοστό 150% και από τη Χιλή με ποσοστό περίπου 70%. Αντίθετα, στις τρεις μεσογειακές χώρες, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, σημειώθηκε μείωση της παραγωγής. Αυτό αντικατοπτρίζει τη “μετατόπιση” της αμπελοκαλλιέργειας από τις ευρωπαϊκές χώρες στις ασιατικές χώρες.




Source: OIV

Εικ.2.7 Ποσοστά αύξησης (με θετικό πρόσημο) ή μείωσης (με αρνητικό πρόσημο) της παραγωγής σταφυλιών το 2012 συγκριτικά με το 2000 στις κυριότερες αμπελουργικές χώρες του κόσμου. Η παγκόσμια παραγωγή (world production) στο διάστημα αυτό, όπως φαίνεται, (με την καφέ γραμμή) αυξήθηκε ελαφρώς (περίπου 8%). (quintal = qf=100 κιλά).

Στην εικόνα 2.8 απεικονίζεται η εξέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας στις αμπελουργικές χώρες του Νοτίου ημισφαιρίου και στις ΗΠΑ το 2000-2012. Η μεγαλύτερη αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων μεταξύ 2012 και 2000, παρατηρήθηκε στη Νέα Ζηλανδία και ήταν της τάξης του 168%. Αντίθετα, στις περισσότερες μεσογειακές χώρες, το ίδιο διάστημα, παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με αμπέλια (εικ.2.9).



Εικ.2.8 Εξέλιξη της καλλιεργούμενης έκτασης με αμπέλια στο Νότιο ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων και των Η.Π.Α. τα έτη 2000-2012. Σε όλες τις χώρες τα έτη αυτά αυξήθηκε η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια, με εξαίρεση τις ΗΠΑ όπου παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση της τάξης του -1%. ha=εκτάριο=10στρ.Πηγή:OIV



Εικ.2.9 Εξέλιξη της καλλιεργούμενης έκτασης με αμπέλια στις κυριότερες αμπελουργικές χώρες της Ευρώπης τα έτη 2000-2010. Όπως φαίνεται, σε όλες τις παραπάνω χώρες ελαττώθηκε η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια, σε

ποσοστά από -3% στην Πορτογαλία, μέχρι -17% στην Ισπανία. Πηγή: ΟΙΥ

2. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η καλλιέργεια της αμπέλου αποτελεί μια από τις βασικότερες καλλιέργειες της χώρας μας και η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των αμπελουργικών προϊόντων είναι από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της αγροτικής παραγωγής. Μέχρι πριν τον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο, η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι έφτανε περίπου τα 3.000.000 στρέμματα. Λίγο μετά, η έκταση αυτή μειώθηκε σημαντικά. Σε πολλές περιοχές, τα αμερικάνικα υποκείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την αναμπέλωση μετά την εισβολή της φυλλοξήρας στην Ελλάδα, που έγινε περίπου στις αρχές του εικοστού αιώνα (1905), δεν ήταν επαρκώς κατάλληλα. Έτσι, τα αμπέλια έδιναν μικρές αποδόσεις με αποτέλεσμα πολλοί αμπελουργοί να εγκαταλείψουν την αμπελοκαλλιέργεια επειδή ήταν οικονομικά ασύμφορη. Αργότερα, με τον εμφύλιο πόλεμο και με την ανάπτυξη στις μεγάλες πόλεις της βιομηχανίας και τη μετανάστευση, ο ορεινός πληθυσμός εγκατέλειψε τα χωριά του και τα αμπέλια ξεριζώθηκαν. Έτσι, χάθηκαν ονομαστοί αμπελώνες όπως της Σιάτιστας στην Κεντρική Μακεδονία, της Μαρώνειας στη Θράκη, της Αράχωβας πλάι στους Δελφούς κ.ά.

Στον Πιν.2.3 φαίνεται η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) μεταξύ 2009-2013.

Πιν.2.3 Συνολική καλλιεργούμενη έκταση(σε χιλ.στρ.) με αμπέλια (οινοποίησης, επιτραπέζια, σταφιδάμπελα) στην Ελλάδα μεταξύ 2009-2013. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2009	1.226,2
2010	1.205,5
2011	1.156,2
2012	1.154,0
2013	1.135,4+

+: προσωρινά στοιχεία

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια συνεχή

μείωση από το 2009 μέχρι το 2013.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Γεωργίας (ΥΠΑΑΤ).

		Έκταση (στρ.)	Παραγωγή(τον.)
2008	Κορινθιακή σταφίδα	148.000	22.338
2008	Σουλτανίνα	213.725	24.004
2010	Επιτραπέζια σταφύλια	139.253	245.666

Πηγή: ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η μέση ετήσια παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών στην Ελλάδα τα έτη 2009, 2010 και 2011 έφτασε τους 300.000 τόνους .


Την τετραετία 2009,2010,2011,2012 η μέση ετήσια εξαχθείσα ποσότητα επιτραπέζιων σταφυλιών ήταν 73.000 τόνοι.

Η Γερμανία, η Αγγλία και η Ολλανδία αποτελούν τους κυριότερους προορισμούς των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών. Οι τρεις αυτές χώρες απορρόφησαν το 66% των σταφυλιών που εξήχθησαν από τη χώρα μας τα παραπάνω έτη. Στις αγορές αυτές ανταγωνίστριες χώρες είναι η Ιταλία και η Τουρκία.

Από τα εξαγώγιμα σταφύλια το 90% αποτελούν οι λευκές ποικιλίες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση ερυθρών ποικιλιών από τις αγορές του εξωτερικού.


3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στο παρακάτω ιστόγραμμα διακρίνονται οι σπουδαιότερες χώρες του κόσμου που παρήγαγαν κρασί το έτος 2010. Το μισό περίπου της παγκοσμίου παραγωγής παρήχθη από τις μεσογειακές χώρες Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.



Εικ.2.10 Ποσοστά συμμετοχής των σπουδαιότερων οινοπαραγωγικών χωρών στην παγκόσμια παραγωγή κρασιού το έτος 2010. Πρώτη παραγωγός χώρα είναι η Γαλλία, ακολουθούμενη από την Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ κλπ.

Στην εικ.2.11 φαίνεται η γεωγραφική εξάπλωση των οινοπαραγωγικών χωρών.



Εικ.2.11 Σπουδαιότερες χώρες παραγωγής κρασιού στον κόσμο το 2010 (με σκούρο χρώμα).


Στην Εικ.2.11 φαίνεται ότι στο βόρειο ημισφαίριο η άμπελος καλλιεργείται από 35° (που είναι η Κρήτη) μέχρι περίπου 54° γεωγραφικό πλάτος (στην Πολωνία) και στο νότιο ημισφαίριο μέχρι περίπου 34° γεωγραφικό πλάτος (νότια Αφρική). Στις τροπικές χώρες δεν μπορεί να καλλιεργηθεί το αμπέλι όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Στα ψυχρά κλίματα καλλιεργείται σε περιοχές προστατευόμενες από ψυχρά ρεύματα αέρα, κοντά σε υδάτινους όγκους, επικλινείς και υπήνεμες (εικ.2.12).



Εικ.2.12 Αμπελώνες στις όχθες του ποταμού Mosel στα σύνορα Γερμανίας, Γαλλίας και Λουξεμβούργου. Καλλιεργείται κυρίως η λευκή ποικιλία Riesling.

Στην Εικ.2.13 φαίνεται ότι κατά το διάστημα 2000-2012 παρατηρήθηκε μια κατά "μέσον όρο" ελαφρά πτωτική τάση της παγκόσμιας παραγωγής κρασιού.

Global wine production




Εικ.2.13 Εξέλιξη της παραγωγής κρασιού (σε εκατ. εκατόλιτρα) στις πέντε ηπείρους το διάστημα 2000-2012. Πρώτη σε παραγωγή είναι η Ευρώπη, ακολουθούμενη από την Αφρική, την Ωκεανία, την Ασία και την Αμερική. World wine production: Παγκόσμια παραγωγή κρασιού, Forecast: πρόβλεψη.

Η μέση ετήσια παγκόσμια παραγωγή κρασιού το διάστημα 2000-2012 ήταν 270 εκατ. εκατόλιτρα (Πιν.2.4).

Πιν.2.4 Παγκόσμια παραγωγή οίνου τα έτη 2000-2012 σε εκατ. εκατόλιτρα (Mhl) Πηγή:ΟΙV

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	M.O
280	265	257	264	296	278	283	268	269	272	264	267	252	270


Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια “μετατόπιση” της παραγωγής οίνου από την Ευρώπη στις υπόλοιπες ηπείρους. Δηλαδή με άλλα λόγια, μεταξύ 2000 και 2012 ελαττώθηκε η παραγωγή κρασιού στην Ευρώπη και αυξήθηκε στις άλλες τέσσερες ηπείρους. Αυτό είναι επακόλουθο βέβαια του ότι και η αμπελοκαλλιέργεια το διάστημα αυτό “μετατοπίστηκε” από την Ευρώπη στις υπόλοιπες ηπείρους.



Εικ. 2.14. Συμμετοχή των πέντε Ηπείρων στην παγκόσμια παραγωγή οίνου τα έτη 2000 και 2012. Το διάστημα αυτό ελαττώθηκε η παραγωγή της Ευρώπης και αυξήθηκε η παραγωγή όλων των υπολοίπων ηπείρων.State: κατάσταση.


Στην εικ.2.15 φαίνονται οι σπουδαιότερες χώρες κατανάλωσης κρασιού μεταξύ 2000-2012. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα και στην παραγωγή (εικ.2.10) και στην κατανάλωση κρασιού (εικ.2.15).

Major wine consumers



Εικ. 2.15. Σπουδαιότερες χώρες κατανάλωσης κρασιού στον κόσμο μεταξύ 2000-2012. Πρώτη είναι η Γαλλία, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία κλπ. Πηγή: ΟΙV

Στην εικ.2.16 φαίνονται τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης της κατανάλωσης κρασιού το 2012 συγκριτικά με το 2000 στις σπουδαιότερες καταναλωτικές χώρες κρασιού στον κόσμο. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρατηρήθηκε στη Ρωσία (και ήταν 120%) και το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης (-50%) παρατηρήθηκε στη Ρουμανία.



Εικ.2.16. Ποσοστά αύξησης (με θετικό πρόσημο) ή μείωσης (με αρνητικό πρόσημο) της κατανάλωσης κρασιού το 2012 συγκριτικά με το 2000 στις σπουδαιότερες καταναλωτικές χώρες κρασιού. Η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού, (world total= κόκκινη γραμμή) το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 10% περίπου. Πηγή: OIV

Από τους πιν.2.5 και 2.6 βλέπουμε ότι το 2012 πρώτη στην αξία των εξαγωγών οίνου είναι η Γαλλία ενώ η Ιταλία είναι πρώτη στην ποσότητα του εξαχθέντος οίνου.

Πιν.2.5. Αξία οίνου, σε ευρώ (€), που εξήχθηκε από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες οίνου στον κόσμο το 2012, bn=δισεκατομμύριο M=εκατομμύριο. Πηγή:OIV


Γαλλία	7,8 bn €
Ιταλία	4,7 bn €
Ισπανία	2,4 bn €
Αυστραλία	1,5 bn €
Χιλή	1,4 bn €

ΗΠΑ	1,1 bn €
Γερμανία	973 M €
Νέα Ζηλανδία	767 M €
Αργεντινή	711 M €
Πορτογαλία	707 M €
Νότιος Αφρική	566 M €

Πιν.2.6. Ποσότητα οίνου (σε εκατ. λίτρα) που εξήχθηκε από τις σπουδαιότερες εξαγωγικές χώρες οίνου στον κόσμο το 2012. Πηγή: ΟΙΥ.

Ιταλία	2.120
Ισπανία	1.947
Γαλλία	1.499
Χιλή	751
Αυστραλία	734
Νότιος Αφρική	413
ΗΠΑ	401
Γερμανία	396
Αργεντινή	365
Πορτογαλία	339
Νέα Ζηλανδία	176

Στην εικ.2.17 φαίνεται ότι το 2012 η μεγαλύτερη εισαγωγός οίνου (ως προς την αξία) ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (45,2%), ακολουθούμενη από τη βόρεια Αμερική (22,5%).



Εικ.2.17. Παγκόσμιες εισαγωγές οίνου το 2012 (σε αξία). Η Ε.Ε. απορρόφησε το μεγαλύτερο ποσοστό (45,2%) της αξίας των εισαγωγών, ακολουθούμενη από τη βόρειο Αμερική με 22,5% και την Ασία με 14,5%. Πηγή: ΟΙΒ

Σύμφωνα με τον ΟΙΒ, η παγκόσμια παραγωγή κρασιού το 2014 έφθασε τα 271 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Από την ποσότητα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρήχθησαν 164,3 εκατ. εκατόλιτρα. Πρώτη ήταν η Γαλλία (46,7 εκατ. εκατόλιτρα), δεύτερη η Ιταλία (44,7 εκατ. εκατόλιτρα) και τρίτη η Ισπανία (41,6 εκατ. εκατόλιτρα). Το ίδιο έτος στην Κίνα παρήχθησαν 11,2 εκατ. εκατόλιτρα (κατατασσόμενη στην όγδοη θέση παγκοσμίως).

Το 2014, η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού ανήλθε σε 240 εκατ. εκατόλιτρα. Η μισή από αυτήν την ποσότητα καταναλώθηκε σε πέντε χώρες. Συγκεκριμένα, πρώτη σε κατανάλωση ήταν οι ΗΠΑ με κατανάλωση το 13% (της παγκοσμίου κατανάλωσης), δεύτερη η Γαλλία με 12%, τρίτη η Ιταλία με 9%, τέταρτη η Γερμανία με 8% και πέμπτη η Κίνα με 7%. Ο ΟΙΒ σημειώνει ότι από το 2000 η κατανάλωση κρασιού έχει μειωθεί, ιδιαίτερα στις παραδοσιακές χώρες κατανάλωσης, προς όφελος των καταναλωτών των νέων χωρών.

Το έτος 2013 διακινήθηκαν στην παγκόσμια αγορά 104 εκατ. εκατόλιτρα οίνου. Η πρώτη εξαγωγός χώρα, όσον αφορά την ποσότητα ήταν η Ισπανία, εξάγοντας 22,6 εκατ. εκατόλιτρα, ενώ πρώτη εξαγωγός χώρα, όσον αφορά την αξία ήταν η Γαλλία εξάγοντας κρασί αξίας 7,7 δις ευρώ.

Δηλαδή το έτος 2013 η Ισπανία παίρνει την πρώτη θέση στις χώρες εξαγωγής όσον αφορά την ποσότητα (22,6 εκατ. εκατόλιτρα), ενώ η Γαλλία παίρνει την πρώτη θέση στις χώρες εξαγωγής όσον αφορά την αξία (7,7 δις ευρώ). Ο ΟΙΝ σημειώνει ότι οι πέντε πρώτες χώρες εξαγωγής (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Χιλή και Αυστραλία) αντιπροσωπεύουν το 70% του όγκου και της αξίας του εξαγόμενου κρασιού στον κόσμο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 2013 η Γερμανία παραμένει στην πρώτη θέση (15,2 εκατ. εκατόλιτρα), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (13,4 εκατ. εκατόλιτρα), τις ΗΠΑ (10,7 εκατ. εκατόλιτρα), τη Γαλλία (6,5 εκατ. εκατόλιτρα) και τη Ρωσία (4,7 εκατ. εκατόλιτρα).

4. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το κρασί από πάντα τύχαινε μεγάλης εκτίμησης σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Το αμπέλι για παραγωγή κρασιού καλλιεργήθηκε παντού, όπου το κλίμα το επέτρεπε πλάι σε άλλες καλλιέργειες συμπληρώνοντας την οικιακή οικονομία, ενώ υπήρξαν και περιοχές όπου αποτελούσε το κύριο εισόδημα. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κάθε οικογένεια είχε το αμπελάκι της. Τα κρασοστάφυλα μπορούν να καλλιεργηθούν σε ξηρά και φτωχά εδάφη γι' αυτό και επεκτάθηκε η καλλιέργειά τους σ' όλη την Ελλάδα. Η συρρίκνωση, όμως, τα τελευταία χρόνια της αγροτικής τάξης έφερε και την μείωση των καλλιεργούμενων με αμπέλι εκτάσεων. Αυτό παρατηρήθηκε κυρίως στα ορεινά και άγονα μέρη, τα πρώτα που εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους τους.



Εικ. 2.18 Ελληνικός αμπελώνας κρασοστάφυλων.

Το κρασί που παράγεται διαφοροποιείται από τον τόπο (κλιματολογικές συνθήκες), την ποικιλία και το έδαφος. Παρακάτω δίνεται μια γενική εικόνα των καλλιεργούμενων εκτάσεων με αμπέλια και της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα το έτος 2013 σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ.

	Έκταση (σε εκτάρια)	Παραγωγή οίνου (σε εκατόλιτρα)
Πελοπόννησος	60.419	1.525.590
Κρήτη	50.581	959.480
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια	28.849	1.988.790
Μακεδονία και Θράκη	15.500	514.760
Θεσσαλία	8.696	423.910
Νησιά Ιονίου Πελάγους	8.716	215.840
Νησιά Αιγαίου Πελάγους	9.131	151.300
Δωδεκάνησα	3.438	128.850
Ήπειρος	1.022	30.620

Μερικές από τις σπουδαιότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες ανά αμπελουργική περιοχή είναι οι παρακάτω:

Πελοπόννησος: Αγιωργίτικο, Κορινθιακή σταφίδα, Μοσχάτο λευκό, Μοσχοφίλερο, Ρεφόσκο, Ροδίτης, Σουλτανίνα.

Κρήτη: Βηλάννα, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μαντηλαριά, Ρωμέικο.

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: Σαββατιανό.

Μακεδονία & Θράκη: Ασύρτικο, Αθήρι, Ροδίτης, Λημνιό, Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.

Θεσσαλία: Κρασάτο, Μαύρο Μεσενικόλα, Μοσχάτο Αμβούργου, Μπατίκι, Ξινόμαυρο, Σταυρωτό.

Νησιά Ιονίου Πελάγους: Βερτζαμί, Μαυροδάφνη, Μοσχάτο λευκό, Ρομπόλα.

Νησιά Αιγαίου Πελάγους: Αϊδάνι, Ασύρτικο, Λημνιό, Μαντηλαριά, Μονεμβασία, Μοσχάτο Αλεξανδρείας.

Δωδεκάνησα: Αθήρι, Μαντηλαριά, Μοσχάτο λευκό.

Ήπειρος: Ντεμπίνα, Cabernet Sauvignon

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΙΥ των ετών 2012-13, σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα μας κατατάσσεται στη δωδέκατη θέση από άποψη όγκου παραγωγής κρασιού. Προηγούνται η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Χιλή, η Ν. Αφρική, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Πιν.2.7. Παραγωγή κρασιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση-28 (σε χιλ. εκατόλιτρα) Πηγή: FAS

Europe Offices

	2011/12	2012/13	2013/14
Ιταλία	43.072	40.057	44.900
Ισπανία	33.397	31.123	44.600
Γαλλία	50.890	40.609	44.100
Γερμανία	9.258	9.000	8.500

Πορτογαλία	5.609	6.140	6.740
Ρουμανία	4.700	4.100	5.400
Ελλάδα	2.750	3.150	3.700
Ουγγαρία	2.822	2.243	2.450
Αυστρία	2.814	2.155	2.252
Άλλες EU-28χώρες	3.214	2.558	4.911
EU-28	158.527	141.135	167.553

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες χώρες παραγωγής κρασιού στην Ε.Ε.

5. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



Σταφίδα ονομάζεται το αποξηραμένο σταφύλι. Η σταφίδα διακρίνεται σε δύο είδη, τη μαύρη και την άσπρη. Η μαύρη προέρχεται από την Κορινθιακή σταφίδα και η άσπρη από τη Σουλτανίνα.

Η Κορινθιακή σταφίδα, καλλιεργείται στον ελλαδικό χώρο από τους Ομηρικούς χρόνους ενώ γραπτές αναφορές για το εμπόριό της υπάρχουν από τον 12^ο αιώνα. Στα τέλη του 19^{ου} αιώνα οι εξαγωγές σταφίδας αποτελούσαν έως και το 75% του συνόλου των ελληνικών

εξαγωγών, γεγονός που συνέβαλε τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, στην ανασυγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, στη δημιουργία των πρώτων βιομηχανικών πυρήνων καθώς και στον αστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας την ίδια περίοδο. Η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής μαύρης Κορινθιακής σταφίδας. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής Κορινθιακής σταφίδας στην Ελλάδα αποξηραίνεται και ένα μικρό ποσοστό οδηγείται στην οινοποίηση.

Η Σουλτανίνα καλλιεργείται κυρίως στην Κρήτη από το 1922 και ως καλλιεργούμενη ποικιλία είναι τριπλής χρήσης, δηλαδή μπορεί να διατεθεί ως νωπό προϊόν (επιτραπέζιο σταφύλι), να αποξηρανθεί ή να οδηγηθεί στην οινοποίηση.

Σε οικογενειακό επίπεδο στη χώρα μας αποξηραίνονται και άλλες ποικιλίες, όπως το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, το Φωκιανό κλπ.

Στον πιν.2.8 φαίνεται ότι πρώτον οι ΗΠΑ και δεύτερον η Τουρκία, αποτελούν τους μεγαλύτερους παραγωγούς σταφίδας.

Πιν.2.8 Οι σπουδαιότερες χώρες παραγωγής σταφίδων το 2014 (σε τον.)

	χώρα	παραγωγή (σε τον.)
1	ΗΠΑ	320.000
2	Τουρκία	310.000
3	Κίνα	180.000
4	Ιράν	160.000
5	Χιλή	65.500
6	Νότιος Αφρική	50.000
7	Αφγανιστάν	36.000
8	Αργεντινή	33.000
9	Ουζμπεκιστάν	20.000
10	Μεξικό	10.000
11	Αυστραλία	10.000
12	ΕU-27	10.000

Οι περιοχές με την πιο σημαντική καλλιέργεια σταφίδας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορικής περιόδου 2010 του ΥΠΑΑΤ, έχουν ως ακολούθως:

Κορινθιακή σταφίδα		Σταφίδα Σουλτανίνα	
	Καλλιεργηθείσα έκταση (στρ.)		Καλλιεργηθείσα έκταση (στρ.)
Αχαΐα	44.887	Ηράκλειο	115.420
Κορινθία	39.178	Ρέθυμνο	3.760
Μεσσηνία	25.161		
Ηλεία	24.896		
Ζάκυνθος	14.397		
ΣΥΝΟΛΟ	148.519		119.180

Σύμφωνα με το ΥΠΠΑΤ η καλλιεργούμενη έκταση με κορινθιακή σταφίδα το 2010-2011 ήταν 146.500 στρ. και η παραγωγή 22.000 τόν. Την ίδια εμπορική περίοδο η καλλιεργούμενη έκταση με Σουλτανίνα ήταν 150.000 στρ. και η παραγωγή 3.000 τόν.

Το 2012 εξήχθησαν 18.574.567 κιλά Κορινθιακής σταφίδας (γνωστή και ως μαύρη σταφίδα) από την Ελλάδα, συνολικής αξίας 41.922.883 ευρώ. Κύριες χώρες προορισμού ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστραλία, η Γερμανία και η Τουρκία. Το ίδιο έτος εξήχθησαν από την Ελλάδα 10.014.264 κιλά σταφίδα Σουλτανίνα (γνωστή και ως λευκή σταφίδα) συνολικής αξίας 15.520.070 ευρώ. Κύριες χώρες προορισμού ήταν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Σουηδία, η Δανία και η Αυστρία.

Στην Ε.Ε. καταναλώνονται ετησίως περίπου 250.000-280.000 τόνοι σταφίδας (Κορινθιακή και Σουλτανίνα). Η Ε.Ε. αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των ελληνικών σταφίδων (κυρίως της Κορινθιακής). Η συνολική ζήτηση της Ε.Ε. καλύπτεται με εισαγωγές από τρίτες χώρες, κυρίως από Τουρκία, ΗΠΑ, Ιράν, Ν. Αφρική και Χιλή. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της ελληνικής Κορινθιακής σταφίδας διακινείται κυρίως στη Μ. Βρετανία, όπου χρησιμοποιείται στην παρασκευή μπισκότων, κέικ και άλλων προϊόντων ζαχαροπλαστικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Φύτεψε κλήμα να φάνε τα παιδιά σου(Του Λαού).

Το αμπέλι είναι στα αλήθεια ευλογημένο, μετρήστε πόσα προϊόντα παίρνουμε και φτιάχνουμε από αυτό: Αμπελόφυλλα, αμπελοβλάσταρα, σταφύλια, σταφίδες, μούστο, πετιμέζι, κρασί, ξύδι, τσίπουρο, κονιάκ μέχρι και καθαρό οινόπνευμα. Μέχρι και τα κλαδιά που κλαδεύουμε τα χρησιμοποιούμε για το αρνί που ψένουμε ή για προσάναμμα. Να μην αναφερθώ στο λάδι που περιέχουν τα κουκούτσια των σταφυλιών, που έχουν όπως κυρίως τα κόκκινα σταφύλια αντικαρκινικές και αντιοξειδωτικές ικανότητες.



Αφαίρεση οινολάσπης από δεξαμενές ζύμωσης κρασιού

1. ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Θρεπτική αξία σταφυλιού

Το σταφύλι αποτελεί ένα από τα αγαπημένα φρούτα, τόσο λόγω της δροσιστικής και ιδιαίτερης γεύσης του, όσο και λόγω της υψηλής θρεπτικής του αξίας.



Για το σταφύλι, τον καρπό του αμπελιού, υπάρχουν αναφορές από τα έπη του Ομήρου και δεν είναι τυχαίο ότι κατείχε δεσπόζουσα θέση στα συμπόσια των αρχαίων. Σε πληθώρα μελετών έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύτιμα συστατικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Συγκεκριμένα το σταφύλι είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, καθώς και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και συγχρόνως είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο (Ca), φώσφορο (P), κάλιο (K), και σίδηρο (Fe). Το αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 16 στοιχεία που είναι απαραίτητα στον ανθρώπινο οργανισμό, τα 12 πιο βασικά περιέχονται στα σταφύλια (κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, νάτριο κ.ά.). Επίσης το σταφύλι λόγω του καλίου που περιέχει σε μεγάλες ποσότητες αυξάνει τη διούρηση και καταπολεμά την κατακράτηση των υγρών.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που αναδεικνύουν την προστατευτική δράση του σταφυλιού και των παραγώγων του ενάντια σε ορισμένες μορφές καρκίνου, λόγω των αντιοξειδωτικών ουσιών της ομάδας των φλαβονοειδών που περιέχουν και φαίνεται να συντελούν στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου (του στήθους, του εντέρου, του δέρματος, του ήπατος). Μάλιστα έχει βρεθεί ότι τα λιπαρά οξέα που

περιέχονται στο κουκούτσι του σταφυλιού, μειώνουν τη χοληστερίνη και βοηθούν στην πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων.

Το σταφύλι αποτελεί καλή πηγή φυτικών ινών που συντελούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις δυσπεψίας, δυσκοιλιότητας και αιμορροΐδων.

Συνιστάται το σταφύλι να καταναλώνεται με τη φλούδα και τα κουκούτσια για να προσλαμβάνονται όλα τα θρεπτικά συστατικά του.

Επίσης, το σταφύλι κατέχει ξεχωριστή θέση και στην κοσμετολογία, οι αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες του προστατεύουν το κολλαγόνο και την ελαστίνη των ιστών, βοηθώντας στη διατήρηση της νεότητας και κατατάσσοντας το σταφύλι ανάμεσα στα πιο αποτελεσματικά συστατικά ενάντια στη γήρανση.

Παράλληλα, λόγω των αποτοξινωτικών του ιδιοτήτων δίνει λάμψη στο δέρμα και βοηθάει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. Στη σύγχρονη κοσμετολογία, εκτός από τα πολύτιμα συστατικά του, χρησιμοποιούνται και τα έλαια του κουκουτσιού του ως έλαια βάσης, λόγω της υψηλής πτητικότητάς τους.

Θρεπτική αξία του κρασιού

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το **κρασί** και κυρίως το κόκκινο, έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στην υγεία όταν πίνεται σε καθημερινή βάση με το φαγητό και με μέτρο. Συγκεκριμένα, βελτιώνει τη λειτουργία του στομάχου και την πέψη, εμποδίζει τη δημιουργία χολόλιθων, διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος στους ιστούς, δρα ως αντιφλεγμονώδες και αντισηπτικό, αυξάνει την αντίσταση στα κοινά κρυολογήματα και βοηθά στον ύπνο.

Επίσης, δρα προστατευτικά και προληπτικά ενάντια στη στεφανιαία νόσο αλλά και σε πολλές μορφές καρκίνου. Αυτό οφείλεται στα φλαβονοειδή που περιέχονται στις τανίνες του κόκκινου κρασιού, οι οποίες ενεργούν αντιοξειδωτικώς, προστατεύοντας τα κύτταρα. Η μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος μπορεί να εμποδίζει ή να καθυστερήσει την ανάπτυξη ασθενειών εκφυλιστικών του εγκεφάλου, όπως άρκινσον και αλτσχάιμερ.

Το σταφύλι έχει πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων τη ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη είναι ένα συστατικό που βρίσκεται σε ορισμένα φυτά όπως στα μούρα, στα φύλλα ελάτης και πεύκου, στα μύρτιλλα και στους ξηρούς καρπούς. Τα φυτά παράγουν


ρεσβερατρόλη, κυρίως για να καταπολεμήσουν τα βακτήρια και τους μύκητες, με άλλα λόγια δηλαδή είναι ένα φυσικό αντιβιοτικό. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο, η κατανάλωση κρασιού μειώνει τον κίνδυνο πεπτικών ελκών επειδή απαλλάσσει τον οργανισμό από τα βακτηρίδια που τα προκαλούν. Η ρεσβερατρόλη προστατεύει επίσης τα φυτά από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η περισσότερη από τη ρεσβερατρόλη στα σταφύλια βρίσκεται στους σπόρους και στη φλούδα. Το κόκκινο κρασί περιέχει ρεσβερατρόλη περισσότερο από το λευκό κρασί, γιατί ζυμώνεται με τους φλοιούς των σταφυλιών, σε αντίθεση με το λευκό κρασί που δε ζυμώνεται με τους φλοιούς. Η ουσία αυτή, όπως έχουν αποδείξει διάφορες έρευνες, μειώνει τη συγκολλητική ικανότητα των αιμοπεταλίων, πράγμα που βοηθά στο να κρατηθούν τα αιμοφόρα αγγεία ανοικτά και εύκαμπτα. Αυτό συντελεί στο να διατηρείται μια καλή παροχή αίματος προς τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας και να προστατεύεται η όραση. Επιπλέον, σαν αντιοξειδωτική ουσία, έχει αντιγηραντικές ιδιότητες.

Ενώ η κατανάλωση κρασιού φαίνεται να είναι καλή για την υγεία, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, προβλήματα ψυχικής υγείας, μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμίες, εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση, λιπώδες ήπαρ, αλκοολική ηπατίτιδα, κίρρωση, διάφορες μορφές καρκίνου, παγκρεατίτιδα καθώς και πολλές άλλες χρόνιες νόσους.

Θρεπτική αξία των σταφίδων

Η θετική δράση από την κατανάλωση **σταφίδων** στην υγεία μας, έγκειται στο γεγονός ότι περιέχουν πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, φυτικές ίνες, κάλιο, σελήνιο, βιταμίνη Α, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σίδηρο.

Οι αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και προστατεύουν τα κύτταρα από τις διαδικασίες της οξείδωσης που οδηγούν στη γήρανση και τελικά στο θάνατο.



Περιεκτικότητα της σταφίδας σε ουσίες με αντιοξειδωτική δράση.

Οι φυτικές ίνες που υπάρχουν στις σταφίδες, βελτιώνουν τη λειτουργία του εντέρου καταπολεμώντας τη δυσκοιλιότητα. Επίσης, βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του εντέρου.

Ο σίδηρος που περιέχουν, βοηθά στην αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας.

Το κάλιο που περιέχουν, είναι ένα μέταλλο το οποίο ρυθμίζει τα επίπεδα νατρίου στον οργανισμό με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που αποτελούν και αυτές συστατικά των σταφίδων, είναι σημαντικές για πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, όπως για το μεταβολισμό, την παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη βελτίωση της μνήμης.

Η βιταμίνη Α, είναι σημαντική για την όραση, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή.

Το σελήνιο, είναι ένα ιχνοστοιχείο το οποίο ο οργανισμός μας το χρειάζεται σε μικρές ποσότητες. Αυτό όταν εισέλθει στον οργανισμό συνδέεται με τις πρωτεΐνες και σχηματίζει τις σεληνιοπρωτεΐνες, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτική δράση και προστατεύουν από

καρκίνο και καρδιαγγειακές παθήσεις, ρυθμίζουν τη λειτουργία του θυρεοειδή αδένος και συμβάλλουν στην άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι σταφίδες έχουν και αντιμικροβιακές ιδιότητες, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη τερηδόνας, ουλίτιδας και οδοντικής πλάκας.

2. ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι, κ' η κοπελιά θέλει φιλή πρωί και μεσημέρι.

Η οινοποίηση είναι τέχνη και επιστήμη μαζί και έχει πολλές παραμέτρους, ενώ κάθε περιοχή, κάθε ποικιλία σταφυλιού και κάθε είδος οίνου έχει τις δικές του διαφορετικές απαιτήσεις.

Μούστος ή γλεύκος λέγεται ο χυμός του σταφυλιού, ο οποίος με τη ζύμωση μετατρέπεται σε οίνο. **Στέμφυλα** λέγονται οι πατημένες ρώγες των σταφυλιών, αφού φύγει ο μούστος. **Σταφυλοπολτός** λέγεται ο μούστος μαζί με τα στέμφυλα.

Οι ρώγες του σταφυλιού περιέχουν σάκχαρα, κυρίως γλυκόζη και φρουκτόζη, τα οποία, με την αλκοολική ζύμωση μετατρέπονται σε οινόπνευμα. Η αλκοολική ζύμωση προκαλείται από τις ζύμες (ζυμομύκητες), μονοκύτταρους οργανισμούς, που βρίσκονται στο φλοιό του σταφυλιού και έχουν πλέον περάσει στο χυμό. Οι πιο αποδοτικοί μύκητες ανήκουν στο γένος *Saccharomyces*. Για την παραγωγή ερυθρού ή ροζέ οίνου τα σταφύλια είναι συνήθως ερυθρά, ενώ για τους λευκούς οίνους, τα σταφύλια μπορεί να είναι λευκά ή και ερυθρά. Σημαντική, για την παρασκευή κρασιού, είναι η περιεκτικότητα του σταφυλιού σε σάκχαρα και οξέα, η οποία εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία, το έδαφος, τις κλιματικές συνθήκες, αλλά και από τη χρονική στιγμή του τρύγου, δηλαδή την ωρίμανση του σταφυλιού. Όσο πιο ελεγχόμενης ποιότητας είναι ένα κρασί σύμφωνα με το νόμο, τόσο πιο αυστηρά είναι τα κριτήρια επιλογής του αμπελιού. Στους "Οίνους Ποιότητας Παραγόμενους σε Καθορισμένη Περιοχή" (γνωστούς ως V.Q.P.R.D. από τα αρχικά **V**in de **Q**ualité **P**roduit Dans Une **R**égion **D**éterminée), καθορίζονται αυστηρά η ποικιλία, η τοποθεσία, η καλλιεργητική τεχνική, ακόμη και η στρεμματική απόδοση του αμπελιού, ενώ οι απλοί "Επιτραπέζιοι Οίνοι" δεν υπόκεινται σε τέτοιους νομικούς περιορισμούς.

Γλευκοποίηση

Μετά τον τρύγο τα σταφύλια πρέπει να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση στο "πατητήρι", όπου θα εξαχθεί από τις ρώγες ο χυμός ή αλλιώς γλεύκος ή αλλιώς μούστος . Η έκθλιψη

των σταφυλιών και η παραλαβή του μούστου συνήθως γίνεται με διάφορα μηχανήματα, που συνθλίβουν το σταφύλι ανάμεσα σε περιστρεφόμενους κυλίνδρους. Στη συνέχεια, πριν την αλκοολική ζύμωση, ο μούστος υφίσταται συνήθως τη διαδικασία της "απολάσπωσης" κατά την οποία αφαιρούνται όλα τα αιωρούμενα σωματίδια και έτσι ο μούστος καθίσταται διαυγής.

Ζύμωση

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το οινόπνευμα που περιέχει το κρασί παράγεται από τα σάκχαρα του μούστου, γλυκόζη και φρουκτόζη, τα οποία μετατρέπονται σε οινόπνευμα με την αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης, που επιτελείται από τις ζύμες. Οι ζύμες αυτές ήδη υπάρχουν πριν τον τρύγο αδρανοποιημένες στο φλοιό των σταφυλιών και "ενεργοποιούνται" όταν έρχονται σε επαφή με το μούστο. Αν προηγουμένως έχει βρέξει, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν γίνει η συγκομιδή. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να αναπτυχθούν ξανά στο φλοιό των σταφυλιών οι ζυμομύκητες που είναι απαραίτητοι για την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης. Οι ζύμες πολλαπλασιάζονται μέσα στο μούστο και επιτελούν τη ζύμωση, κατά την οποία, εκτός από οινόπνευμα ή αλλιώς αιθυλική αλκοόλη, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και θερμότητα. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της ζύμωσης ο μούστος είναι ζεστός και "κοχλάζει" επειδή δημιουργούνται φυσαλίδες. Η θερμότητα ελέγχεται συνεχώς ώστε να παραμένει στα "εκάστοτε" επιθυμητά επίπεδα έτσι ώστε και οι ζύμες να "εργάζονται" απρόσκοπτα και αποτελεσματικά αλλά και να παραμένουν τα αρώματα στο κρασί. Η συνοπτική χημική αντίδραση που περιγράφει την αλκοολική ζύμωση είναι:

Ζάχαρα → ζυμομύκητες → οινόπνευμα + CO₂ + θερμότητα ή

C₆H₁₂O₆ → ζυμομύκητες → 2CH₃CH₂OH + 2CO₂ + θερμότητα (33kcal)

Η παραπάνω αντίδραση δεν εξηγεί πλήρως το φαινόμενο της ζύμωσης, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά δευτερογενή προϊόντα που παράγονται όπως η γλυκερίνη, το οξικό οξύ, η ακεταλδεύδη, ανώτερες αλκοόλες, εστέρες κ.ά.

Η διάρκεια της ζύμωσης δεν είναι απόλυτη διότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από την αρχική συγκέντρωση των σακχάρων του μούστου, τη θερμοκρασία της ζύμωσης, το οξυγόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι ζύμες, το "είδος" του κρασιού που επιδιώκουμε να παρασκευάσουμε κλπ. Γενικά, όταν είναι παρατεταμένη η ζύμωση το κρασί

“παίρνει” περισσότερα “αρώματα ζύμωσης”. Γι’ αυτό, ιδίως στα λευκά κρασιά, πολλοί οινοποιοί διατηρούν με τεχνητά μέσα χαμηλή τη θερμοκρασία ζύμωσης (περίπου 15-20° Κελσίου), μειώνοντας έτσι την ταχύτητά της.

Στα κόκκινα κρασιά συχνά η ζύμωση γίνεται σε δύο φάσεις, μια πρώτη, στη διάρκεια της οποίας μέσα στο μούστο βρίσκονται και τα στέμφυλα και μια δεύτερη, μετά την αφαίρεση των στέμφυλων. Με την επαφή του χυμού με το φλοιό των σταφυλιών εκχυλίζονται οι χρωστικές και έτσι ο μούστος (και στη συνέχεια το κρασί) αποκτά το “εκάστοτε” επιθυμητό χρώμα, ρυθμίζοντας ανάλογα το χρόνο της εκχύλισης. Για τα ερυθρά κρασιά ο χρόνος εκχύλισης είναι συνήθως μερικές ημέρες, ενώ για τα ροζέ είναι συνήθως μικρότερος. Μόλις ο χυμός αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γευστικό χαρακτήρα, απομακρύνεται από τους φλοιούς και μεταφέρεται σε άλλη δεξαμενή. Εδώ ολοκληρώνεται η αλκοολική ζύμωση και εκδηλώνεται μία δεύτερη, η μηλογαλακτική. Αυτή προκαλείται από τα βακτήρια του κρασιού, σε αντίθεση με την πρώτη που πραγματοποιείται από τις ζύμες. Είναι δε τόσο σημαντική για την εξέλιξη των ερυθρών κρασιών ώστε αν δεν εκδηλωθεί από μόνη της, προκαλείται τεχνητά. Σ’ αυτήν τη ζύμωση το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό, μια αλλαγή που “μαλακώνει” το κρασί, μειώνει δηλαδή τον “άγουρο” χαρακτήρα του και έτσι το κρασί γίνεται ποιοτικά ανώτερο.

Για την παρασκευή γλυκών κρασιών η ζύμωση συνήθως διακόπτεται πριν την ολοκλήρωσή της με διάφορους τρόπους όπως με θέρμανση (38-40° Κελσίου), ή με ψύξη (6-7° Κελσίου), ή με προσθήκη μικρής ποσότητας καθαρού οινοπνεύματος ή με διάφορους άλλους τρόπους, έτσι ώστε ένα ποσοστό των σακχάρων να μένει αδιάσπαστο.

Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, όταν δηλαδή το σύνολο των σακχάρων έχει μετατραπεί σε αλκοόλη, το κρασί μεταγγίζεται στις δεξαμενές αποθήκευσης. Εκεί, με την πάροδο του χρόνου, το κρασί θα “ωριμάσει” έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Στην πλειοψηφία του κρασιού που αγοράζουμε, οι **αλκοολικοί βαθμοί** είναι περίπου 12,7°. Αλκοολικός βαθμός σημαίνει η κατ’ όγκο περιεκτικότητα ενός ποτού σε αλκοόλη σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου. Συμβολίζεται σε % vol, ή και με τους βαθμούς θερμομέτρου π.χ. 12,7% vol ή 12,7° που σημαίνει ότι στα 100 λίτρα ποτού περιέχονται 12,7 λίτρα αλκοόλης.

Ο αλκοολικός βαθμός φέρεται υποχρεωτικά με εμφανή ένδειξη σε όλα τα διακινούμενα στο εμπόριο αλκοολούχα ποτά.


Οι 12,7 αλκοολικοί βαθμοί (12,7°) αντιστοιχούν σε 12,2 **βαθμούς Baumé**. Οι βαθμοί Baumé (Βέ) είναι δείκτης της ποσότητας των σακχάρων που υπάρχουν στο μούστο και μετρώνται με ένα όργανο που ονομάζεται γραδόμετρο ή μουστόμετρο. Μετά την έναρξη της ζύμωσης ο δείκτης Βέ, μας δείχνει τα σάκχαρα που υπάρχουν ανά πάσα στιγμή στον οίνο και επομένως μας δείχνει την πορεία της ζύμωσης.

3. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Τσίπουρο και **τσικουδιά** είναι οι ονομασίες δύο ελληνικών αποσταγμάτων στεμφύλων που το πρώτο παράγεται στην ηπειρωτική Ελλάδα από αρκετές ποικιλίες σταφυλιών, συνήθως με την προσθήκη αρωματικών φυτών (όπως γλυκάνισο, μάραθο, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο και μαστίχα), ενώ το δεύτερο παράγεται στο νησί της Κρήτης χωρίς αρωματικά φυτά.

Η πρώτη ύλη για την παρασκευή του τσίπουρου αποτελείται από τους φλοιούς των σταφυλιών, κουκούτσια, κοτσάνια (δηλαδή από τα στέμφυλα τα οποία μάλιστα πρέπει να μην έχουν αποστραγγιστεί εντελώς) , κάποιο ποσοστό αζύμωτου γλεύκους (μούστου), γλεύκος σε ζύμωση, πλήρως ζυμωμένο γλεύκος (κρασί), οινολάσπη, απόρρακα από προηγούμενες αποστάξεις και όταν τα στέμφυλα είναι στεγνά προστίθεται ένα ποσοστό 25-30% (v/v) οίνου ή νερού. Όλα τα παραπάνω μεταφέρονται σε χάλκινα καζάνια, γνωστά ως άμβυκες. Οι άμβυκες στη συνέχεια κλείνονται κατάλληλα, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διαρροή ατμού και στη συνέχεια θερμαίνονται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του άμβυκα ανέβει, το υλικό του άμβυκα αρχίζει να βράζει. Οι υδρατμοί περνάνε από ένα συμπυκνωτή όπου ψύχονται και στη συνέχεια το υγρό απόσταγμα συλλέγεται σε δοχεία. Το πρώτο απόσταγμα, που αποτελεί τη λεγόμενη "κεφαλή", πολλές φορές απομακρύνεται ως ακατάλληλο. Κατόπιν αποστάζει ένα καθαρό απόσταγμα 86% vol που ονομάζεται "καρδιά". Στην ηπειρωτική Ελλάδα, για την παραγωγή τσίπουρου, η καρδιά λαμβάνεται μέχρι τα 45,5% vol, ενώ η "ουρά" παραλαμβάνεται μέχρι τα 32% vol οπότε σταματά η απόσταξη. Η καρδιά της πρώτης απόσταξης πολλές φορές οδηγείται πάλι στον άμβυκα για μια δεύτερη απόσταξη. Οι ουρές, συνήθως γνωστές και ως απόρρακα, πολλές φορές χρησιμοποιούνται σε μια επόμενη απόσταξη, μαζί με τη νέα παρτίδα των στεμφύλων.

Πολλές φορές, το προϊόν που λαμβάνεται από την πρώτη απόσταξη καταναλώνεται χωρίς να υποστεί δεύτερη απόσταξη. Άλλες φορές το τσίπουρο αποστάζεται και δεύτερη φορά.



Το **ούζο** είναι ένα αλκοολούχο ποτό που παράγεται και καταναλώνεται ευρέως στην Ελλάδα. Στη γεύση μοιάζει με το τσίπουρο, έχει όμως διαφορετικό τρόπο παρασκευής.


Για την παρασκευή ούζου, στον άμβυκα τοποθετούνται: αλκοόλη 96 – 100% vol που προέρχεται από γεωργικά προϊόντα, νερό, και αρωματικά συστατικά που μπορεί να είναι: γλυκάνισος, μάραθος, άνιθος, μαστίχα, κανέλλα, κορίανδρος, μέντα, πιπερόριζα, κάρδαμο, ρίζα αγγελικής, γαρύφαλλο, φλαμούρι, κ.α. Το υγρό αυτό μείγμα θερμαίνεται και στη συνέχεια οι υδρατμοί ψύχονται, υγροποιούνται και το υγρό απόσταγμα συλλέγεται σε κατάλληλα δοχεία. Το απόσταγμα αυτό είναι αρωματισμένο και έχει υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς που πολλές φορές πλησιάζουν τους 80. Το απόσταγμα στην αρχή της απόσταξης (κεφαλή) και στο τέλος (ουρά) συνήθως απομακρύνεται για να αποφευχθούν βαριά αρωματικά συστατικά. Αυτές οι ποσότητες αποστάγματος συνήθως αναμιγνύονται και αποστάζονται ξανά. Το προϊόν αυτής της δεύτερης απόσταξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός ούζου διαφορετικής ποιότητας.

Τα αιθέρια έλαια του γλυκάνισου, του μάραθου, ή και άλλων αρωματικών συστατικών, στα οποία οφείλει το ούζο το άρωμά του, είναι ευδιάλυτα στο υψηλόβαθμο σκέτο ούζο. Όμως, όταν στο ούζο προστεθεί νερό, ο βαθμός διαλυτότητάς τους ελαττώνεται, τα αιθέρια έλαια γίνονται αδιάλυτα και δίνουν το γνωστό λευκό θόλωμα που κάνει το ούζο να μοιάζει με γάλα.

Πριν την εμφιάλωσή του το ούζο, όπως και το κρασί, υφίσταται τη διαδικασία της διαύγασης, με διήθηση μέσω φίλτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ



root system=Ριζικό σύστημα, trunk= κορμός, sucker=λαίμαργος, fruit branch=καρποφόρος βλαστός, vine shoot=βλαστός αμπέλου

ΓΕΝΙΚΑ

Το αμπέλι, ή κλήμα (*Vitis vinifera*) είναι αγγειόσπερμο φυτό, ανήκει στην τάξη των Ραμνωδών (Rhamnales) και στην οικογένεια των Αμπελοειδών (Vitaceae), με πολλές ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως στις εύκρατες περιοχές της γης. Η οικογένεια των αμπελοειδών περιλαμβάνει αναρριχώμενα ποώδη ή ξυλώδη φυτά που φέρουν έλικες σε μερικούς κόμβους. Οι ταξιανθίες και οι έλικες εκφύονται απέναντι από τα φύλλα (εικ.4.1, 4.4).

Η οικογένεια Vitaceae έχει 16 γένη και περίπου 770 είδη. Μόνο όμως το γένος *Vitis* ενδιαφέρει την αμπελουργία. Σε αυτό υπάγονται τα δύο υπογένη, το υπογένος *Euvitis* και το υπογένος *Muscandinia*. Στο υπογένος *Euvitis* ανήκει η άμπελος η οиноφόρος (*Vitis vinifera*), δηλαδή το ευρωπαϊκό αμπέλι, καθώς και διάφορα αυτόχθονα είδη της βορείου Αμερικής, μεταξύ των οποίων τα είδη *V.berlandieri*, *V.rupestris* και *V.riparia*. Τα είδη αυτά έχουν αξία κυρίως για την αντοχή τους στις προσβολές της φυλλοξήρας, των νηματωδών, του περονόσπορου και του ωιδίου, καθώς και στον ιό του μολυσματικού εκφυλισμού. Στο υπογένος *Muscandinia* περιλαμβάνονται τα είδη *V.rotundifolia*, *V.munsoniana* και *V.rorenoei*. Το πρώτο είδος είναι γνωστό για την αντοχή του στους νηματώδεις.

Το αμπέλι καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό του, το σταφύλι, ενώ και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται στη μαγειρική (ντολμάδες). Τα σταφύλια μπορούν να καταναλωθούν ως έχουν, δηλαδή ως επιτραπέζια φρούτα ή να χρησιμοποιηθούν για διάφορα γλυκίσματα (γλυκό του κουταλιού, πετιμέζι κ.λπ.) ή για την παρασκευή σταφίδων, κρασιού ή και άλλων οينوπνευματωδών ποτών όπως τσίπουρο, οινόπνευμα κ.λπ.

Το αμπέλι, το οποίο ονομάζεται πολλές φορές πρέμνο, ή αλλιώς κούρβουλο ή και κλήμα, δεν είναι ούτε θάμνος, ούτε δέντρο. Είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις και αρκετούς βραχίονες και βλαστάρια. Ο φλοιός των ξυλωδών τμημάτων του βγαίνει σε λωρίδες και αποχωρίζεται. Οι βλαστοί στην πορεία του χρόνου, δηλαδή προς το τέλος της βλαστικής περιόδου, γίνονται ξυλώδεις και ονομάζονται βέργες, κληματόβέργες ή κληματίδες. Ο πολλαπλασιασμός των κλημάτων, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο του πολλαπλασιασμού, γίνεται με τις κληματόβέργες και με δύο τρόπους, πρώτον με τη ριζοβολία μοσχευμάτων δηλαδή ως αυτόρριζο ή δεύτερον με εμβολιασμό. Στην περίπτωση του μοσχεύματος λαμβάνεται κληματόβεργα από κλήμα μέσης ηλικίας η οποία τοποθετείται στο έδαφος, όπου και

ριζοβολεί. Η θερμοκρασία που είναι ευνοϊκή για τη ριζοβόληση των μοσχευμάτων είναι από 23-29 βαθμούς Κελσίου.

Υπάρχουν πολλές **ποικιλίες** αμπελιών που βασικά διακρίνονται σε ποικιλίες που είναι κατάλληλες για παραγωγή κρασιού, γνωστές ως ποικιλίες οινοποίησης ή αλλιώς κρασοστάφυλα, σε αυτές που προορίζονται για παραγωγή σταφυλιών για επιτραπέζια χρήση, γνωστές ως επιτραπέζιες ποικιλίες, σε αυτές που είναι κατάλληλες για παραγωγή σταφίδας και τέλος ποικιλίες που προορίζονται για παραγωγή χυμών, κοκτέιλ και κονσερβών.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

Η **ρίζα** είναι το υπόγειο μέρος του φυτού της αμπέλου το οποίο στηρίζει το φυτό στο έδαφος και συντελεί στην απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων. Στη ρίζα αποθηκεύονται οι διάφορες ουσίες που σχηματίζονται στο υπέργειο μέρος και χρησιμοποιούνται κυρίως για την έκπτυξη της νέας βλάστησης την άνοιξη. Επίσης, τα ριζικά τριχίδια στο αμπέλι παράγουν την ορμόνη κυτοκίνη. Η ορμόνη αυτή κατευθύνεται από τη ρίζα προς το υπέργειο τμήμα το φυτού και επηρεάζει αρκετές διαδικασίες αύξησης του φυτού, επειδή προκαλεί κινητοποίηση των θρεπτικών ουσιών, όπως την ανάπτυξη των παραγωγικών οργάνων και των σταφυλιών.

Η ρίζα του φυτού της αμπέλου διεισδύει βαθιά στη γη, που μπορεί να ξεπεράσει το ένα μέτρο βάθος, προκειμένου να "βρεί" υγρασία. Έχει αρκετές διακλαδώσεις στα πλάγια. Οι βαθιές ρίζες κάνουν το φυτό να αντέχει όχι μόνο στην καλοκαιρινή ξηρασία αλλά και στις παγωνιές του χειμώνα, γιατί το "κρύο" δε "φτάνει" στα βαθιά στρώματα. Το αμπέλι τρέφεται κυρίως από τις πολύ ψιλές ριζούλες οι οποίες απορροφούν τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία τα οποία είναι διαλυμένα στο νερό. Το καλοκαίρι, που υπάρχει έλλειψη εδαφικής υγρασίας, το αμπέλι αναπτύσσει πάρα πολλά ριζικά τριχίδια, πάρα πολύ μικρής διαμέτρου, (σα μαλλί) τα οποία "σκαρφαλώνουν" προς την επιφάνεια του εδάφους προκειμένου να απορροφήσουν τις ελάχιστες ποσότητες εδαφικής υγρασίας. Τα ριζικά αυτά τριχίδια έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωση του φυτού της αμπέλου, γι' αυτό δεν πρέπει κατά τους θερινούς μήνες να καλλιεργείται το έδαφος του αμπελώννα όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. Το χειμώνα τα ριζικά αυτά τριχίδια ατροφούν και καταστρέφονται.

Αν και το βάθος του ριζικού συστήματος της αμπέλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από τη φύση του εδάφους, από την περιεκτικότητά του σε υγρασία, από το είδος του υποκειμένου κ.λπ., το αμπέλι κατά κανόνα αναπτύσσει το ριζικό του σύστημα σε ένα βάθος 0,20-0,80 εκατοστά. Πάντως, κατά κανόνα, το αμπέλι διαθέτει βαθύ ριζικό σύστημα και δεν επηρεάζεται η απόδοσή του από το επιφανειακό έδαφος. Είναι μάλιστα μάλλον επιθυμητό σε έναν αμπελώνα το επιφανειακό έδαφος να είναι ελαφρύ-αμμουδερό ώστε και λιγότερα ζιζάνια να βγαίνουν αλλά και να γίνεται ευκολότερα η κατεργασία του.

Ο **κορμός** είναι το υπέργειο μέρος του φυτού το οποίο φέρει τους βραχίονες, τις κληματίδες (οι οποίες αποτελούν ξυλοποιημένους βλαστούς) και τους βλαστούς. Οι βλαστοί φέρουν τους οφθαλμούς, τις έλικες, τα φύλλα και εάν είναι καρποφόροι και τα σταφύλια. Ο κορμός είναι η εξέλιξη του βλαστού που φυτεύτηκε αρχικά για να δημιουργηθεί το φυτό. Στην αρχή ο βλαστός αυτός είναι αδύναμος και λεπτός και έχει ανάγκη στήριξης, στην πορεία όμως ξυλοποιείται και λειτουργεί ο ίδιος σα στήριγμα του αμπελιού με τα μπράτσα και τις κληματίδες που έχει πάνω του. Ανάλογα με την τεχνική του κλαδέματος που εφαρμόζουμε κατά την καλλιέργεια, μπορεί να φτάσει περισσότερο και από δυόμισι μέτρα ύψος, όπως γίνεται για παράδειγμα στις κρεβατίνες. Όσο υψηλότερος είναι ο κορμός, τόσο περισσότερο το φυτό έχει ανάγκη από τροφή και νερό, προκειμένου να έχει την απαιτούμενη πίεση χυμού.

Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, προς το τέλος της περιόδου βλάστησης ο βλαστός ξυλοποιείται και ονομάζεται κληματίδα. Κατά μήκος του βλαστού υπάρχουν τα γόνατα ή αλλιώς κόμποι και τα μεσογονάτια ή αλλιώς μεσοκόμπια διαστήματα. Στα γόνατα εκφύονται τα φύλλα, οι έλικες και οι ταξιανθίες. Μερικές φορές τα μεσογονάτια διαστήματα φέρουν χαρακτηριστικά τριχίδια ανάλογα με το είδος και την ποικιλία. Τα μεσογονάτια διαστήματα της βάσης του βλαστού έχουν πολύ μικρό μήκος. Στη συνέχεια, το μήκος τους αυξάνεται μέχρι ενός σημείου και στη συνέχεια το μήκος τους πάλι μειώνεται. Το μήκος των μεσογονατίων διαστημάτων εξαρτάται κυρίως από τη ζωηρότητα της ποικιλίας, από τη γονιμότητα του εδάφους, από τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία κλπ.

Τα **φύλλα** του αμπελιού είναι μεγάλα, μονοκόματα ή παλαμοειδή με 3-5 λοβούς ακέραιους ή οδοντωτούς. Αποτελούνται από το μίσχο και το έλασμα και ευρίσκονται εναλλάξ πάνω στο βλαστό. Είναι όργανα ζωτικής σημασίας γιατί σε αυτά σχηματίζονται οι περισσότερες ουσίες και τα συστατικά του γλεύκους. Κάθε ποικιλία έχει "χαρακτηριστικά"

φύλλα, πράγμα που βοηθά στην αναγνώριση μεταξύ τους των διαφόρων ποικιλιών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η μορφολογία των φύλλων (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, στιλπνότητα επιφάνειας, αριθμός λοβών κ.λπ.) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται από την Επιστήμη της **Αμπελογραφίας**. Σκοπός της συγκεκριμένης επιστήμης είναι η διάκριση των ειδών και των ποικιλιών της αμπέλου, μέσω της περιγραφής των διαφόρων οργάνων τους. Αυτό βοηθά κυρίως τους βελτιωτές, οι οποίοι, μέσω ελεγχόμενων διασταυρώσεων, δημιουργούν καινούργιες ποικιλίες και υποκείμενα.

Τα φύλλα του αμπελιού τα οποία είναι ηλικίας 2-5 μηνών, είναι τα πιο πολύτιμα για τη θρέψη του διότι τα φύλλα αυτά φωτοσυνθέτουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Τα φύλλα τα οποία είναι ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών καταναλώνουν περισσότερες τροφές από όσες φτιάχνουν (μέσω της φωτοσύνθεσης) και τα φύλλα που είναι μεγαλύτερα των 5 μηνών χάνουν σιγά σιγά τη σπαργή τους με συνέπεια να φωτοσυνθέτουν με όλο και μικρότερη ένταση.

Οι **έλικες** ή αλλιώς **τυλιχτήρια**, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, είναι όργανα στήριξης και αναρρίχησης του φυτού. Εμφανίζονται στους κόμβους, απέναντι από τα φύλλα. Οι έλικες, όταν συναντήσουν ένα λεπτό υποστήριγμα, τυλίγονται γύρω του και τραβούν κοντά τους όλο το βλαστό. Έτσι ο βλαστός στερεώνεται. Η μορφολογία των ελίκων, εάν είναι δηλαδή μονοσχιδείς, δισχιδείς (εικ.4.1), κ.λπ., και γενικά η όλη μορφολογία τους καθώς και η θέση τους στα γόνατα, μας βοηθά να διακρίνουμε αναμεταξύ τους τα διάφορα είδη και τις διάφορες ποικιλίες. Π.χ. ένα από τα αμπελογραφικά γνωρίσματα της ευρωπαϊκής αμπέλου είναι ότι δεν υπάρχουν ποτέ έλικες σε περισσότερα από δύο συνεχή γόνατα.



Εικ.4.1 Δισχιδεΐς έλικες



Εικ.4.2 Έλικας αμπέλου. Το χειμώνα οι έλικες ξυλοποιούνται.

Οι **οφθαλμοί** ευρίσκονται πάνω στους κόμβους, στις μασχάλες των φύλλων. Στους νεαρούς βλαστούς, οι οποίοι αρχίζουν να εκπύσσονται την άνοιξη, σε κάθε γόνατο υπάρχει ένας σχετικά ογκώδης οφθαλμός. Ο οφθαλμός αυτός λέγεται **χειμέριος** ή **λανθάνων** γιατί θα παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση όλο τον επόμενο χειμώνα και θα εκπτυχθεί την επόμενη βλαστική περίοδο, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα εμφανιστεί τη μια βλαστική περίοδο (π.χ. τη βλαστική περίοδο του έτους 2015) και θα εκπτυχθεί την επόμενη βλαστική περίοδο (δηλαδή την άνοιξη του 2016). Από τα κάτω συνήθως γόνατα του βλαστού αυτού (που θα προκύψει από το χειμέριο οφθαλμό) εκπύσσονται πολλές φορές την ίδια βλαστική περίοδο ένας ή και περισσότεροι οφθαλμοί (ένας από κάθε γόνατο), οι γνωστοί **ταχυφυείς οφθαλμοί**. Ο βλαστός που προέρχεται από τον ταχυφυή οφθαλμό λέγεται ταχυφυής βλαστός ή αλλιώς μεσοκάρδιος. Ο μεσοκάρδιος βλαστός φέρει και αυτός στα γόνατά του (όπως ο κύριος βλαστός από τον οποίο προήλθε) λανθάνοντες (ή αλλιώς χειμέριους) οφθαλμούς. Στις περισσότερες ποικιλίες, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα σε κάθε ποικιλία ξεχωριστά, οι μεσοκάρδιοι αυτοί βλαστοί φέρουν σταφύλια. Δηλαδή οι μεσοκάρδιοι βλαστοί φέρουν σταφύλια μέσα στην ίδια βλαστική περίοδο που εκπύσσονται. Τα σταφύλια των ταχυφυών ή αλλιώς μεσοκάρδιων βλαστών λέγονται **κουδούνια** ή **καμπανάρια** και δίνουν κατά κάποιο τρόπο μια δεύτερη σοδειά. Μερικές φορές η σοδειά αυτή είναι επιθυμητή μερικές όχι ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, την ποικιλία, το είδος του κρασιού που πρόκειται να φτιάξουμε κ.ά. όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο των ποικιλιών. Οι ταχυφυείς βλαστοί, συγκριτικά με τους κύριους βλαστούς (από τους οποίους προήλθαν) έχουν τα κάτω μεσογονάτια διαστήματα μεγαλύτερα. Επίσης, δε φέρουν οφθαλμούς στη βάση τους, δηλαδή δε φέρουν φυλλίτες και τσίμπλα (όπως αναλύεται εκτενέστερα παρακάτω). Εάν ένας ταχυφυής οφθαλμός δεν εκπτυχθεί την ίδια χρονιά του σχηματισμού του, τότε ατροφεί και καταστρέφεται.


Χρονικά, πρώτα σχηματίζεται ο ταχυφυής οφθαλμός και μετά ο λανθάνων. Κατά το σχηματισμό του ταχυφυούς οφθαλμού το πρώτο του φύλλο είναι περιορισμένης ανάπτυξης. Στο κάτω κάτω μέρος αυτού του πρώτου φύλλου σχηματίζεται σιγά σιγά ο λανθάνων οφθαλμός. Ο λανθάνων οφθαλμός έχει καλύτερη σύνδεση (και κατά συνέπεια τρέφεται καλύτερα) με τον κεντρικό αγωγό ιστό συγκριτικά με τον ταχυφυή οφθαλμό.

Ο λανθάνων ή χειμέριος οφθαλμός είναι σύνθετος. Δηλαδή, μέσα στον οφθαλμό αυτό

ευρίσκονται συνήθως τρείς βλαστικοί άξονες, δηλαδή, ένας κύριος βλαστικός άξονας και στη βάση του, αριστερά και δεξιά, δύο μικρότεροι βλαστικοί άξονες οι οποίοι ονομάζονται άξονες αντικαταστάσεως (εικ.4.3-4.8). Εξωτερικά δηλαδή φαίνεται ένας οφθαλμός, (ο οποίος μάλιστα καλύπτεται από "λέπια" τα οποία τον προστατεύουν από τις χαμηλές θερμοκρασίες, από μηχανικές βλάβες κλπ.) και μέσα σε αυτό τον οφθαλμό υπάρχουν σε "σμίκρυνση" ή αλλιώς σε "εμβρυώδη μορφή" οι βλαστοί (που ονομάζονται βλαστικοί άξονες) που θα προκύψουν από την έκπτυξη του οφθαλμού αυτού. Συνήθως δεν εκπτύσσονται όλοι οι βλαστικοί άξονες όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Δηλαδή, εάν κάνουμε μια τομή κατά μήκος ενός χειμέριου οφθαλμού, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, και τον κοιτάξουμε στο στερεοσκόπιο, θα διαπιστώσουμε ότι αποτελείται από έναν κύριο βλαστικό άξονα ο οποίος φέρει δίπλα του, στο κάτω μέρος, ένα δεύτερο και στο άλλο μέρος έναν τρίτο βλαστικό άξονα. Με άλλα λόγια, μέσα στο χειμέριο ή λανθάνοντα οφθαλμό περικλείονται καταβολές τριών βλαστών, μαζί με τους έλικες, τα φύλλα τους και με τα σταφύλια τους, εάν είναι καρποφόροι. Σε περίπτωση καταστροφής του κύριου βλαστικού άξονα (από χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο της χειμερινής ανάπαυσης, μηχανικά αίτια κ.λπ.), ενεργοποιείται αυτόματα μηχανισμός αντικατάστασης αυτού από τα διπλανά μάτια που δεν καταστράφηκαν. Δηλαδή εάν δεν εκπτυχθεί ο κύριος βλαστικός άξονας, αυτόματα εκπτύσσεται ο πρώτος ή και ο δεύτερος αντικαταστάτης. Γι' αυτό λέγονται και αντικαταστάτες. Ο κύριος βλαστικός άξονας μπορεί να καταστραφεί και κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, όταν πραγματοποιείται η διαφοροποίηση των βλαστικών αξόνων (οι οποίοι βλαστικοί άξονες θα εκπτυχθούν την επόμενη άνοιξη) εξαιτίας πολλών αιτιών όπως λόγω υπερβολικής ζηρότητας, υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης και άρδευσης και εξαιτίας μειωμένης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του φυλλώματος λόγω σκίασης ή άλλων αιτιών. Οι αντικαταστάτες φέρουν λιγότερα σταφύλια από τον κύριο βλαστικό άξονα και μερικές φορές δε φέρουν καθόλου σταφύλια. Συνήθως, κατά τη βλάστηση του λανθάνοντα οφθαλμού βλαστάνει μόνο ο κεντρικός βλαστικός άξονας ο οποίος είναι ο περισσότερο ανεπτυγμένος και ο οποίος έχει σχεδόν πάντα περισσότερα σταφύλια, (εάν ο οφθαλμός είναι καρποφόρος) από τους άξονες αντικαταστάσεως. Επαναλαμβάνεται ότι οι αντικαταστάτες, εκπτύσσονται (σχεδόν) μόνο σε περίπτωση που δεν εκπτυχθεί ο κύριος βλαστικός άξονας. Οι άξονες αντικαταστάσεως, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, είναι μικρότεροι και λιγότερο αναπτυγμένοι από τον κύριο βλαστικό άξονα.

Ο αριθμός των ταξιανθιών που φέρει ο κύριος βλαστικός άξονας (με άλλα λόγια το κατά πόσο γόνιμα είναι τα μάτια) εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία και από τις συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο καλοκαίρι όταν έγινε ο σχηματισμός του βλαστικού άξονα ή με άλλα λόγια όταν έγινε η διαφοροποίηση του οφθαλμού. Ισορροπημένη διατροφή και καλή κατάσταση υγείας του φυτού, αυξάνουν τη γονιμότητα των οφθαλμών ενώ διάφορες προσβολές και ακραίες καιρικές συνθήκες μειώνουν τη γονιμότητα των οφθαλμών.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι άξονες αντικαταστάσεως έχουν λιγότερα σταφύλια συγκριτικά με τον κύριο βλαστικό άξονα ή και καθόλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκπτύσσεται μόνο ο κύριος βλαστικός άξονας και οι αντικαταστάτες παραμένουν ζωντανοί αλλά σε λανθάνουσα κατάσταση στη βάση του βλαστού. Εν τούτοις, κάτω από ορισμένες και σπάνιες συνθήκες όπως σε περίπτωση αυστηρού κλαδέματος, ή όταν καταστραφεί μέρος του φυτού από κάποια αιτία, είναι δυνατόν να εκπτυχθούν ταυτόχρονα όλοι οι βλαστικοί άξονες, δηλαδή και ο κύριος βλαστικός άξονας και οι αντικαταστάτες. Πολλές φορές εάν καταστραφεί ο κύριος βλαστικός άξονας, εκπτύσσονται ταυτόχρονα και οι δύο αντικαταστάτες. Τότε από ένα γόνατο βλέπουμε να βγαίνουν δύο βλαστοί.



Εικ.4.3 Έκπτυξη λανθάνοντα ή αλλιώς χειμέριου οφθαλμού την άνοιξη, στην αρχή της βλαστικής περιόδου. Εάν ο οφθαλμός αυτός είναι καρποφόρος, ο βλαστός αυτός θα φέρει σταφύλια. Εάν είναι άγονος, δε θα φέρει σταφύλια. Το ποιοι οφθαλμοί είναι καρποφόροι εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία. Πχ στην Κορινθιακή σταφίδα γόνιμα είναι τα μάτια που βρίσκονται στο κάτω μέρος της κληματίδας.




Εικ.4.4 Καρποφόρος βλαστός αμπέλου. Τα σταφύλια, που εδώ βρίσκονται στο στάδιο του μούρου, βγαίνουν αντίθετα από τα φύλλα.


Εάν παρατηρήσουμε λεπτομερώς τους βλαστικούς άξονες στο στερεοσκόπιο, θα παρατηρήσουμε ότι επάνω στους βλαστικούς άξονες (δηλαδή στον κύριο και στους δυο αντικαταστάτες) υπάρχουν οι καταβολές όλων των οργάνων που θα προκύψουν από την εκβλάστηση αυτών των αξόνων. Δηλαδή διακρίνονται οι καταβολές των γονάτων, των μεσογονατίων διαστημάτων, των φύλλων, των ελίκων και εάν ο οφθαλμός είναι καρποφόρος και των σταφυλιών. Οι καταβολές αυτές που σχηματίζονται μέσα στον οφθαλμό, αποτελούν το προσχηματισμένο τμήμα του μελλοντικού βλαστού, το οποίο αποτελεί τα πρώτα 6-12 γόνατα. Τα επόμενα γόνατα του μελλοντικού βλαστού αποτελούν το νεοσχηματισμένο τμήμα του βλαστού.




Εικ.4.5 Λανθάνων ή χειμέριος οφθαλμός



Εικ.4.6 Στην αριστερή εικ. διακρίνεται μέσα στον οφθαλμό ο κύριος βλαστικός άξονας (apical meristem of primary bud) και αριστερά και δεξιά-στο κάτω μέρος- οι δύο άξονες αντικαταστάσεως. Οι άξονες αντικαταστάσεως είναι μικρότεροι από τον κύριο βλαστικό άξονα. Επίσης, διακρίνονται τα αγγεία του φλοιού και τα αγγεία του ξύλου. Με τα αγγεία του ξύλου (xylem) ανεβαίνουν τα εδαφικά διαλύματα (δηλαδή ο ακατέργαστος χυμός) προς τα φύλλα όπου γίνεται η φωτοσύνθεση και στη συνέχεια τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης (δηλαδή ο κατεργασμένος χυμός) με τα αγγεία του φλοιού (phloem) κυκλοφορούν αντίστροφα και "θρέφουν" όλα τα μέρη του φυτού. Στη δεξιά εικόνα διακρίνεται ο λανθάνων οφθαλμός (latent bud), ο οποίος θα εκπτυχθεί την επόμενη βλαστική περίοδο και ο μεσοκάρδιος βλαστός (lateral shoot). Επίσης φαίνεται ότι οι έλικες εκφύονται απέναντι από τα φύλλα.



Εικ.4.7 Κάθετη τομή σε δύο λανθάνοντες οφθαλμούς. Α: Διακρίνεται ο κύριος βλαστικός άξονας (ο οποίος είναι στο κέντρο και είναι ο μεγαλύτερος=P=primary) και αριστερά και δεξιά οι δύο αντικαταστάτες (που είναι μικρότεροι=S=second,T=third).Στη δεξιά εικόνα (B) ο κύριος βλαστικός άξονας (P) έχει υποστεί ζημιά.



Εικ.4.8 Εγκάρσια τομή σε λανθάνοντα οφθαλμό. Διακρίνεται ο κύριος βλαστικός άξονας (1) και οι άξονες αντικαταστάσεως (2,3).

Επίσης στη βάση του βλαστού που προέρχεται από τον λανθάνοντα οφθαλμό υπάρχει μια μικρή “προεξοχή” γύρω γύρω που λέγεται στεφάνη, πάνω στην οποία υπάρχουν μικρά μάτια, που λέγονται φυλλίτες επειδή δίνουν συνήθως μόνο φύλλα. Το μεγαλύτερο από τα μάτια της στεφάνης λέγεται τσίμπλα. Στις περισσότερες ποικιλίες η τσίμπλα είναι άγονη, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις όπως π.χ. στην Κορινθιακή σταφίδα και σε πολλές ποικιλίας οινοποίησης, που είναι γόνιμη. Οι οφθαλμοί της βάσης παραμένουν πάνω στο φυτό, ως τυχαίοι οφθαλμοί, καλύπτονται σιγά σιγά από τη δράση του καμβίου και έτσι δεν είναι εμφανείς και δίνουν τους τυχαίους βλαστούς πάνω στο “γέρικο” ξύλο της αμπέλου. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι οι βλαστοί αυτοί (που ονομάζονται τυχαίοι βλαστοί ή λαίμαργοι ή λανθάνοντες βλαστοί) οι οποίοι εκπτύσσονται από γέρικο ξύλο, σε μερικές ποικιλίες μπορεί να φέρουν σταφύλια. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τον κορμό ή τους βραχίονες του πρέμνου όταν έχουν υποστεί ζημιά. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,

οι ταχυφυείς βλαστοί δε φέρουν στη βάση τους οφθαλμούς, δηλαδή δε φέρουν φυλλίτες και τσίμπλα.

Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον αμπελουργό είναι να γνωρίζει ποιά από τα λανθάνοντα μάτια είναι καρποφόρα και ποιά όχι, έτσι ώστε με το κατάλληλο κλάδεμα να αφήσει πάνω στο πρέμνο καρποφόρα μάτια. Στο αμπέλι όλοι οι λανθάνοντες οφθαλμοί εξωτερικά έχουν την ίδια εμφάνιση δηλαδή δεν διακρίνονται “εμφανισιακά” τα καρποφόρα από τα μη καρποφόρα μάτια, σε αντίθεση με τα περισσότερα φυλλοβόλα καρποφόρα δένδρα όπου έχουν διαφορετική εμφάνιση οι καρποφόροι από τους ξυλοφόρους οφθαλμούς. **Στο αμπέλι, τα περισσότερα σταφύλια βγαίνουν από βλαστούς που προέρχονται από τους κατώτερους δέκα λανθάνοντες οφθαλμούς της κληματίδας.** Τα μάτια που βρίσκονται στην κορυφή της κληματίδας δίνουν βλαστούς χωρίς σταφύλια. Πχ στη Σουλτανίνα και στο Ραζακί, τα μάτια που βρίσκονται στη βάση της κληματίδας και συγκεκριμένα στον 1^ο και στον 2^ο κόμπο είναι άγονα. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε μερικές ποικιλίες είναι πολύ γόνιμα όπως σε πολλά κρασοστάφυλα, στην Κορινθιακή σταφίδα και στην επιτραπέζια ποικιλία Κάρντιναλ. Άρα, πρέπει να γνωρίζουμε τις ιδιομορφίες της κάθε ποικιλίας ώστε να κλαδεύουμε ανάλογα ελαφρά (σε πολλά μάτια δηλαδή όταν τα κάτω μάτια είναι άγονα) ή αυστηρά (σε λίγα μάτια δηλαδή όταν τα κάτω μάτια είναι γόνιμα). Η γονιμότητα βέβαια των οφθαλμών δεν εξαρτάται μόνο από τη θέση τους στην κληματίδα αλλά και από άλλους παράγοντες όπως από τη θρεπτική ισορροπία των φυτών, από τις κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν την προηγούμενη βλαστική περίοδο (και συγκεκριμένα το προηγούμενο καλοκαίρι) που σχηματίστηκαν οι βλαστικοί άξονες μέσα στους λανθάνοντες οφθαλμούς (δηλαδή όταν έγινε η διαφοροποίηση των οφθαλμών), από την υγιεινή κατάσταση των πρέμνων κλπ.

Η ταξιανθία εμφανίζεται στον καρποφόρο βλαστό συνήθως στο 4^ο μέχρι το 6^ο γόνατο, απέναντι από το φύλλο. Λέγοντας γονιμότητα των οφθαλμών, εννοούμε τον αριθμό των ανθοταξιών που φέρονται στον κύριο βλαστικό άξονα των οφθαλμών. Η υπερβολική ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας οδηγεί σε σκίαση των κληματίδων του πρέμνου και αυτό συνεπάγεται μείωση της γονιμότητας των οφθαλμών και ιδιαίτερα των οφθαλμών του κατώτερου τμήματος των κληματίδων.

Τα **άνθη** της αμπέλου είναι μικρά, πρασινωπά, στρογγυλά ή κυλινδρικά (εικ.4.9,4.10). Στην πρώτη φάση του σχηματισμού των τα άνθη λέγονται μούρα. Τα άνθη αποτελούν

ταξιανθία, που λέγεται βότρυς και βγαίνουν πάνω στους κόμπους, στην αντίθετη πλευρά από τα φύλλα. Είναι μικρά, ακτινωτά, αρσενικά, θηλυκά ή ερμαφρόδιτα. Έχουν μικρό κάλυκα και στεφάνη με 5 πέταλα. Στην περίοδο ανθοφορίας τα πέταλα “ξεκολλάνε” από τη βάση τους και ενώνονται όλα μαζί στο επάνω μέρος, σχηματίζοντας ένα είδος καλύπτρας ή αλλιώς πηλιδίου το οποίο στη συνέχεια πέφτει, “αποκαλύπτονται” οι στήμονες και ο ύπερος και γίνεται η επικονίαση και η γονιμοποίηση. Στη βάση της ωοθήκης υπάρχουν 5 νεκταροφόροι αδένες οι οποίοι περιέχουν γλυκό χυμό. Η μυρωδιά του γλυκού αυτού χυμού κάνει τα έντομα να επισκέπτονται (και να επικονιάζουν) τα άνθη. Κυρίως όμως είναι ανεμόφιλα, δηλαδή η μεταφορά της γύρης γίνεται με το ελαφρύ αεράκι. Πολλές φορές όμως οι στήμονες μόνοι τους απλώνονται, λυγίζουν και η γύρη τους ακουμπά στον ύπερο ενός κοντινού λουλουδιού. Η γύρη τότε κολλά στην κορυφή του ύπερου και “απορροφάται” από το στιγματικό υγρό.





Εικόνα 4.9 Επάνω: Διακρίνεται το πηλίδιο (πράσινο) πριν πέσει από το άνθος και το άνθος χωρίς το πηλίδιο. Επίσης φαίνονται οι δισχιδείς ανθήρες (κίτρινοι) και οι νεκταροφόροι αδένες (στρογγυλοί-κίτρινοι) που βρίσκονται στη βάση της ωοθήκης. Κάτω: Άνθη αμπέλου σε ανθοφορία (cap= πηλίδιο, stigma=στίγμα, pistil=ωοθήκη)



Εικόνα 4.10 Στάδιο ανθοφορίας της αμπέλου που έχει πέσει το 50% από τα πηλίδια.

Η ταξικαρπία της αμπέλου ονομάζεται σταφύλι ή βότρυς. Περιλαμβάνει τον κεντρικό άξονα, που διακλαδίζεται σε δεύτερης και τρίτης τάξεως άξονες, τα γνωστά τσαμπιά ή αλλιώς βοτρύδια, στα άκρα των οποίων υπάρχουν ποδίσκοι στους οποίου (ποδίσκους) προσφύονται οι ρώγες. Οι ρώγες των διαφόρων ποικιλιών διαφέρουν αναμεταξύ τους ως

προς το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, το άρωμα κλπ.

Η γονιμότητα της γύρης εξαρτάται από την ποικιλία, τη θρεπτική ισορροπία του φυτού, την υγιεινή του κατάσταση, τις κλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας κλπ. Π.χ. άσχημες καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο της ανθοφορίας στην ποικιλία Ραζακί έχουν σαν αποτέλεσμα κακή καρπόδεση, καρπόπτωση, μικρορραγία, και ανισορραγία. Συνήθως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες δίνουν πυκνόρραγα σταφύλια. Όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο, σε μερικές επιτραπέζιες ποικιλίες οι παραγωγοί "ρυθμίζουν" την πυκνότητα των ρωγών, το εάν δηλαδή το σταφύλι είναι "τσουπωτό" ή αραιόρραγο, ψεκάζοντας με διάφορες φυτορρυθμιστικές ουσίες. Πάντα βέβαια δε γονιμοποιούνται όλα τα άνθη σε μια ταξιανθία. Τα άνθη που δε γονιμοποιούνται ατροφούν και πέφτουν. Επίσης υπάρχουν και ποικιλίες παρθενοκαρπικές, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο των ποικιλιών, στις οποίες η ωοθήκη εξελίσσεται σε καρπό χωρίς να έχει προηγηθεί γονιμοποίηση. Οι ποικιλίες αυτές δεν έχουν κουκούτσια.

Μετά τη γονιμοποίηση του άνθους η ωοθήκη εξελίσσεται σε ρώγα. Η ρώγα στην αρχή είναι πράσινη, πλούσια σε οξέα και έχει πολύ μικρή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Το μέγεθός της σιγά σιγά αυξάνεται και παράλληλα αυξάνεται η περιεκτικότητά της σε σάκχαρα ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η περιεκτικότητά της σε οργανικά οξέα. **Περκασμός ή γυάλισμα** όπως το λέει και η ίδια η λέξη είναι η φάση αυτή κατά την οποία οι ρώγες αρχίζουν να γυαλίζουν. Η φάση του περκασμού είναι εντυπωσιακή διότι οι ρώγες των λευκών ποικιλιών γίνονται γυαλιστερές και των έγχρωμων ποικιλιών αποκτούν έγχρωμη απόχρωση. **Ωρίμανση του σταφυλιού** είναι το χρονικό διάστημα από τον περκασμό μέχρι τον τρυγητό, μέχρι τότε δηλαδή που το σταφύλι θα είναι ώριμο να τρυγηθεί. Κατά την έναρξη της ωρίμανσης η ρώγα αρχίζει να μαλακώνει. Η φάση της ωρίμανσης δεν έχει συγκεκριμένη διάρκεια αλλά εξαρτάται από την ποικιλία, τις συνθήκες περιβάλλοντος κλπ. Η περίοδος της ωρίμανσης οδηγεί το σταφύλι στην τελική του κατάσταση για τη συγκομιδή.

Οι αλλαγές που γίνονται στο σταφύλι κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης είναι καθοριστικές για την ποιότητά του. Έτσι, αρχικά αλλάζει το χρώμα και μετατρέπεται από πράσινο σε κίτρινο για τις λευκές ποικιλίες και σε κόκκινο για τις έγχρωμες. Οι ρώγες γίνονται μαλακές και ελαστικές. Σε αυτό το στάδιο, τα τσάμπουρα μετατρέπονται από τρυφερά βλαστάρια σε ξυλώδεις ιστούς, οι ρώγες μεγαλώνουν, αποκτώντας τον τελικό τους όγκο, ενώ τα σάκχαρα στη σάρκα αυξάνονται σε συνδυασμό με τα οξέα που μειώνονται. Στο τελευταίο στάδιο της

ωρίμανσης η περιεκτικότητα των σακχάρων σταθεροποιείται στα ανώτερα επίπεδα και τα οξέα είναι πολύ μειωμένα. Το στάδιο της ωρίμανσης είναι καθοριστικό για την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών και κατ' επέκταση κρασιών, γιατί τα περισσότερα χρωματικά, γευστικά και γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, διαμορφώνονται σε αυτό το στάδιο.

Μιλώντας για ωρίμανση στα αμπέλια διακρίνουμε:

- τη **βιολογική ωρίμανση** που λαμβάνει χώρα, όταν τα κουκούτσια είναι έτοιμα να βλαστήσουν,
- τη **βιομηχανική ωρίμανση** , όταν έχει συντεθεί η μέγιστη ποσότητα σακχάρων στη ρώγα, και τέλος

την **τεχνολογική ωρίμανση** που ενδιαφέρει, κυρίως, την οινολογία και που θα μπορούσε να περιγραφεί σαν η στιγμή εκείνη που το σταφύλι έχει χημική σύσταση ανάλογη του κρασιού που θέλουμε να φτιάξουμε. Με άλλα λόγια το ίδιο σταφύλι, εάν θέλουμε να παρασκευάσουμε διαφορετικά είδη κρασιών, όπως γλυκά ή ξηρά, μπορούμε να το τρυγήσουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γιατί η τεχνολογική ωριμότητα είναι διαφορετική κάθε φορά. Οι ποικιλίες σταφυλιού που έχουν περισσότερους από ένα βαθμούς τεχνολογικής ωριμότητας χαρακτηρίζονται ως πολυδύναμες. Τέτοιες είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, το Pinot Noir, η Ντεμπίνα, το Ξινόμαυρο κλπ.

Γενικό χαρακτηριστικό της ρώγας όλων των ποικιλιών είναι ότι εξωτερικά καλύπτονται από κηρώδη ουσία, η οποία συνιστά τη γνωστή κηρώδη ανθηρότητα της ρώγας, που στην καθομιλουμένη ονομάζεται "άχνη". Μέσα στην άχνη ζουν οι ζυμομύκητες, οι οποίοι μετατρέπουν τα σάκχαρα σε αλκοόλη κατά την αλκοολική ζύμωση. Γι' αυτό, δεν πρέπει να γίνεται ο τρύγος των κρασοστάφυλων αμέσως μετά από βροχή, αλλά μερικές ημέρες αργότερα, γιατί έχουν ξεπλυθεί με το νερό της βροχής οι μύκητες αυτοί. Η κηρώδης αυτή ουσία προστατεύει επίσης τις ρώγες από διάφορες βλάβες, από την αφυδάτωση και επιπλέον δίνει στο σταφύλι την όψη της φρεσκάδας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εμπορικότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών.

Οι ρώγες αποτελούνται εξωτερικά από το φλοιό ή φλούδα ενώ εσωτερικά αποτελούνται από σαρκώδη ουσία. Η σαρκώδης ουσία, ανάλογα με το είδος και την ποικιλία, είναι λιγότερο ή περισσότερο νερουλή. Στο εσωτερικό της σαρκώδους ουσίας υπάρχουν, σε μερικές ποικιλίες, 2- 4 κουκούτσια που αποτελούν και τα σπέρματα του αμπελιού. Πολλές

ποικιλίες όπως η Σουλτανίνα και η Κορινθιακή σταφίδα δεν έχουν σπέρματα.

Αν και το κρασί παράγεται από το μούστο, ή αλλιώς το γλεύκος, που προέρχεται από τη σάρκα της ρώγας, η φλούδα του σταφυλιού παίζει και αυτή τεράστιο ρόλο, τόσο για την αλκοολική ζύμωση όσο και για τα αρωματικά, χρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά του κρασιού που προκύπτει. Σε ένα στρώμα κυττάρων της φλούδας, πιο εσωτερικά, που καλείται επιδερμίδα, υπάρχουν αρωματικές ουσίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικές κάθε ποικιλίας. Τέλος, στο στρώμα της φλούδας κοντά στη σάρκα του σταφυλιού, που καλείται υπόδερμα υπάρχουν, μεταξύ άλλων, οι χρωστικές ουσίες, στις οποίες οφείλεται το χρώμα των κρασιών και οι τανίνες που είναι υπεύθυνες τόσο για τα ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά του κρασιού, όσο για την αύξηση της αντοχής του στο χρόνο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΡΩΓΩΝ

Τα σπουδαιότερα συστατικά των ρωγών είναι τα παρακάτω:

1. Υδατάνθρακες. Στις ρώγες απαντώνται κυρίως η γλυκόζη και η φρουκτόζη. Η περιεκτικότητα των σταφυλιών μιας ποικιλίας σε σάκχαρα δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από κλιματικούς, εδαφικούς, εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική, από το υποκείμενο κτλ.

2. Οξέα. Το πιο σπουδαίο οξύ στις ρώγες των σταφυλιών είναι το τρυγικό οξύ. Το τρυγικό οξύ δεν απαντάται ευρέως στη φύση, εκτός από το αμπέλι που συσσωρεύεται στους καρπούς του σε σημαντικές ποσότητες. Γι' αυτό το τρυγικό οξύ αποκαλείται πολλές φορές wine acid. Είναι ισχυρό οξύ, γι' αυτό δίνει στα κρασιά χαμηλό pH. Τρυγικό οξύ παραλαμβάνεται από τα τρυγικά άλατα τα οποία παραλαμβάνονται κατά την απολάσπωση του κρασιού στα οινοποιεία. Τα τρυγικά άλατα έχουν μεγάλη χρήση στη βιομηχανία.

Ένα άλλο οξύ που απαντάται στα σταφύλια, σε μικρότερες ποσότητες από το τρυγικό οξύ, είναι το μηλικό οξύ. Το μηλικό οξύ απαντάται σε αφθονία στα μήλα, εξού και το όνομά του (apple acid). Άλλο οξύ το οποίο απαντάται σε μικρότερες ποσότητες από τα δύο παραπάνω είναι το κιτρικό οξύ. Το κιτρικό οξύ απαντάται σε μεγάλες ποσότητες στα εσπεριδοειδή και κυρίως στα λεμόνια. Τα παραπάνω τρία οξέα συμβάλλουν καθοριστικά στην ολική οξύτητα του γλεύκους. Σε πολύ μικρές ποσότητες επίσης απαντάται το ασκορβικό οξύ και το γλυκονικό οξύ.

3. Αζωτούχες ενώσεις. Στο μούστο και στη συνέχεια στο κρασί, το άζωτο περιλαμβάνεται σε

ανόργανη και σε οργανική μορφή.

4. Φαινολικές ενώσεις. Είναι ενώσεις πολύ σημαντικές για την ποιότητα των αμπελοκομικών προϊόντων αλλά και για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι έχουν αντιοξειδωτική και βακτηριοστατική δράση και τον προστατεύουν από καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι κυριότερες φαινολικές ενώσεις που υπάρχουν στις ρώγες, καθώς επίσης και στα διάφορα αμπελοκομικά προϊόντα είναι: παράγωγα του φαινολικού οξέως, στιλμπένια, флаβονοειδή, ανθοκυάνες, κατεχίνες και τανίνες. Οι τανίνες επηρεάζουν τις γευστικές ιδιότητες των σταφυλιών και κατ' επέκταση των κρασιών. Στις φαινολικές ενώσεις και συγκεκριμένα στις ανθοκυάνες, στις флаβόνες και στα καροτενοειδή, οφείλεται το χρώμα των ρωγών και το χρώμα των φύλλων.

5. Αρωματικές ενώσεις. Το άρωμα των σταφυλιών οφείλεται σε εκατοντάδες ενώσεις οι οποίες ευρίσκονται στο σταφύλι σε πολύ μικρές ποσότητες. Οι πιο συνηθισμένες αρωματικές ενώσεις που έχουν μελετηθεί στο ευρωπαϊκό αμπέλι, είναι τα τερπένια. Αυτές οι ενώσεις συμβάλλουν στο μοσχάτο άρωμα των μοσχάτων όπως στο Μοσχάτο Σάμου, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, κλπ.

6. Βιταμίνες. Το σταφύλι περιέχει πολλές βιταμίνες.

Επίσης τα φρέσκα σταφύλια, ιδιαίτερα από άσπρες ποικιλίες και από ορισμένες περιοχές, περιέχουν ραδιενέργεια, σε μικρές ποσότητες, η οποία είναι πολύτιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Στάδιο της πράσινης κορυφής



Φυλλόπτωση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Το αμπέλι είναι ένα πολυετές φυτό και οι απαιτούμενες κατάλληλες και αναγκαίες καλλιεργητικές τεχνικές πρέπει να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι φάσεις της ζωής του αμπελιού, όπως αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω, είναι δύο, η **χειμερία νάρκη** και η **βλαστική περίοδος**.

- Το χειμώνα το αμπέλι αναπαύεται, πέφτει δηλαδή σε **χειμερία νάρκη**. Χειμερία νάρκη ή αλλιώς χειμερινός ύπνος ή αλλιώς λήθαργος ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία το φυτό, μετά τη συγκομιδή των καρπών του και όταν πέσει η θερμοκρασία κάτω των 10° C, χάνει τα φύλλα του και σταματάει την κυκλοφορία των χυμών του. Αυτό γίνεται μετά από ένα πράσινο κύκλο ζωής, που θα ξαναρχίσει την επόμενη άνοιξη, μόλις η θερμοκρασία της ατμοσφαιράς ξεπεράσει τους 10-12°C.

Μετά την περίοδο του τρυγητού, απαλλαγμένο από την “υποχρέωση” που έχει να θρέψει τους καρπούς του, χρησιμοποιεί τις ουσίες που σχηματίζονται στα φύλλα του για να τραφεί το ίδιο, αποθηκεύοντας ταυτόχρονα και τροφές στις ρίζες, στον κορμό και στις κληματίδες, υπό μορφή αμύλου, για να χρησιμοποιηθούν στο ξεκίνημα της βλάστησης που θα γίνει την επόμενη άνοιξη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε με κάθε τρόπο ώστε τα φύλλα να παραμένουν πάνω στο αμπέλι μέχρι τη φυσιολογική τους πτώση. Δηλαδή δεν κλαδεύουμε πριν πέσουν τα φύλλα και δε βάζουμε ζώα μέσα στον αμπελώνα. Έτσι το αμπέλι θα ξεκινήσει τη νέα βλάστηση την επόμενη άνοιξη με απόθεμα τροφών. Ειδικά σε πρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες όπως η Περλέτ, Αττική και Σουπίριορ, συνιστάται μετά τον τρυγητό να γίνεται ελαφριά λίπανση, ψεκασμοί φυτοπροστασίας και ελαφρύ πότισμα ώστε να φτιάξουν και να αποθηκεύσουν αρκετές τροφές για να ξεκινήσουν με “όρεξη” το ξεκίνημα της βλάστησης την επόμενη βλαστική περίοδο. Ο αμπελουργός, κατά τη διάρκεια του ληθάργου, το λιπαίνει και το κλαδεύει, αφαιρώντας το μεγαλύτερο τμήμα του ξύλου, που δημιουργήθηκε την προηγούμενη βλαστική περίοδο.

Η είσοδος των οφθαλμών στο λήθαργο αρχίζει τέλη Ιουλίου αρχάς Αυγούστου, γίνεται σταδιακά από τους οφθαλμούς της βάσης των βλαστών προς τους οφθαλμούς της κορυφής και ολοκληρώνεται με την πτώση των φύλλων.

- Τέλη χειμώνα-αρχές άνοιξης, ανάλογα κυρίως με την ποικιλία, όταν η θερμοκρασία στην

ατμόσφαιρα ξεπεράσει τους $10-12^{\circ}\text{C}$, το φυτό ξεκινάει να βλαστάνει, αρχίζουν δηλαδή να κυκλοφορούν οι χυμοί του από τις ρίζες προς τα πάνω. Όλες αυτές οι χημικές ενώσεις, που συσσωρεύτηκαν μετά την πτώση των φύλλων του κατά το φθινόπωρο και αποθηκεύτηκαν στα διάφορα μέρη του, μπαίνουν σε κυκλοφορία και βοηθούν να “φουσκώσουν” τα μάτια και να ξεκινήσει η νέα βλάστηση.

Ημερομηνία εκβλάστησης θεωρείται αυτή κατά την οποία το 50% των οφθαλμών ευρίσκεται στο στάδιο της πράσινης κορυφής. Η ημερομηνία εκβλάστησης εξαρτάται βασικά από την ποικιλία. Υπάρχουν ποικιλίες πρώιμης, μέσης ή όψιμης εκβλάστησης. Στις περιοχές που επικρατούν ανοιξιάτικοι παγετοί, θα πρέπει να επιλέγονται ποικιλίες όψιμης εκβλάστησης. Η ημερομηνία εκβλάστησης εξαρτάται επίσης και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Θερμοκρασίες πάνω από 10°C ευνοούν την εκβλάστηση.

Η άνοδος των χυμών προκαλεί πίεση του χυμού που εκδηλώνεται με τη δακρύρροια. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, απορροφώνται από τις ρίζες τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία, μέσω των αγγείων του ξύλου, δηλαδή ο ακατέργαστος χυμός ο οποίος φτάνει στα φύλλα, και γενικά στα κέντρα φωτοσύνθεσης όπου με τη φωτοσύνθεση μετατρέπεται σε κατεργασμένο χυμό. Ο κατεργασμένος χυμός στη συνέχεια, με τα αγγεία που φλοιού μεταφέρεται (σε αντίθετη φορά από τον ακατέργαστο χυμό) από τα κέντρα φωτοσύνθεσης προς όλα τα μέρη του φυτού για να τα “θρέψει”.

Οι βλαστοί επιμηκύνονται σταδιακά, μπορεί να φθάσουν σε μήκος και σε 2,5 μέτρα και επάνω τους εμφανίζονται τα φύλλα, οι έλικες και τα μούρα. Τα πρώτα 6-12 γόνατα αποτελούν το προσχηματισμένο τμήμα του καινούργιου βλαστού και το υπόλοιπο αποτελεί το νεοσχηματισμένο τμήμα του. Ο ρυθμός αύξησης του καινούργιου βλαστού στην αρχή είναι μικρός, μετά αυξάνεται και περί την ανθοφορία φθάνει σε ένα μέγιστο. Ακολούθως πέφτει και περί τα μέσα Ιουλίου σταματά. Ο αμπελουργός μπορεί να ρυθμίσει την παραγωγή, δηλαδή, είτε να τη μειώσει, αφαιρώντας σταφύλια ή και καρποφόρους βλαστούς, είτε να την αυξήσει, κάνοντας έντονο κορφολόγημα, προκειμένου να πάρει σταφύλια και από τους ταχυφυείς, όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

Τα μικρά μούρα στην πορεία ανοίγουν και μεγαλώνουν και τα άνθη ανθίζουν και γονιμοποιούνται. Η καλύτερη θερμοκρασία για τη γονιμοποίηση των ανθέων είναι $20-25^{\circ}\text{C}$. Βροχή, κρύο, χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμοποίηση και το καλό δέσιμο των ρωγών. Σε περίπτωση κακής γονιμοποίησης των

ανθέων παρατηρείται ανθόρροια, καρπόρροια (δηλαδή πτώση ανθέων και καρπών αντίστοιχα) και μικρορραγία.

Μετά τη γονιμοποίηση αρχίζει η ανάπτυξη του καρπού, η οποία συνεχίζεται το καλοκαίρι, όπου με τη βοήθεια του ήλιου και των υψηλών θερμοκρασιών επιτυγχάνεται η ωρίμανση αυτού. Όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν επικρατεί ηλιοφάνεια ή όταν έχουμε κακοκαιρία, βροχές κ.λπ. η ανάπτυξη των ρωγών καθυστερεί, γιατί καθυστερεί ουσιαστικά η μετατροπή των ακατέργαστων χυμών σε κατεργασμένους, οπότε και η παραγωγή γίνεται όψιμη. Όταν πάλι οι θερμοκρασίες που επικρατούν σε αυτό το στάδιο είναι πολύ υψηλές, επικρατούν δηλαδή καύσωνες, το φυτό εξαναγκάζεται να κλείσει τα στομάτιά του ώστε να ελαττώσει τη διαπνοή και ως εκ τούτου μειώνεται και ο ρυθμός φωτοσύνθεσης. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 50^o C, το φυτό ξεραίνεται.

Στο στάδιο της ανάπτυξης των ρωγών, τα σταφύλια είναι τρυφερά και μπορούν εύκολα να πάθουν ζημιές και καταστροφές από πολλές αιτίες. Η γεύση τους είναι πολύ ξινή γιατί αρχίζουν να συσσωρεύονται τα διάφορα οργανικά οξέα. Η αμέσως επόμενη φάση στη ζωή του αμπελιού είναι ο **περκασμός**, ή αλλιώς **γυάλισμα των σταφυλιών** που μπορεί να διαρκέσει στο σύνολο των σταφυλιών ενός αμπελώνα, περίπου είκοσι μέρες. Σε αυτό το στάδιο, που είναι και το πλέον εντυπωσιακό, αρχικά αλλάζει το χρώμα των σταφυλιών και μετατρέπεται από πράσινο σε κίτρινο, για τις λευκές ποικιλίες και σε κόκκινο για τις έγχρωμες. Συγχρόνως, έχουμε και αλλαγές στη χημική σύσταση των σταφυλιών με τη δημιουργία των σακχάρων και τη μείωση των οργανικών οξέων. Το βάρος των σταφυλιών σχεδόν διπλασιάζεται, ενώ παράλληλα οι ρώγες γίνονται μαλακές και ελαστικές. Στο εσωτερικό της ρώγας γίνονται οι πιο δυναμικές μεταβολές που επιδρούν στη γεύση, στο άρωμα και σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και κατ' επέκταση των αμπελοκομικών προϊόντων. Η ανάπτυξη των ραγών από το δέσιμο μέχρι το γυάλισμα διαρκεί, ανάλογα με την ποικιλία από 1-3 συνήθως μήνες. Π.χ. στην πρώιμη επιτραπέζια ποικιλία Κάρντιναλ διαρκεί ένα περίπου μήνα, ενώ στην όψιμη επιτραπέζια ποικιλία Καλμέρια, διαρκεί περίπου τρεις μήνες. Η ισόρροπη θρέψη σε αυτήν την περίοδο επηρεάζει σοβαρά το μέγεθος, την ποιότητα και τα άλλα χαρακτηριστικά των ραγών. Π.χ η έλλειψη υγρασίας στα επιτραπέζια σταφύλια κάνει μικρές ρώγες με χοντρό φλοιό. Αλλά και η περίσσεια υγρασίας, όταν μάλιστα συνοδεύεται και από περίσσεια θρεπτικών στοιχείων, και μάλιστα αζώτου έχει σαν αποτέλεσμα τα σταφύλια να γίνονται χοντρόρραγα, άγλυκα,

άχρωμα, χωρίς αντοχή στις ασθένειες και στους χειρισμούς. Σε αυτήν την περίοδο τα φυτά χρειάζονται πολύ κάλιο.

●Τέλος, υπάρχει ένα ακόμα στάδιο, αυτό της **ωρίμανσης** που είναι το χρονικό διάστημα από τον περκασμό μέχρι τον τρυγητό, μέχρι τότε δηλαδή που το σταφύλι θα είναι ώριμο να τρυγηθεί. Αυτή η περίοδος οδηγεί το σταφύλι στην τελική του κατάσταση για τη συγκομιδή. Σε αυτό το στάδιο, τα τσάμπουρα μετατρέπονται από τρυφερά βλαστάρια σε ξυλώδεις ιστούς, οι ρώγες μεγαλώνουν, αποκτώντας τον τελικό τους όγκο, ενώ τα σάκχαρα στη σάρκα εξακολουθούν να αυξάνονται σε συνδυασμό με τα οξέα που μειώνονται. Το στάδιο της ωρίμανσης των σταφυλιών είναι καθοριστικό για την ποιότητα των παραγόμενων κρασιών, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά των κρασιών, χρωματικά, γευστικά και χημικά διαμορφώνονται σε αυτό το στάδιο.

Το καλοκαίρι ή και το φθινόπωρο, εάν πρόκειται για όψιμες ποικιλίες, όταν πλέον τα σταφύλια αποκτήσουν το σχήμα, μέγεθος, χρώμα και άρωμα που χαρακτηρίζει την κάθε ποικιλία, όταν η σχέση σακχάρων και οξέων είναι η κατάλληλη και (εάν πρόκειται για κρασοστάφυλα) όταν οι σύνθετες μετρήσεις που εφαρμόζουν αμπελουργοί και οινολόγοι δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, έχει φτάσει η εποχή του τρύγου. Η απόφαση της στιγμής του τρύγου στα κρασοστάφυλα επηρεάζει δραστικά το χαρακτήρα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, του κρασιού και είναι πολύ σημαντική για κάθε οινοποιό, σε κάθε εσοδεία.

Μιλώντας για ωρίμανση στα αμπέλια διακρίνουμε :

- τη **βιολογική ωρίμανση** που λαμβάνει χώρα, όταν τα κουκούτσια είναι έτοιμα να βλαστήσουν,
- τη **βιομηχανική ωρίμανση**, όταν έχει συντεθεί η μέγιστη ποσότητα σακχάρων στη ρώγα, και τέλος
- την **τεχνολογική ωρίμανση** που ενδιαφέρει, κυρίως, την οινολογία και που θα μπορούσε να περιγραφεί σαν η στιγμή εκείνη που το σταφύλι έχει χημική σύσταση ανάλογη του κρασιού που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Με άλλα λόγια δηλαδή, το ίδιο το σταφύλι, εάν θέλουμε να παρασκευάσουμε διαφορετικά είδη κρασιών, όπως γλυκά ή ξηρά, μπορούμε να το τρυγήσουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γιατί η τεχνολογική ωριμότητα είναι

διαφορετική κάθε φορά. Οι ποικιλίες σταφυλιού που έχουν περισσότερους από ένα βαθμούς τεχνολογικής ωριμότητας χαρακτηρίζονται ως πολυδύναμες. Τέτοιες είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, το Pinot Noir, η Ντεμπίνα και το Ξινόμαυρο.

Αμέσως μετά το στάδιο της ωρίμανσης, ακολουθεί η φάση της **υπερωρίμανσης** που περιγράφεται ως η φάση εκείνη, κατά την οποία το σταφύλι δεν παίρνει τίποτα πλέον από το φυτό. Εξακολουθεί να ζει για λίγο ακόμα ξοδεύοντας τα αποθέματα που έχει. Η εξάτμιση του νερού συνεχίζεται και σε αυτή τη φάση, με αποτέλεσμα να αυξάνει ακόμα περισσότερο η περιεκτικότητα του σταφυλιού σε σάκχαρα. Αυτό κάποτε τελειώνει, οπότε το σταφύλι νεκρώνεται. Η ρώγα συρρικνώνεται και μόνο τα κουκούτσια εξακολουθούν να έχουν βιολογική ισχύ. Σε κάποιες περιοχές, η υπερωρίμανση πάνω στο φυτό είναι απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας και σε κάποιες άλλες η υπερωρίμανση των σταφυλιών επιτυγχάνεται μετά τον τρύγο με τη χρησιμοποίηση τεχνητών ή και φυσικών μέσων.



Αμπελώνες σε παραποτάμιες περιοχές του ποταμού Ρήνου της Γερμανίας. Τα πρέμνα στις βόρειες αυτές περιοχές φυτεύονται σε νότιες πλαγιές ώστε να "λούζονται" από το "λιγιστό" ήλιο. Επίσης τα αμπέλια φυτεύονται κοντά σε υδάτινους όγκους διότι το νερό συντελεί στο να "ανεβαίνουν" οι χαμηλές θερμοκρασίες και στο να "κρατιέται" η θερμοκρασία σταθερή. Επίσης το φθινόπωρο, η ομίχλη και η πάχνη που ανεβαίνουν από το νερό, συντελούν στο να προστατεύονται τα αμπέλια από τις πρώιμες παγωνιές. Στις βόρειες αυτές περιοχές επικρατούν οι λευκές ποικιλίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Η καλλιεργούμενη ποικιλία (cultivated variety, cultivar) αποτελεί πληθυσμό ατόμων που προήλθαν από αγενή πολλαπλασιασμό (με μόσχευμα ή εμβολιασμό) από περισσότερα του ενός μητρικά φυτά. Ο κλώνος (ποικιλίας αμπέλου) είναι σύνολο ατόμων που προέρχονται με αγενή πολλαπλασιασμό, από ένα και μόνο μητρικό φυτό (ακριβέστερα από έναν οφθαλμό) και έχουν τον ίδιο γονότυπο.

Η διάκριση και η ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες εξαιτίας κυρίως, του μεγάλου αριθμού τους.

Στην ύπαρξη τόσο μεγάλου αριθμού ποικιλιών οδήγησαν κατά κύριο λόγο τρεις παράγοντες. α. Η από πολλών χρόνων καλλιέργεια της αμπέλου από τον άνθρωπο β. Η πολλή μεγάλη εξάπλωση του φυτού γ. Η υψηλή γενετική παραλλακτικότητα της αμπέλου και ο υψηλός βαθμός ετεροζυγωτίας των ποικιλιών της.

Η υψηλή παραλλακτικότητα της αμπέλου προέρχεται κυρίως από μεταλλάξεις και από ανασυνδυασμούς γόνων εξαιτίας φυσικών ή τεχνητών διασταυρώσεων. Και στην Ελλάδα, ο αριθμός των ποικιλιών που καλλιεργούνται ή απαντώνται σποραδικά είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος του ελληνικού αμπελώνα. Ο καθηγητής αμπελουργίας Κριμπάς, πριν τον πόλεμο είχε απογράψει και περιγράψει 600 περίπου ποικιλίες αμπέλου. Σε αυτές τις εκλεκτές ελληνικές ποικιλίες προσετέθηκαν και αρκετές από τις καλύτερες, ξενικής προέλευσης, κυρίως γαλλικές, οι οποίες θα αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο.

Οι ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών καλλιεργούνται για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για να καταναλώνονται φρέσκα ως φρούτα. Οι καρποί των ποικιλιών αυτών θα πρέπει να είναι κατ' αρχήν ελκυστικοί στους καταναλωτές, μετρίου μεγέθους, με μεγάλες ρώγες, οι οποίες κατά το δυνατόν να μην είναι συμπαγείς αλλά αραιές έως μετρίως αραιές. Η σάρκα τους θα πρέπει να είναι τραγανή με κανονική αναλογία σακχάρων προς οξέα. Επίσης, θα πρέπει τα επιτραπέζια σταφύλια να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και ώριμα έτσι ώστε να αντέχουν στους χειρισμούς κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά τους και να φθάνουν στον τόπο προορισμού των σε καλή κατάσταση χωρίς να απορραγίζονται.

Οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου για να αποδώσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, πράγμα το οποίο κρίνεται άκρως απαραίτητο στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες

αγοράς, πρέπει να καλλιεργούνται σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον. Για τις επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου, τέτοιες συνθήκες θεωρούνται οι πεδινές εκτάσεις ομαλής κλίσης, με μεσημβρινή ή δυτική έκθεση, σε περιοχές που δεν παρατηρούνται συχνά όψιμοι ανοιξιάτικοι παγετοί. Τα εδάφη που καλλιεργούνται πρέπει να είναι μέσης γονιμότητας, βαθιά, αργιλοαμμώδη-αργιλοασβεστώδη και αρδευόμενα. Τέλος, σημαντικό ρόλο για τις επιτραπέζιες ποικιλίες, αποτελούν η πείρα των αμπελουργών, η εμπορική οργάνωση και η απόσταση από τα κέντρα πώλησης, εάν πρόκειται για ποικιλίες που προορίζονται για άμεση κατανάλωση ή από τους χώρους συντήρησης των σταφυλιών, εάν πρόκειται να καταναλωθούν αργότερα.

Στην εμπορία και ανταγωνιστικότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών, όπως και στα περισσότερα φυτικά προϊόντα, σημαντικό ρόλο παίζει και ο χρόνος συγκομιδής και εμπορίας. Με αυτό το σκεπτικό και προκειμένου να επιταχυνθεί ο χρόνος ωρίμανσης των πρώιμων ποικιλιών (για να πωληθούν σε υψηλότερες τιμές) έγινε μια πειραματική εργασία εδώ στη χώρα μας. Συγκεκριμένα καλλιεργήθηκαν οι τρεις πρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες Perlette, Cardinal και Αττική μέσα σε θερμοκήπιο, δηλαδή σε περιβάλλον με υψηλότερη (σχετικά με μια υπαίθρια καλλιέργεια) θερμοκρασία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επισπευθεί ο χρόνος ωρίμανσης των σταφυλιών των κατά 2-3 εβδομάδες περίπου, αλλά η συνολική όμως μέση απόδοση των πρέμνων στο θερμοκήπιο ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτά της υπαίθρου.

Πάντως στη χώρα μας, η καλλιέργεια επιτραπέζιων όψιμων ποικιλιών υπό κάλυψη (σκεπάζοντας από πάνω τα πρέμνα με πλαστικό όταν αρχίζουν οι βροχοπτώσεις) έτσι ώστε να συγκομίζονται τα σταφύλια οψιμότερα, εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία σε περιοχές της Κρήτης, Κορινθίας, Τυρνάβου και Θεσσαλονίκης, κυρίως σε επιτραπέζια Σουλτανίνα, διανοίγοντας μεγάλες προοπτικές διεύρυνσης της χρήσης της συγκεκριμένης αυτής τεχνικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Α) Λευκές

Σουλτανίνα. Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παραγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η σταφίδα που παράγεται από τη Σουλτανίνα είναι γνωστή ως λευκή

σταφίδα, ενώ η σταφίδα που παράγεται από την Κορινθιακή σταφίδα είναι γνωστή ως μαύρη σταφίδα.



Σουλτανίνα

Πολλοί αποδίδουν το όνομά της στην καταγωγή της διότι σύμφωνα με μια θεωρία, που είναι και η επικρατέστερη, είναι ασιατικής προέλευσης και προήλθε από την περιοχή “Σουλτανιέ” του βορείου Ιράν. Από εκεί διαδόθηκε στην περιοχή της Σμύρνης και στη λοιπή ακτή της Ιωνίας. Στην Ελλάδα η σουλτανίνα ήρθε το 1838 από τη Σμύρνη. Η καλλιέργεια της Σουλτανίνας είχε μεγάλη άνοδο μετά το 1922, με την εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Κρήτη. Σταδιακά ακολούθησε αναβάθμιση των μεθόδων καλλιέργειας και το προϊόν αποτέλεσε μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες του νησιού μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’80.

Το κυριότερο εμπορικό της χαρακτηριστικό είναι η απουσία κουκουτσιών. Επίσης, τα σταφύλια της έχουν εξαιρετικές οργανοληπτικές ιδιότητες.

Η ποικιλία αμπέλου Σουλτανίνα καρποφορεί από άνθη ερμαφρόδιτα και αυτογόνιμα, οπότε δε χρειάζεται επικονίαση από άλλη ποικιλία αμπελιού. Είναι ποικιλία παρθενοκαρπική και συγκεκριμένα στενοσπεμοκαρπική. Δηλαδή στη συγκεκριμένη ποικιλία έχουμε επικονίαση, γονιμοποίηση και πρόωρο εκφυλισμό του εμβρύου, γι’ αυτό και τα σταφύλια της δεν έχουν κουκούτσια. Τα σταφύλια της είναι μεγάλα και σχετικά πυκνά, ενώ το χρώμα της ράγας κυμαίνεται από λευκό ως χρυσίζον. Η σάρκα της ράγας είναι κάπως τραγανή και πολύ γευστική.

Είναι παραγωγική και ζωηρή ποικιλία, παράγοντας 1-2 σταφύλια ανά καρποφόρο βλαστό. Το αυστηρό κορυφολόγημα που πραγματοποιείται από πολλούς καλλιεργητές, συντελεί στο να δίνει δεύτερη παραγωγή, από τους ταχυφυείς βλαστούς, η οποία δεν είναι καθόλου αμελητέα. Το εύρος των αποδόσεων βρίσκεται ανάμεσα στα 1000 κιλά/στρέμμα για κυπελλοειδή σχήματα και φθάνει τα 4000 κιλά για γραμμοειδή, με εφαρμογές αυξητικών ουσιών.

Το σωστό κλάδεμα καρποφορίας είναι μακρό (4-6 μάτια) ή μικτό διότι οι οφθαλμοί της βάσης της κληματίδας είναι συνήθως μη παραγωγικοί. Καρποφορεί συνήθως από το τρίτο μάτι και πέρα.

Το ιδανικότερο έδαφος για τη Σουλτανίνα είναι το μέσης σύστασης, ενώ βαριά και υγρά ή ρηχά και ξηρά εδάφη είναι ακατάλληλα. Το ποσοστό της οργανικής ουσίας του εδάφους πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2-3%.

Η Σουλτανίνα είναι ποικιλία που θέλει ήλιο και αυξημένες θερμοκρασίες κατά την άνθηση, ενώ το καλοκαίρι που ωριμάζουν τα σταφύλια πρέπει να επικρατεί χαμηλή σχετική υγρασία. Δεν ενδείκνυται να καλλιεργείται σε μεγάλα υψόμετρα που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Η περίοδος ωρίμασης των σταφυλιών εντοπίζεται από τέλος Ιουλίου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου η και οψιμότερα ανάλογα την αποσκοπούμενη χρήση των σταφυλιών, την περιοχή καλλιέργειας, τις καλλιεργητικές φροντίδες, την παραγωγικότητα του αμπελώνα κτλ. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, μερικοί παραγωγοί καλύπτουν τα πρέμνα με πλαστικό, ώστε τα σταφύλια να διατηρηθούν περισσότερο στο πρέμνο και να διατεθούν οψιμότερα στην αγορά.

Στη Σουλτανίνα, με την κατάλληλη εφαρμογή φυτορρυθμιστικών ουσιών επιτυγχάνεται επιμήκυνση της ταξιανθίας, μείωση της καρπόδεσης (έτσι ώστε τα σταφύλια να μην είναι συμπαγή, δηλαδή με άλλα λόγια τσουπωτά) και αύξηση του μεγέθους της ρώγας. Έτσι τα σταφύλια είναι κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.

Ραζακί. Είναι γνωστό και ως Ροζακί, Κέρινο, Αρχανιώτικο, Ραζακί Άσπρο.



Ραζακί


Είναι από τις σπουδαιότερες επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου στη χώρα μας με μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Καλλιεργείται συστηματικά στην Κρήτη (Ηράκλειο), στη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χαλκιδική), στην Πελοπόννησο (Αχαΐα και Κορινθία) και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δίνει σταφύλι μεγάλο, κωνικό, με μέτρια πυκνότητα ρωγών. Η ρώγα είναι μεγάλη, κυλινδρική ή ελλειψοειδής με χρυσοκίτρινο ή λευκό-κίτρινο χρώμα. Ο φλοιός της είναι μετρίως λεπτός, συχνά διαφανής, η σάρκα της είναι τραγανή, ανθεκτική στις μεταχειρίσεις και στη συντήρηση, με ευχάριστη γλυκιά γεύση και 2-3 γίγαρτα ανά ρώγα σταφυλιού. Ποικιλία ζωηρή, παραγωγική, φέρει συνήθως 2 σταφύλια σε κάθε καρποφόρο βλαστό. Προτιμά δροσερές περιοχές και βαθιά εδάφη. Εμβολιάζεται με επιτυχία στα υποκείμενα R 110, Ru 140 και 1103P, ενώ παρουσιάζει προβλήματα με το 41B. Η εμπορική ωρίμανση των σταφυλιών κλιμακώνεται, ανάλογα με την περιοχή και τις καλλιεργητικές επεμβάσεις, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Οκτωβρίου. Τα σταφύλια αυτής της ποικιλίας, παρουσιάζουν μεγάλη ικανότητα για συντήρηση και μεταφορά, γι' αυτό θεωρείται η καλύτερη ποικιλία εμπορίου. Μεγάλες ποσότητες σταφυλιών που παράγονται στην Ελλάδα εξάγονται στις χώρες της Ευρώπης.

Παράγει περίπου 4 τόνους/στρέμμα σε παλμέτα, ενώ σε κρεβατίνα η παραγωγή είναι μεγαλύτερη.

Όψιμος Εδέσης Καλλιεργείται κυρίως στις αμπελουργικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι γνωστή και με τα ονόματα Ντόπιο, Σταφύλι Καρατζόβας, Χειμωνιάτικο, Φουστάνη, Πασχαλινό, Αμάσεια, Αμάσι. Είναι αξιόλογη όψιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική, με τοπικό κυρίως ενδιαφέρον. Τα σταφύλια της είναι μετρίου μεγέθους, λευκά,

κυλινδροκωνικά, σχεδόν πυκνόρραγα. Η ρώγα είναι ωοειδής, μέτρια έως μεγάλη, με παχύ, ανθεκτικό, κιτρινόλευκο φλοιό, καλυμμένο με άφθονη άχνη. Η σάρκα είναι ανθεκτική, τραγανή με γλυκιά γεύση.



Όψιμος Εδέσσης

Όψιμος Σουφλίου Καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή Σουφλίου στον Έβρο. Ονομάζεται και Ραζακί Σουφλίου.



Όψιμος Σουφλίου

Τα σταφύλια της είναι μεγάλα, κυλινδροκωνικά και σχεδόν πυκνόρραγα. Η ρώγα είναι μεγάλη, ελλειψοειδής, με ανθεκτικό φλοιό, πρασινοκίτρινου χρώματος, ανθεκτική, με όχι ιδιαίτερα γλυκιά γεύση.

Είναι ποικιλία, όψιμη, ζωηρή, παραγωγική. Δέχεται κλάδεμα βραχύ. Τα σταφύλια της ποικιλίας αυτής παρουσιάζουν αξιόλογη ικανότητα για συντήρηση και μεταφορά. Παρουσιάζει τοπικό ενδιαφέρον αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση για την αντικατάστασή της με την ποικιλία Ραζακί.

Αητονύχι Στην ομάδα των Αητονυχιών περιλαμβάνονται το άσπρο, το μαύρο και το κόκκινο αητονύχι. Πιο διαδεδομένο είναι το άσπρο, το οποίο καλλιεργείται σποραδικά, σε όλα τα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας. Τα σταφύλια της είναι μεγάλα, κυλινδροκωνικά και αραιόρραγα. Οι ρώγες της είναι ωοειδείς, με φλοιό παχύ, χρώματος κίτρινου - χρυσαφί και με τραγανή σάρκα.

Σχετικά όψιμη ποικιλία αμπέλου. Ωριμάζει από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι ζωηρή ποικιλία, μέτριας παραγωγικότητας. Είναι ευαίσθητη στον περονόσπορο και στο ωίδιο. Τα σταφύλια της ποικιλίας αυτής δεν ενδείκνυνται για συντήρηση και μεταφορά.



Αητονύχι μαύρο

Β) Έγχρωμες

Απτική. Η ποικιλία αυτή δημιουργήθηκε το έτος 1979 στο Ινστιτούτο Αμπέλου από τον ερευνητή κ. Μίχο. Η ποικιλία αυτή προέκυψε από διασταύρωση των ποικιλιών Ribier (θηλυκό) με την ποικιλία Black Monuka (αρσενικό). Τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά της ποικιλίας αυτής είναι η πρόωμη ωρίμανση και η έλλειψη κουκουτσιών στις ρώγες των σταφυλιών. Είναι πρόωμη ποικιλία, συνήθως ωριμάζει μια εβδομάδα νωρίτερα από τη Cardinal. Είναι ποικιλία πολύ παραγωγική. Το σχήμα του σταφυλιού της είναι κυλινδροκωνικό μέχρι κυλινδρικό και συχνά ελαφρά διακλαδιζόμενο. Η σάρκα της ρώγας είναι τραγανή και χυμώδης. Οι ρώγες της ποικιλίας αυτής δε φέρουν γίγαρτα, συγκεκριμένα έχουν απυρηνία στενοσπερμοκαρπική. Γι' αυτό μπορεί σε κάποιες ρώγες να βρεθούν ψευδογίγαρτα τα οποία δε δημιουργούν πρόβλημα κατά τη μάσηση. Το σχήμα της ρώγας είναι ωοειδές μέχρι κυλινδρικό και η ομοιομορφία των ρωγών είναι πολύ καλή. Η ρώγα έχει χρώμα μελανό. Επίσης τα σταφύλια της δεν απορραγίζονται και αντέχουν στις μεταφορές. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία.



Αττική

Σιδερίτης Ερυθρή ποικιλία, καλλιεργούμενη σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στην Κορινθία, την Αχαΐα και την Ηλεία και σποραδικά στην Αττική και στην Εύβοια. Είναι φυτό ζωηρό, εύρωστο, παραγωγικό, ανθεκτικό στην ξηρασία, ευαίσθητο στο ωίδιο, το βοτρυτή και την ανθόρροια, ιδιαίτερα όταν επικρατούν βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες στην περίοδο της ανθοφορίας. Δέχεται κλάδεμα στα 3-4 μάτια. Προτιμά εδάφη γόνιμα, δροσερά, πρώιμων περιοχών. Ωριμάζει πολύ όψιμα, αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 2 σταφύλια πολύ μεγάλα, που ξεπερνούν τα 500 gr., κωνικά ως κυλινδρικά, κανονικής πυκνότητας ρωγών. Οι ρώγες είναι μεγάλες, ελλειπτικές, με παχύ φλοιό, ερυθροϊώδους χρωματισμού και σάρκα άχρωμη, εύχυμη, γλυκιά, ελαφρά υπόξινη, με 1-3 κουκούτσια. Η αξία της ποικιλίας αυτής έγκειται κυρίως στην οψιμότητά της.



Σιδερίτης

Φράουλα Ποικιλία παλαιά. Θεωρείται ελληνικής προέλευσης. Καλλιεργείται συστηματικά στο νομό Κορινθίας ενώ σποραδικά απαντάται στις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές της χώρας.

Σταφύλι πολύ μεγάλου μήκους, κυλινδροκωνικό ή κυλινδρικό, αραιόρραγο με ανισορραγία. Ρώγα πολύ μεγάλη, ωοειδής. Φλοιός λεπτός, μετρίως ανθεκτικός, με ερυθρό ή ερυθροϊώδη χρωματισμό, όχι πάντα ομοιόμορφο. Σάρκα όχι πολύ γλυκιά και χωρίς ιδιαίτερη γεύση. Ποικιλία όψιμη, ζωνή, παραγωγική, με δύο σταφύλια ανά καρποφόρο βλαστό. Δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκίμει σε εδάφη γόνιμα, βαθιά, ελαφρά, με αρκετή υγρασία, όπου οι αποδόσεις πολλές φορές ξεπερνούν τους 5 τόνους ανά στρέμμα. Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο και το βοτρυτή. Τα σταφύλια της ποικιλίας αυτής δε συντηρούνται για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Καταναλώνονται στην τοπική αγορά. Μερικοί παραγωγοί καλύπτουν τα πρέμνα με πλαστικό, ώστε τα σταφύλια να διατηρηθούν περισσότερο στο πρέμνο και να διατεθούν οψιμότερα στην αγορά.



Φράουλα

Μοσχάτο Αμβούργου Πρόκειται για ποικιλία που συναντάται σποραδικά διεθνώς, στην Ελλάδα όμως είναι ταυτισμένη με τον Τύρναβο, αφού το μεγαλύτερο μέρος σχεδόν της καλλιέργειάς της βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του. Πολλοί μάλιστα την ονομάζουν Μοσχάτο Τυρνάβου. Η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής στον Τύρναβο ξεκίνησε μετά την καταστροφή του ιστορικού αμπελώνα του Τυρνάβου από τη φυλλοξήρα, όταν την περίοδο 1930-36 μέσω της Γεωργικής Σχολής Λάρισας και τη διανομή αντιφυλλοξηρικών κλημάτων προωθήθηκε μεταξύ άλλων ποικιλιών και το Μοσχάτο Αμβούργου. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ποικιλία αυτή στον Τύρναβο φτιάχνουν και ονομαστό τσίπουρο.

Η ποικιλία αυτή αρχικά δημιουργήθηκε από διασταύρωση της ιταλικής ποικιλίας Schiava Grossa (γνωστής και ως Trollinger ή Black Hamburg) και της αιγυπτιακής Μοσχάτο Αλεξανδρείας και πρωτοκαλλιεργήθηκε στα θερμοκήπια της Αγγλίας όπου ονομαζόταν Μαύρο Μοσχάτο Αλεξανδρείας. Στη συνέχεια επεκτάθηκε η καλλιέργειά της σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όπως στην Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πορτογαλία κ.λπ.), στις ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Βιρτζίνια, Όρεγκον, Τέξας), σε Αίγυπτο, Αργεντινή ενώ τελευταία τη συναντά κανείς και στην Κίνα. Στις διάφορες περιοχές του κόσμου όπου καλλιεργείται χρησιμοποιείται πρωταρχικά για παραγωγή οίνου και δευτερευόντως ως φρούτο.

Παράγει σταφύλια μέτριου μεγέθους, κυλινδροκωνικά και αραιόρραγα. Οι ρώγες της είναι μετρίου μεγέθους, ελλειψοειδείς, χρώματος μελανοϊώδους και είναι καλυμμένες με άχνη. Η σάρκα είναι μάλλον υδαρής, αρωματική (εξού και μοσχάτο) και με γλυκιά γεύση.

Είναι ποικιλία πολύ ζωνηρή, γόνιμη και πολύ παραγωγική. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρει 2 σταφύλια μέτρια ως μεγάλα. Είναι ευαίσθητη στο μολυσματικό εκφυλισμό και στο ωίδιο. Επειδή είναι πολύ ζωνηρή, έχει την τάση να ανθορροεί. Για την αποφυγή της ανθορροας χρειάζεται κορυφολόγημα στα 3-4 φύλλα πάνω από το τελευταίο τσαμπί, στην αρχή της άνθησης. Δέχεται κλάδεμα βραχύ στα 2-3 μάτια. Ωριμάζει τέλη Αυγούστου με αρχάς Σεπτέμβρη.



Μοσχάτο Αμβούργου

ΞΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

A) Λευκές

Perlette. Προήλθε από διασταύρωση των ποικιλιών Ραζακί πρώιμο Ουγγαρίας Χ Σουλτανίνα, η οποία έγινε από τον καθηγητή Οίμο το έτος 1936. Έκτοτε καλλιεργείται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου όπως στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Νότιο Αμερική κ.λπ. Στη χώρα μας καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κρήτη.



Perlette

Η ποικιλία Perlette είναι άμεσης κατανάλωσης, πολύ ζωντανή και εξαιρετικά παραγωγική. Παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στις μεταφορές. Το σταφύλι είναι μεγάλο, κυλινδρικό, πτερυγώτο, πυκνό έως συμπαγές. Η ρώγα δεν έχει κουκούτσια, είναι μικρού έως μετρίου μεγέθους, με λεπτό φλοιό, ανθεκτικό και διαφανούς χρώματος κίτρινου ανοιχτού. Το διαυγές χρώμα της ρώγας είναι η αιτία που πήρε το όνομά της η ποικιλία αυτή. Είναι πρώιμη ποικιλία, με συνήθη ημερομηνία ωρίμανσης τέλη Ιουλίου αρχάς Αυγούστου. Έχει και τους κατώτερους οφθαλμούς καρποφόρους, ακόμη και τον οφθαλμό της βάσης της κληματίδας, γι' αυτό δεν απαιτεί μακρύ κλάδεμα. Μειονεκτεί στο ότι παρουσιάζει σχετικά έντονη μικρορραγία και έχει πυκνά και συμπαγή σταφύλια. Συμμετέχει στην παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων σε ανάμιξη με άλλα τεμαχισμένα φρούτα όπως ροδάκινα, κεράσια κ.λπ. Ψεκασμοί της ποικιλίας αυτής (όπως ανεφέρθη ενωρίτερα για τη Σουλτανίνα) με φυτορρυθμιστικές ουσίες βοηθούν στην επιμήκυνση του σταφυλίου και στο αραίωμα των ρωγών.

Calmeria Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται σε σημαντική έκταση στην Κρήτη όπου είναι γνωστή με την ονομασία νυχάκι λόγω του ελλειψοειδούς σχήματος των ρωγών της. Καλλιεργείται επίσης και σε άλλα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας. Έχει καρπό

ανοιχτό πράσινο, αρκετά γλυκό, που περιέχει σπέρματα.

Τα σταφύλια είναι μεγάλα, κωνικά, μέτριας πυκνότητας. Οι ρώγες είναι κιτρινοπράσινες, ελλειπτικές, μεγάλου μεγέθους και είναι καλυμμένες με άφθονη άχνη. Περιέχουν συνήθως 2-3 γίγαρτα. Η σάρκα είναι τραγανή και ουδέτερης γεύσης.



Καλμέρια

Ποικιλία ζωνηρή, παραγωγική, σχεδόν όψιμη. Δέχεται βραχύ κλάδεμα καρποφορίας. Προτιμά εδάφη μέσης σύστασης με υψηλή εδαφική υγρασία. Αξιόλογη ποικιλία εξαιτίας της σχετικής οψιμότητάς της και της ικανότητας των σταφυλιών να συντηρούνται σε συνθήκες ψύξης και να αντέχουν για μακρό χρόνο στη μεταφορά.

Italia Είναι γνωστή και ως Ραζακί Μοσχάτο ή Ideal. Η ποικιλία αυτή είναι ιταλικής προέλευσης και προέρχεται από διασταύρωση των ποικιλιών Biscane x Μοσχάτο Αμβούργου. Αποκτήθηκε το 1911. Καλλιεργείται σε πολλά μέρη του κόσμου. Στη χώρα μας εισήχθη το 1955 και καλλιεργείται σε πολλά αμπελουργικά διαμερίσματα.

Παράγει σταφύλι μεγάλο, κωνικό ή κυλινδρικό, σχεδόν πυκνόρραγο με ελλειψοειδείς ρώγες κίτρινου χρώματος. Η σάρκα είναι ανθεκτική με ελαφρά γεύση μοσχάτου. Συνήθως περιέχει 2-3 γίγαρτα.

Είναι ποικιλία μέσης εποχής ωρίμανσης, ζωνηρή και παραγωγική. Δέχεται μικτό κλάδεμα

καρποφορίας, λόγω μειωμένης γονιμότητας των οφθαλμών της βάσεως της κληματίδας. Είναι ευαίσθητη στις προσβολές του ωιδίου, ενώ παρουσιάζει ευαισθησία και στην επίδραση του θείου. Σε θερμές περιοχές και σε ελαφρά εδάφη επιτυγχάνεται η καλύτερη ποιότητα σταφυλιών με το χαρακτηριστικό άρωμα. Χαρακτηριστική ιδιότητα της ποικιλίας αυτής είναι η ικανότητα διατήρησης των σταφυλιών για μακρό χρονικό διάστημα στα πρέμνα και ακόμη η αντοχή τους στη συντήρηση και στη μεταφορά.



Italia

Victoria Δημιουργήθηκε από διασταύρωση των ποικιλιών Cardinal x Ραζακί που έγινε στη Ρουμανία από τη γεωπόνο Victoria Lepodatu. Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε σημαντική έκταση. Είναι μια εντυπωσιακή ποικιλία, με πολύ μεγάλες ρώγες, πρασινοκίτρινου χρώματος. Ωριμάζει περίπου μέσα Αυγούστου. Πολύ παραγωγική ποικιλία, με μεγάλα, βαριά και ογκώδη σταφύλια. Όταν τα πρέμνα είναι διαμορφωμένα σε γραμμική σκάφη, οι αποδόσεις πολλές φορές ξεπερνούν και τους πέντε τόνους το στρέμμα. Σχετικά με τα γευστικά χαρακτηριστικά της "υστερεί" συγκριτικά με τις ποικιλίες Cardinal και Ραζακί από

τις οποίες προέρχεται.




Victoria

Sublima Seedless B Πλεονέκτημά της θεωρείται η πρόωγη ωρίμανσή της και η παραγωγή μεγάλων σταφυλιών με ευχάριστο άρωμα, λεπτή φλούδα και ικανοποιητικό μέγεθος ρώγας. Λευκή αγίγαρτη ποικιλία με μέση - υψηλή παραγωγή. Συνιστάται κλάδεμα μακρύ (8-10 οφθαλμοί) και μέσου ύψους σχήματα διαμόρφωσης. Ωριμάζει αρχάς Αυγούστου.



Sublima seedless B

Superior (Σουπέριο) Λευκή άσπερμη ποικιλία με μεγάλες ρώγες που ωριμάζει τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου. Τα σταφύλια της είναι εντυπωσιακά, ελαφρώς χαλαρά, με χρωματισμό έντονα κίτρινο και γεύση εξαιρετική. Δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια.



Superior

Thompson seedless (Τόμσον) Λευκή άσπερμη ποικιλία που ωριμάζει στο μέσο του Αυγούστου.

Β) Έγχρωμες

Cardinal Καλλιεργείται σε πολλά μέρη της Ελλάδος όπως στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, Λάρισα, Κέρκυρα, Κορινθία, Εύβοια και Κρήτη.

Τα σταφύλια της είναι μεγάλα, κωνικά και αραιόρραγα και περιέχουν 1-2 γίγαρτα. Η ρώγα της είναι μεγάλη έως πολύ μεγάλη, σφαιρική-ωοειδής, με φλοιό μέτριου πάχους, ερυθροιώδους χρωματισμού και είναι καλυμμένη με άφθονη άχνη. Η σάρκα είναι ανθεκτική, τραγανή, με ευχάριστη γεύση και αρωματική.

Δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια από τη διασταύρωση των ποικιλιών Flame Rokey x Ribier du Maroc. Δημιουργός της ήταν ο καθηγητής Olmo ο οποίος έφτιαξε και άλλες ποικιλίες όπως τις Perlette, Calmeria, Centennial Seedless κ.ά. Ωριμάζει τον Ιούλιο και είναι από τις πρωιμότερες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Ποικιλία ζωηρή, παραγωγική, με υψηλές αποδόσεις σταφυλιών με ωραία εμφάνιση, επιδεκτικών στους χειρισμούς επεξεργασίας και ανθεκτικών στη συντήρηση και στη μεταφορά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι καλλιεργείται σε ευνοϊκό εδαφοκλιματικό περιβάλλον και δέχεται τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες. Έχει και τους κατώτερους οφθαλμούς γόνιμους γι' αυτό δέχεται συνήθως βραχύ κλάδεμα. Κάθε καρποφόρος βλαστός είναι δυνατόν να φέρει και 4 σταφύλια. Μειονέκτημα της ποικιλίας αυτής είναι το σχίσσιμο και η ανισορραγία των ραγών της. Επίσης, όταν φέρει υπερβολικό φορτίο, παρουσιάζει ανομοιομορφία στο χρώμα των ραγών. Αξιοσημείωτη είναι τέλος η ευαισθησία της στις προσβολές του ωιδίου.



Cardinal

Ribier Ποικιλία έγχρωμη, γαλλικής προέλευσης, γνωστή και ως Alphonse lavallee ή Royal. Προήλθε από τη σπορά γιγάρτων που έγινε το 1860 από ένα φυτωριούχο στην Ορλεάνη της Γαλλίας. Στη χώρα μας καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Καλλιεργείται σχεδόν σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές του κόσμου.

Τα σταφύλια είναι μεγάλα, κωνικά, σχεδόν πυκνόρραγα. Οι ρώγες της είναι μεγάλες, σφαιρικές έως ελλειπτικές, χρώματος κυανομελανού και είναι καλυμμένες με άφθονη άχνη. Η σάρκα είναι ανθεκτική, μέτρια γλυκιά και ουδέτερης γεύσης.

Είναι ποικιλία ζωνρή, παραγωγική και μέσης πρωιμότητας. Δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκίμει σε θερμές περιοχές με γόνιμο έδαφος. Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο. Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες τα σταφύλια της ποικιλίας αυτής είναι πολύ καλής ποιότητας και είναι επιδεκτικά στη συντήρηση με ψύξη και στη μεταφορά.



Ribier

Grimpson seedless γνωστή και ως **Crimson seedless**. Δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια. Η ποικιλία αυτή μοιάζει πάρα πολύ σε μέγεθος, σχήμα και γεύση με τη Σουλτανίνα, γι' αυτό πολλές φορές ονομάζεται κόκκινη Σουλτανίνα. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται αρκετές εκατοντάδες στρέμματα, με αποδόσεις που κυμαίνονται περίπου από 2-4 τον./στρέμμα. Το σταφύλι της ποικιλίας αυτής είναι γενικά μεγάλο, κωνικό και συμπαγές.

Οι ρώγες της είναι κυλινδρικές, απύρηνες, έχουν ερυθρό χρωματισμό, είναι γλυκές και ζουμερές. Πρόκειται για όψιμη ποικιλία. Η εμπορική ωρίμανση των σταφυλιών κλιμακώνεται, ανάλογα με την περιοχή και τις καλλιεργητικές επεμβάσεις, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Οκτωβρίου. Συνήθως οι παραγωγοί καλύπτουν τα πρέμνα με πλαστικό, ώστε τα σταφύλια να διατηρηθούν περισσότερο στο πρέμνο. Απαιτεί μακρύ κλάδεμα, γιατί οι τρεις πρώτοι οφθαλμοί της κληματοβέργας είναι άγονοι.



Crimson seedless



Καλλιέργεια **Crimson seedless** στο Κιλκίς σε κρεβατίνη. Πολλοί παραγωγοί σκεπάζουν τα σταφύλια με πλαστικό για να τα συγκομίσουν αργότερα ώστε να πιάσουν καλύτερη τιμή.

Black Magic Αποτελεί μια εξαιρετική πρώιμη ιώδη-μαύρη επιτραπέζια ποικιλία, με μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. Δημιουργήθηκε στη Μολδαβία. Έχει σχετική αντοχή στις μυκητολογικές ασθένειες.

Είναι μέσης ζωηρότητας ποικιλία και πολύ καλής παραγωγικότητας. Ιδιαίτερο πλεονέκτημά της είναι η πρώιμη ωρίμανση. Συγκεκριμένα ωριμάζει το 1^ο με 2^ο δεκαήμερο του Ιουλίου, ανάλογα φυσικά με την περιοχή καλλιέργειας και το σύστημα μόρφωσης. Ο καρπός περιέχει 1-2 μικρά γίγαρτα. Ο βότρυς έχει μέσο βάρος 600 γρ. Οι ρώγες έχουν σχήμα ελλειψοειδές, χωρίς ιδιαίτερο άρωμα. Η σάρκα είναι πολύ τραγανή και χυμώδης. Δίνει υψηλή παραγωγή.

Red Globe Η ποικιλία αυτή παρήχθη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας το 1985. Είναι πολύ δημοφιλής στην Ασία, όπου και κατευθύνονται πολύ μεγάλες ποσότητες από ΗΠΑ και Αυστραλία. Το σταφύλι της ποικιλίας αυτής είναι μεγάλου μεγέθους (20-25 cm), με σχήμα κωνικό ή κυλινδρικό, βάρους 550-750 γρ. και αραιές πολύ μεγάλες ρώγες, στρογγυλές με μερικά μαλακά γίγαρτα. Καλλιεργείται και στη χώρα μας, σε περιορισμένη σχετικά έκταση. Ευδοκίμει σε γόνιμα και ελαφρά εδάφη με αρκετή υγρασία.

Συγκομίζεται από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο. Μπορεί να συντηρηθεί σε ψύξη για αρκετό

χρονικό διάστημα. Τα σταφύλια της είναι ευαίσθητα σε ηλιακά εγκαύματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γι' αυτό χρειάζεται σκίαση με δίχτυα ή αυξημένη φυλλική επιφάνεια.

Rally seedless Η ποικιλία αυτή είναι πολύ πρώιμη. Η διάθεσή της ξεκινάει αρχές Ιουλίου και τελειώνει μέσα Αυγούστου. Ο καρπός της είναι αρωματικός, τραγανός και δεν περιέχει κουκούτσια.



Rally seedless

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



Η αρχή όλων είναι ο αμπελώνας. Η ευλογημένη ελληνική γη προσφέρει μια μοναδική ποικιλία αμπελώνων που γεννούν σταφύλια με υπέροχα διακριτό χαρακτήρα.



Τα σταφύλια μαζεύονται είτε με τη δροσιά του πρωϊνού είτε με τη δύση του ηλίου από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο. Ο τρύγος γίνεται με τα χέρια. Οι καρποί τοποθετούνται σε καφάσια με προσοχή για να μην χτυπηθούν. Μεταφέρονται στο οινοποιείο, όπου εκεί γίνεται μια πρώτη επιλογή πριν από την έναρξη της διαδικασίας οινοποίησης. Ο τρύγος στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη γιορτή.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αγιαννιώτικο Σπάνια ερυθρή αιγαιοπελαγίτικη ποικιλία, η ωρίμαση της οποίας συμπίπτει συνήθως με τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Αγιωργίτικο αλλιώς γνωστό και ως Μαυρούδι ή Αίμα του Ηρακλή εξαιτίας του βαθυκόκκινου χρώματος που έχουν τα παραγόμενα κρασιά. Είναι μια από τις ευγενέστερες

ερυθρές ποικιλίες. Καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση στην περιοχή της Νεμέας. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή του Αι-Γιώργη εξού και το όνομα αυτής της ποικιλίας. Καλλιεργείται σποραδικά στην Αργολίδα, Αρκαδία και Αττική, καταλαμβάνοντας συνολικά μια έκταση που ξεπερνά τα 20.000 στρέμματα.

Φυτό μέτριας ζωηρότητας και ευρωστίας, γόνιμο, πολύ παραγωγικό. Δέχεται κλάδεμα κοντό στα 1-2 μάτια δεδομένου ότι ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Δίνει καλύτερης ποιότητας προϊόντα σε εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης, καλής γονιμότητας και στράγγισης και σε περιοχές με κάποιο υψόμετρο που να εξασφαλίζει την αργή και σωστή ωρίμανση του σταφυλιού. Ωριμάζει μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρει 1-2 σταφύλια, δεν είναι σπάνιο όμως να φθάσει και τα 4, μέτριου μεγέθους και πυκνόρραγα. Οι ρώγες είναι σφαιρικές, μέσου μεγέθους, με φλοιό παχύ, κυανομέλανου χρωματισμού και σάρκα άχρωμη, εύχυμη, μαλακή, γλυκιά, ελαφρά υπόξινη, με 2-3 γίγαρτα. Παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στο ωίδιο και στο μολυσματικό εκφυλισμό και μέτρια ευαισθησία στον περονόσπορο. Προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν επίσης από την ξηρασία και από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και της άνοιξης.

Το Αγιωργίτικο, μπορεί να δώσει διαφορετικούς τύπους κρασιών, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται. Σε περιοχές μικρού υψομέτρου μπορεί να δώσει αξιόλογα γλυκά κρασιά, σε περιοχές με κάποιο υψόμετρο κρασιά υψηλόβαθμα, καλής οξύτητας, πλούσια σε χρώμα, με καλές τανίνες, ενώ σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου μπορεί να δώσει ροζέ ξηρά κρασιά.



Αγιωργίτικο

Αηδάνι ή Αηδάνι άσπρο ή Ασπράηδανο. Καλλιεργείται κυρίως σε νησιά του Αιγαίου πελάγους όπως Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο.

Αηδάνι Μαύρο Σκουρόχρωμος κλώνος της ποικιλίας Αηδάνι. Απαντάται σπάνια στα νησιά του Αιγαίου.

Αθήρι Είναι μια αρχαία λευκή ποικιλία αμπέλου του Αιγαίου πελάγους. Καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση στην ημιορεινή βόρεια πλευρά της Ρόδου.

Αρακλινό Σπάνια ερυθρή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους.

Ασπρορομπόλα Λευκή ποικιλία, που καλλιεργείται στους αμπελώνες των νησιών του Ιονίου.

Ασπρούδα Σαντορίνης Είναι μια από τις πολλές σπάνιες ποικιλίες που συναντά κανείς στον αμπελώνα της Σαντορίνης.

Ασύρτικο Είναι μια λευκή ποικιλία παγκόσμιας εμβέλειας και μια από τις σπουδαιότερες ποικιλίες που απαντώνται στη λεκάνη της Μεσογείου. Καλλιεργείται στις Κυκλάδες, κυρίως όμως στα ηφαιστειογενή εδάφη της Σαντορίνης (Ασύρτικο Σαντορίνης), αλλά εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και είναι, από άποψη ποιότητας, μία από τις πιο σημαντικές γηγενείς ποικιλίες. Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία, ζωηρή και παραγωγική. Οι οφθαλμοί της βάσης της κληματίδας (δηλαδή ο τυφλός και ο πρώτος λανθάνων) δεν είναι γόνιμοι. Κάθε καρποφόρος βλαστός φέρει δύο σταφύλια. Έχει αξιοσημείωτη αντοχή στην ξηρασία, τον περονόσπορο και το ωίδιο.


Οι δυνατοί άνεμοι του νησιού της Σαντορίνης, εξανάγκασαν τους καλλιεργητές να διαμορφώσουν το Ασύρτικο σε ένα ιδιόμορφο σχήμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, γνωστό ως καλάθι ή κουλούρα τυλίγοντας αναμεταξύ τους τις κληματίδες. Τα φυτά σε αυτή την περίπτωση είναι φυτεμένα σε μεγάλες αποστάσεις και οι κληματίδες, ακόμα και τα παλαιότερα τμήματα του φυτού, διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν με φωλιά πτηνών. Το κλάδεμα καρποφορίας σε αυτό το σύστημα είναι μακρύ (αμολυτές με 8-15 οφθαλμούς) ή μικτό (κεφαλή με 2 οφθαλμούς και αμολυτή με 6-8 οφθαλμούς, που τυλίγονται σε κύκλο). Έτσι, προφυλάσσονται τα φυτά και ιδιαίτερα τα σταφύλια από την άμμο και το χώμα (δεδομένου ότι η Σαντορίνη έχει πολλούς ανέμους) και εξασφαλίζεται η απαραίτητη ποσότητα νερού, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ποτίσματος. Επειδή το έδαφος είναι αμμώδες δεν εμφανίστηκε ποτέ η φυλλοξήρα στο νησί αυτό και τα

φυτά είναι αυτόρριζα.



Ποικιλία Ασύρτικο στη νήσο Σαντορίνη διαμορφωμένο σε κουλούρα.

Έχει ρώγες με χοντρό φλοιό. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία και στις ασθένειες των αμπελιών όπως στο ωίδιο, τον περονόσπορο και το βοτρυτή. Γι' αυτό επικράτησε στη Σαντορίνη, εκτοπίζοντας το λεπτόφλουδο Αθήρι, που είναι πιο ευαίσθητο στο ωίδιο και στο βοτρυτή και λιγότερο ανθεκτικό στην ξηρασία.



Ασύρτικο

Αυγουσιάτης Ο Αυγουσιάτης ανήκει σε μια ομάδα πολύ σπάνιων ελληνικών ποικιλιών, που καλλιεργούνται σε μικρή έκταση.

Βαρδέα Η Βαρδέα είναι λευκή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους.

Βερτζαμί Το Βερτζαμί είναι μια σπάνια ερυθρή ποικιλία αμπέλου της δυτικής Ελλάδας.

Βηλάννα Είναι λευκή ποικιλία και καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση στην Κρήτη.

Βιδιανό Το Βιδιανό είναι μια ποικιλία που εντοπίζεται κυρίως γύρω από την περιοχή του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου της Κρήτης.

Βλάχικο Το Βλάχικο είναι μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου που προέρχεται από τα πλέον κρύα μέρη της βόρειας Ελλάδας.

Βοϊδομάτης Ερυθρή ποικιλία, φυτεμένη διάσπαρτα στην Πελοπόννησο και σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα.

Βολίτσα (λευκή και μαύρη) Δυσεύρετη ποικιλία με λευκό και ερυθρό κλώνο, η Βολίτσα απαντάται σε αμπελώνες της Πελοποννήσου.

Βραδυανό Είναι ερυθρή ποικιλία και απαντάται σε αμπελώνες της κεντρικής Ελλάδας και της νήσου Εύβοιας.

Γαϊδουριά Ιδιαίτερα σπάνια λευκή ποικιλία, η Γαϊδουριά συναντάται στα νησιά του Αιγαίου.

Γουστολίδι γνωστό και ως **Βοστυλίδι**. Είναι μία λευκή ποικιλία, που καλλιεργείται στα νησιά του Ιονίου πελάγους και στην Πελοπόννησο.

Δαφνί Είναι μια σπάνια λευκή ποικιλία αμπέλου της Κρήτης, που τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται η καλλιέργειά της.

Ζαλοβίτικο Το Ζαλοβίτικο είναι μια ζωνρή ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σποραδικά σε αμπελώνες της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας.

Ζαμπέλα ή Ιζαμπέλα. Είναι η κυριότερη ποικιλία αμπέλου της περιοχής των Τζουμέρκων που βρίσκονται στην Ήπειρο. Πρέπει να τονιστεί ότι η ποικιλία αυτή ανήκει στο αμερικάνικο είδος *Vitis labrusca* και όχι στο ευρωπαϊκό είδος *Vitis vinifera* στο οποίο ανήκουν όλες οι άλλες ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Ως γνωστόν τα αμερικάνικα είδη αμπέλου γενικά χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα και όχι σαν καλλιεργούμενα είδη,

όπως αυτά της ευρωπαϊκής αμπέλου *Vitis vinifera*. Στην Ελλάδα απαντάται κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Άρτας και δευτερευόντως στο Πήλιο και στο Άγιο Όρος. Στην περιοχή της Άρτας βρίσκεται κυρίως στην ορεινή ζώνη και μεμονωμένα στον κάμπο. Έχει αρκετά μεγάλη ανθεκτικότητα στον περονόσπορο και στο ωίδιο και δίνει μεγάλες αποδόσεις. Η αξία της ποικιλίας αυτής έγκειται κυρίως στο ότι δίνει πολύ καλής ποιότητας τσίπουρο.



Ζαμπέλα

Ζουμιάτικο ή Ζουμιάτης. Σχετικά αρωματική, λευκή ποικιλία, το Ζουμιάτικο καλλιεργείται σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Στην Ελλάδα το έφεραν πρόσφυγες. Τρώγεται ευχάριστα και ως φρούτο. Η ποιότητα των σταφυλιών της έχει υψηλή οινοποιητική αξία, όταν καλλιεργείται σε εδάφη ελαφρά, ασβεστώδη, επικλινή, μικρής γονιμότητας, όπου τα φυτά δίνουν μικρές αποδόσεις.

Θειακό Ερυθρή ποικιλία, το Θειακό συναντάται σπάνια στα νησιά του Ιονίου πελάγους και στην κεντρική Ελλάδα.

Θηνιάτικο Το Θηνιάτικο είναι ένας σπάνιος κλώνος της ποικιλίας Μαυροδάφνη και βρίσκεται φυτεμένος σε ελάχιστα αμπελοτόπια των νησιών του Ιονίου πελάγους.

Θράψα Η σπάνια ποικιλία Θράψα καλλιεργείται στην Πελοπόννησο και διαθέτει ερυθρό χρώμα. Είναι διαφορετική από την ποικιλία Θραψαθήρι.

Θραψαθήρι Το Θραψαθήρι είναι μια σημαντική ποικιλία της Κρήτης, η οποία αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον υποσχόμενες και συναρπαστικές λευκές ποικιλίες του νησιού.

Κακοτρύγης ή Κακοτρίχι Από τη λευκή αυτή ποικιλία λέγεται ότι προήλθε ο αρχαίος "Ανθοσμίας οίνος" που αναφέρει ο Θουκυδίδης. Ο Κακοτρύγης είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες ποικιλίες. Καλλιεργείται κυρίως στα νησιά του Ιονίου πελάγους όπως στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και στην Ηλεία. Ονομάζεται έτσι γιατί τα τσαμπιά έχουν σκληρό κοτσάνι και είναι σχετικά δύσκολος ο τρύγος τους.

Καραμπραϊμης Ο Καραμπραϊμης είναι μια όψιμη ερυθρή ποικιλία πιθανόν μικρασιατικής προέλευσης. Καλλιεργείται στο νησί της Εύβοιας και σε λίγα ακόμα νησιά του Αιγαίου πελάγους.

Καρναχαλάδες Όψιμο, ερυθρό σταφύλι, η ποικιλία Καρναχαλάδες απαντάται πολύ σπάνια, σε κάποιους αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας.

Κολινδρινό Το ερυθρό Κολινδρινό είναι μια πολύ σπάνια ποικιλία της βόρειας Ελλάδας.

Κολλιναίτικο Ερυθρή ποικιλία, το Κολλιναίτικο καλλιεργείται στην Πελοπόννησο και πήρε το όνομά του από το χωριό Κολλίνες της Αρκαδίας.

Κοντοκλάδι Είναι σπάνια λευκή ποικιλία. Απαντάται στα νησιά του Ιονίου πελάγους και στη βόρεια Ελλάδα.

Κοτσιφάλι Το Κοτσιφάλι είναι ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται σε σημαντική έκταση στην Κρήτη. Δίνει στρογγυλή μεσαίου μεγέθους ρώγα, μικρό σχετικά τσαμπί με βασικό χαρακτηριστικό το δεύτερο μικρό τσαμπάκι(κοίτα εικόνα).Είναι πρώιμη, ζωηρή και παραγωγική ποικιλία και φέρει 2 σταφυλές ανά καρποφόρο βλαστό, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να φθάσει τις τρεις. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος και επίσης γόνιμοι είναι και οι ταχυφυείς βλαστοί. Είναι μέτρια ευαίσθητη στον περονόσπορο και το ωίδιο και πολύ ευαίσθητη στο μολυσματικό εκφυλισμό. Έχει πολύ μαύρο χρώμα σαν τα φτερά του κοτσουφιού, εξού και το όνομά της. Το φυτό είναι ζωηρό, παραγωγικό και εύρωστο, με μεγάλη γονιμότητα οφθαλμών. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στους ανέμους. Η καλλιέργειά του αποδίδει καλύτερα σε εδάφη αργιλοαβεστώδη, καλής στράγγισης ακόμη και ξερά ή φτωχά εδάφη ημιορεινών περιοχών και κατά προτίμηση σε πλαγιές.



Κοτσιφάλι Διακρίνεται το δεύτερο μικρό τσαμπάκι, που είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας.

Κρασάτο Ερυθρή ποικιλία της Θεσσαλίας, που καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Ραψάνης. Ωριμάζει τέλη Σεπτεμβρίου.


Κρητικό Αν και το όνομα παραπέμπει στην Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων είναι αυτά που διαθέτουν ελάχιστα κλήματα από τη λευκή αυτή ποικιλία.

Κυδωνίτσα Η Κυδωνίτσα είναι μια λευκή ποικιλία, που κατάγεται από την περιοχή της Λακωνίας, όπου και καλλιεργείται σήμερα σε μικρή σχετικά έκταση.

Λαγόρθι Το Λαγόρθι είναι μια λευκή ποικιλία αμπέλου που καλλιεργείται κυρίως στην Αχαΐα.

Λαδικινό Ερυθρή ποικιλία που είναι φυτεμένη σε μικρή έκταση στην Κρήτη.


Λημνιό Το παράδοξο είναι πως το Λημνιό υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι πολύ διαδεδομένο στη Λήμνο, που θεωρείται η γενέτειρά του, εξού και το όνομά του. Το ντόπιο όνομα της ποικιλίας στο νησί είναι Καλαμπάκι. Η πλειονότητα των φυτεύσεών του βρίσκεται στον αμπελώνα της βόρειας Ελλάδας. Είναι χρώματος ερυθρού.



Λημνιό


Λημνιώνα Η Λημνιώνα είναι μια από τις σπάνιες ερυθρές ποικιλίες. Λέγεται πως η Λημνιώνα προέρχεται από τη Θεσσαλία και ειδικότερα από τις περιοχές της Καρδίτσας και του Τυρνάβου. Σήμερα, λόγω των καλών οινοποιητικών της χαρακτηριστικών, επεκτείνεται η καλλιέργειά της σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Λιάτικο Είναι μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου, αυτόχθονη, που η καλλιέργειά της ανάγεται στον 3^ο ή 2^ο αιώνα πρό Χριστού. Θεωρείται ως η πιο πρώιμη ελληνική έγχρωμη ποικιλία. Το Λιάτικο απαντάται σε όλη την Κρήτη. Η Κορινθιακή σταφίδα αποτελεί μεταλλαγή της ποικιλίας αυτής. Είναι ζωηρή και παραγωγική ποικιλία με ταχυφυείς βλαστούς μεγάλης γονιμότητας. Σημειώνεται ότι ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει δύο σταφυλές. Είναι ποικιλία ανθεκτική στην ξηρασία, μέτρια ανθεκτική στον περονόσπορο, ευαίσθητη στο ωίδιο και στην ευδεμίδα και εξαιρετικά ευαίσθητη στο μολυσματικό εκφυλισμό και στο βοτρυτή. Ευδοκίμει σε φτωχά και ξηρά εδάφη. Δεν παρουσιάζει προβλήματα συμβίωσης με τα περισσότερα αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα. Εξαιτίας της μεγάλης γονιμότητας των ταχυφυών βλαστών, μπορεί να δώσει συμπληρωματικό φορτίο μετά από κορυφολόγημα.



Λιάτικο

Μαλαγουζιά ή Μαλαγουζιά Ναυπακτίας Στη δεκαετία του 1970, η Μαλαγουζιά θεωρείτο εξαφανισμένη και την ήξεραν ελάχιστοι. Σήμερα, μετά από επίπονη εργασία κορυφαίων καλλιεργητών και οινολόγων, η Μαλαγουζιά θεωρείται ευρέως ως σταφύλι με άριστες οινοποιητικές ιδιότητες και καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώιμη, λευκή, αρωματική ποικιλία και αρκετά παραγωγική. Κλαδεύεται στα 1-3 μάτια και είναι ανθεκτική στην ξηρασία.



Μαλαγουζιά

Μαλουκάτο Το Μαλουκάτο είναι μια λευκή ποικιλία, ελάχιστες φυτεύσεις της οποίας μπορεί κάποιος να συναντήσει σε νησιά του Αιγαίου πελάγους.

Μανδηλαριά Είναι γνωστή και ως **Αμοργιανό, Παριανό, Βάφτρα, Μαύρη Κουντούρα, Μαντηλάρι**. Το γεγονός ότι αυτή η ποικιλία έχει πολλά ονόματα, μαρτυρά το ότι είναι πολύ εξαπλωμένη η καλλιέργειά της, ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα.



Μανδηλαριά

Μανδηλαριά Άσπρη γνωστή και ως **Κουντούρα Άσπρη** Αν και το όνομα παραπέμπει σε λευκό κλώνο της Μανδηλαριάς, πιθανότερη είναι η συγγένειά της με την ποικιλία Σαββατιανό. Η Μανδηλαριά Άσπρη βρίσκεται φυτεμένη σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στο Αιγαίο.

Μαύρο καλαβρυτινό Ερυθρή ποικιλία της Πελοποννήσου.

Μαύρο Μεσενικόλα Είναι ερυθρή ποικιλία και το όνομά της το πήρε από έναν Ενετό αξιωματούχο τον Μεσιέ Νικόλα (μεσενικόλα) ο οποίος τη φύτεψε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα, όπου καλλιεργείται και σήμερα.



Μαύρο Μεσενικόλα

Μαυροδάφνη Η Μαυροδάφνη αποτελεί μια σπουδαία ερυθρή αρωματική ποικιλία, που καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Πάτρας και κατά δεύτερο λόγο στην Κεφαλλονιά.




Μαυροδάφνη

Μαυροτράγανο Είναι ερυθρή ποικιλία με μαύρες και τραγανές ρώγες, χαρακτηριστικά από τα οποία πήρε και το όνομά της. Καλλιεργείται στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και σε άλλα μέρη της χώρας μας.

Μαυρούδι Η ονομασία της ποικιλίας Μαυρούδι προέρχεται από το σκούρο (μαύρο) χρώμα της φλούδας των ρωγών της, γι' αυτό και το μαυρούδι χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή σκουρόχρωμων ερυθρών κρασιών.

Μονεμβασιά Κατάγεται από τη Λακωνία και τα νησιά των Κυκλάδων. Είναι λευκή ποικιλία και καλλιεργείται σε πολλά μέρη της χώρας.

Μοσχάτο Αλεξανδρείας Κατάγεται πιθανόν από τη Βόρεια Αφρική. Στην Ελλάδα φυτεύτηκε στις αρχές του 20^{ου} αιώνα. Είναι γνωστό και ως Μοσχάτο χονδρό, Αγγλικό, Αποστολιάτικο. Καλλιεργείται σε πολλά μέρη του κόσμου. Στη χώρα μας καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία και στα νησιά του Αιγαίου. Ποικιλία τριπλής χρήσης (οινοποίηση, επιτραπέζια, σταφίδα), με ρώγες κιτρινόχρυσου χρώματος.



Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Μοσχάτο Αμβούργου Έχει περιγραφεί στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

Μοσχάτο λευκό. Μικρασιατικής προέλευσης ποικιλία η οποία είναι γνωστή και ως Μοσχάτο Σάμου, Μοσχούδι, Μοσχοστάφυλο, Μοσχάτο Ρίου, Μοσχάτο πρώιμο, Μοσχάτο σταχτί, Μοσχάτο Σπίνας κλπ. Καλλιεργείται κυρίως στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά Σάμο και Ρόδο, στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Αχαΐα και στην Κεφαλλονιά. Πρώιμη ποικιλία μέτριας ζωηρότητας και παραγωγικότητας, στην οποία ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος

και ο καρποφόρος βλαστός φέρει 1-2 σταφυλές στον 3^ο και 4^ο κόμβο. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο ωίδιο και ευαίσθητη στον περονόσπορο, στο βοτρυτή, στην ευδεμίδα και στον μολυσματικό εκφυλισμό. Συμβιώνει αρμονικά με τα περισσότερα γνωστά υποκείμενα και επιπλέον η συμπεριφορά του στους επιτόπιους και επιτραπέζιους εμβολιασμούς είναι άριστη. Δέχεται βραχύ κλάδεμα. Άριστης ποιότητας προϊόν δίνει σε χαλικώδη, σχιστολιθικά εδάφη, με καλό αερισμό, καλή στράγγιση και σε περιοχές με υψόμετρο και μεγάλη ηλιοφάνεια. Πολλές φορές υφίσταται έντονη ανθόρροια και μικρορραγία, ωστόσο εφαρμόζονται κατάλληλα κορυφολογήματα για την αντιμετώπισή τους.

Μοσχάτο τράνι Ιταλικός κλώνος του λευκού λεπτόρωγου Μοσχάτου.

Μοσχόμαυρο Ποικιλία μαύρου χρώματος.

Μοσχοφίλερο Είναι έγχρωμη ποικιλία. Το Μοσχοφίλερο καλλιεργείται στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, Λακωνία, στα νησιά του Ιονίου πελάγους, στην Πρέβεζα, Μαγνησία και τελευταία στη Φλώρινα. Κυρίως όμως καλλιεργείται στο Αρκαδικό οροπέδιο, στην περιοχή της Μαντινείας, με την οποία έχει και άρρηκτα συνδεθεί. Ανήκει στην ποικιλία "Φιλέρια", που σήμερα έχει μεταλλαχθεί σε ένα μεγάλο αριθμό υποποικιλιών, όπως το Μαυροφίλερο, το Κοκκινοφίλερο, το Ασπροφίλερο κλπ. Το Μοσχοφίλερο είναι πολυδύναμη ποικιλία, μπορούν δηλαδή από την ποικιλία αυτή να παραχθούν πολλά και διαφορετικά είδη κρασιών, από ξηρά λευκά μέχρι ροζέ, αφρώδη ή και γλυκά κρασιά.



Μοσχοφίλερο

Μούχταρο Καλλιεργείται στην κεντρική Ελλάδα

Μπατίκι Είναι λευκή ποικιλία της κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας.


Μπεγλέρι Απαντάται σπάνια, στα νησιά του Αιγαίου.

Μπεκιάρι ή Μπεκάρι Ερυθρό σταφύλι της βόρειας Ελλάδας.

Μπογιαλαμάδες Σπάνια αρωματική ερυθρή ποικιλία, η Μπογιαλαμάδες έχει έντονο χρώμα και συναντάται διάσπαρτα φυτεμένη σε κάποιους αμπελώνες της βόρειας Ελλάδας.


Νεγκόσκα ή Ποπόλκα Ναούσης. Ερυθρή ποικιλία του βορειοελλαδικού χώρου. Η ετυμολογία της λέξης, από τη σλάβικη ονομασία της πόλης Νάουσα που ήταν Νεγκούς, μαρτυρά και την προέλευσή της.

Ντεμπίνα Πρόκειται μάλλον για παλαιά αυτόχθονη ποικιλία της Ηπείρου, που κατά μια εκδοχή καλλιεργείται από τα τέλη του 16^{ου} αιώνα και οφείλει την ονομασία της στο χωριό Ντάμπενι που βρίσκεται μεταξύ Καστοριάς και Κορυτσάς. Ο αμπελώνας της Ζίτσας, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, είναι το βασικό κέντρο καλλιέργειας αυτής της λευκής ποικιλίας. Ως ποικιλία είναι ζωηρή και εύρωστη και προσαρμόζεται εύκολα σε εδάφη πτωχά, ξηρά και ασβεστώδη. Από την ποικιλία αυτή μπορεί να παραχθεί αφρώδης οίνος, τύπου σαμπάνια. Τα σταφύλια της είναι λευκά και είναι ευαίσθητα στα καψίματα από τον ήλιο.



Ντεμπίνα

Ξινόμαυρο Όπως το λέει και το όνομά του, έχει μαύρο χρώμα. Θεωρείται ως μια από τις εκλεκτότερες μαύρες ποικιλίες της χώρας μας και είναι η σημαντικότερη ποικιλία της βόρειας Ελλάδας. Είναι παραγωγική ποικιλία, με γόνιμο τον τυφλό οφθαλμό, ζωνή, με ορθόκλαδη βλάστηση και σχετικά όψιμης ωρίμανσης. Κλαδεύεται συνήθως στα δύο μάτια. Καλλιεργείται κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Το Ξινόμαυρο συναντάται με τις ονομασίες Μαύρο Ναούσης, Μαύρο Ναουσινό, Ναουσινό, Μαύρο Γουμένισσας, Μαύρο Ξινό, Ποπόλκα και Ξινόγκαλτσο. Είναι ευαίσθητη στον περονόσπορο, το ωίδιο, το βοτρυτή και τον μολυσματικό εκφυλισμό. Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος χρειάζεται εδάφη βαθιά, γόνιμα και με επάρκεια υγρασίας. Οι οίνοι που παράγονται χαρακτηρίζονται από καλό ερυθρό χρώμα και από επιδεκτικότητα παλαίωσης.



Ξινόμαυρο

Παμίδι Σχετικά διαδεδομένο στη Βόρεια Ελλάδα, το Παμίδι διαθέτει ρώγες με ροδόχρωμη φλούδα.

Παύλος Σπάνια λευκή ποικιλία, που συναντάται στα νησιά του Ιονίου πελάγους.

Πετροκόριθο Ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται σποραδικά σε όλη την Ελλάδα.

Πετρουλιανός Λευκή ποικιλία της Πελοποννήσου.

Πλυτό Πρόκειται για ποικιλία που καλλιεργείται στην ανατολική Κρήτη και Κύθηρα. Είχε σχεδόν ξεχαστεί αλλά πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο και πολλοί καλλιεργητές φυτεύουν ξανά την ποικιλία αυτή. Είναι φυτό ζωηρό, παραγωγικό αλλά ευαίσθητο στις ασθένειες. Τα σταφύλια του είναι μέτρια, με φλοιό χρυσοκίτρινο. Ο τρύγος του γίνεται μέσα Σεπτέμβρη.

Πρικνάδι ή Πρεκνιάρικο Είναι γηγενής λευκή ποικιλία της Νάουσας. Η ονομασία του προέρχεται από τα στίγματα (πρέκνες) που έχει στη φλούδα του.

Ρητινό Ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται σποραδικά σε διάφορα μέρη της χώρας.

Ροδίτης Είναι η πλέον πολυφυτεμένη λευκή ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα μετά το Σαββατιανό. Μαζί με το Σαββατιανό συμμετέχει στην παραγωγή ρητινίτη οίνου. Συχνά αναφέρεται και ως Ρογδίτης, Ροϊδίτης, Αλεπού, Ροδομούσι, Σουρβιώτης, Βιολεντό. Καλλιεργείται από άκρη σε άκρη της ηπειρωτικής χώρας. Απαντάται σε πολλές κλωνικές παραλλαγές, με ρώγες λευκές έως βαθιά ερυθρωπές. Είναι παραγωγική ποικιλία με καλή προσαρμοστικότητα.


Είναι μέσης εποχής ωρίμανσης και είναι ευαίσθητη στα καψίματα από τον ήλιο. Επίσης, είναι ευαίσθητη στον περονόσπορο, στο ωίδιο και πολύ ευαίσθητη στο μολυσματικό εκφυλισμό. Ευδοκίμει σε γόνιμα, δροσερά και αρδευόμενα αργιλοασβεστώδη εδάφη. Παρουσιάζει αρκετή ευαισθησία στην ανθόρροια, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελαφρύ κλάδεμα καρποφορίας και ελαφρό κορυφολόγημα σε συνδυασμό με μείωση της λίπανσης και της άρδευσης. Το κλάδεμα καρποφορίας είναι στους 2-3 οφθαλμούς, ανάλογα με τη ζωηρότητα του πρέμνου.



Ροδίτης

Ροκανιάρης Λευκή ποικιλία που παίρνει το όνομά της από το «ροκάνισμα» της τραγανής ρώγας του. Καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο.


Ρομπόλα. Λευκή ποικιλία. Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ασθένειες αλλά και στην ξηρασία. Η κεντρική Ελλάδα, αλλά κυρίως τα νησιά του Ιονίου είναι οι βασικές περιοχές καλλιέργειάς της, με γνωστότερη όλων την Κεφαλλονιά.



Ρομπόλα

Ρωμέικο Ερυθρή ποικιλία της Κρήτης.

Σαββατιανό Η λευκή ποικιλία Σαββατιανό συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον πολυφυτεμένες του ελληνικού αμπελώνα. Είναι γνωστή και ως Κοντούρα άσπρη, Σαββαθιανό, Σταματιανό, Δρουμπαίνα άσπρη, Περαχωρήτικο, Σακέικο και Τσουμπραίνα άσπρη. Καλλιεργείται κυρίως στην Αττική, Εύβοια, Βοιωτία. Πολύ παραγωγική και μέτρια ζωηρή ποικιλία, στην οποία ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος και ο καρποφόρος βλαστός φέρει 1-2 σταφυλές. Τα σταφύλια της είναι μετρίου μεγέθους, με ρώγες πυκνές έως πολύ πυκνές, σφαιρικές, κίτρινου-λευκού χρώματος. Έχει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. Παρουσιάζει καλή αντοχή στον περονόσπορο αλλά είναι ευαίσθητη στο ωίδιο. Παράγει οινικά προϊόντα ποιότητας σε ξηρά φτωχά και ασβεστούχα χαλικώδη εδάφη. Χάνει τις εξαιρετικές οινοποιητικές της ιδιότητες όταν επιδιώκεται με διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές, όπως με την καλλιέργειά της σε αρδευόμενα και γόνιμα εδάφη, η αύξηση των αποδόσεών της. Θέλει προσοχή στο στάδιο του τρυγητού, γιατί όταν υπερωριμάσει, χάνει εύκολα τα οξέα της. Καρπίζει άφθονα σε κεφάλια των δύο ματιών, δεδομένου ότι οι οφθαλμοί της βάσης, ή ακόμη και ο τυφλός είναι επαρκούς γονιμότητας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Επαναλαμβάνεται ότι η γνωστή ρετσίνα ή αλλιώς ο ρητινίτης οίνος προέρχεται από συνουσιοποίηση του Σαββατιανού με άλλες ποικιλίες (κυρίως ροδίτη), προσθέτοντας κατά την οινοποίηση ρετσίνα από πεύκο. Η ρετσίνα δίνει τη χαρακτηριστική γεύση στο κρασί.



Σαββατιανό

Σέφκα Σκουρόχρωμη ποικιλία.

Σκιαδόπουλο Ιδιαίτερα παραγωγική ποικιλία, το λευκό Σκιαδόπουλο κατέχει σημαντική θέση στον αμπελώνα των Ιονίων νήσων.



Σκιαδόπουλο

Σκυλοπνίχτης Ερυθρωπή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους. Η χοντρή ρώγα και η φλούδα του σκυλοπνίχτη λέγεται ότι πνίγει τα σκυλιά που τη δοκιμάζουν, εξού και το όνομά της. Υπάρχει και λευκός κλώνος.

Σταυρωτό Ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στη Ραψάνη, στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Είναι ποικιλία ζωνή, γόνιμη και παραγωγική. Κλαδεύεται αυστηρά στα δύο μάτια. Ωριμάζει τέλη Σεπτεμβρίου. Ονομάζεται σταυρωτό γιατί το σχήμα του σταφυλιού της μοιάζει με σταυρό.




Σταυρωτό

Συκιώτης Χοντρόφλουδο ερυθρό σταφύλι, φυτεμένο σε αμπελώνες της κεντρικής Ελλάδας.


Τσαούσι Παραγωγική λευκή ποικιλία, που συναντάται στα νησιά του Ιονίου πελάγους και σπανιότερα στη βόρεια Ελλάδα.

Φιλέρι Στην Πελοπόννησο όπου κυρίως καλλιεργείται το φιλέρι, υπάρχει μια οικογένεια από φιλέρια, κόκκινα ή άσπρα και ακόμα μια ιδιαίτερα αξιόλογη παραλλαγή τους το Μοσχοφίλερο. Καλλιεργείται σχεδόν μόνο για οινοποίηση, ενώ τα σταφύλια του τρώγονται ευχάριστα και σαν φρούτα. Είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική ποικιλία. Θέλει εδάφη βαθιά, με αρκετή υγρασία, γόνιμα και δροσερά. Κλαδεύεται στα 2-3 μάτια. Καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο, δυτική Στερεά Ελλάδα και στα νησιά του Ιονίου πελάγους Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά.



Φιλέρι

Φωκιανό Είναι γνωστό και ως Ερικαρά. Ποικιλία Μικρασιατικής προέλευσης. Καλλιεργείται στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και στα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας, με ερυθρές χοντρές ρώγες, που τρώγεται ευχάριστα και σαν φρούτο. Κλαδεύεται στα 2-3 μάτια και κάθε καρποφόρα κληματίδα δίνει 2-3 σταφύλια. Χαρακτηριστικό της ποικιλίας αυτής είναι ότι οι ταχυφυείς βλαστοί δε φέρουν καθόλου καμπανάρια, ενώ όλα σχεδόν τα "κύρια" σταφύλια φέρουν επάνω επάνω ένα μικρό τσαμπί.



Φωκιανό. Διακρίνεται το μικρό τσαμπί.

Χιώτικο Κρασερό Σταφύλι που καλλιεργείται σε νησιά του Αιγαίου.

Χονδρόμαυρο Το χονδρόμαυρο είναι μια ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σπάνια, συνήθως σε αμπελώνες της βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται νέες ερυθρές οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών. Οι ποικιλίες αυτές είναι υψηλής παραγωγικότητας και φέρουν όλες κουκούτσια. Διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους στο ψύχος, στην ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες.



Απόλλων

Απόλλων. Η νέα ερυθρή, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία Απόλλων δημιουργήθηκε το 2003. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας Φιλέρι με την ποικιλία Cabernet sauvignon. Προορίζεται για την παραγωγή ξερών ερυθρών οίνων ανωτέρας ποιότητας.



Δήμητρα

Δήμητρα. Ερυθρή, αρωματική, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία που δημιουργήθηκε το 2001. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας Αγιοργίτικο με την ποικιλία Merlot. Προορίζεται για την παραγωγή ξερών ερυθρών, αφρωδών και γλυκών οίνων.



Ελένη

Ελένη Δημιουργήθηκε το 2001. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας Αγιοργίτικο

με την ποικιλία Cabernet franc.



Ιλιάδα

Ιλιάδα Η νέα ερυθρή, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία Ιλιάδα δημιουργήθηκε το 2001. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας Αγιωργίτικο με την ποικιλία Cabernet sauvignon. Προορίζεται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών οίνων ανωτέρας ποιότητας.




Ακαδημαϊκός Βασίλης Κριμπάς

Ακαδημαϊκός Βασίλης Κριμπάς Η νέα ερυθρή με άρωμα μοσχάτο, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία Ακαδημαϊκός Βασίλης Κριμπάς δημιουργήθηκε το 2001. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας Αγιωργίτικο με την ποικιλία Muscat Alexandreias. Πήρε το όνομά της, προς τιμή του Καθηγητή αμπελουργίας Κριμπά, ο οποίος πριν τον πόλεμο είχε απογράψει και περιγράψει 600 περίπου ποικιλίες αμπέλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ





Αμπελώνας στο ισπανικό νησί Lanzarote των Καναρίων νήσων. Τα Κανάρια νησιά βρίσκονται στον Ατλαντικό ωκεανό, μεταξύ των ακτών της Αφρικής και της Ιβηρικής χερσονήσου. Εκεί αναπτύσσεται η ποικιλία αμπελιού Lanzarote (κοίτα παρακάτω εικόνα), η οποία είναι η πιο διάσημη ποικιλία αμπελιού στην Ισπανία. Πρόκειται για μια από τις πιο αρχαίες ποικιλίες σταφυλιών της Ισπανίας. Το νησί σχηματίστηκε από ηφαιστειακές εκρήξεις πριν από περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια. Ολόκληρο το νησί αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα και άμμο. Δεν υπάρχει πλούσια βλάστηση, μόνο στερεοποιημένη λάβα και απέραντες πεδιάδες με μαύρο χώμα. Ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός όλο το χρόνο και η βροχή είναι σπάνια. Ετησίως κατά μέσο όρο, δεν παρουσιάζονται περισσότερες από 16 ημέρες με βροχοπτώσεις. Είναι εκπληκτικό ότι τίποτα δε φυτρώνει σε αυτό το νησί. Παρόλα αυτά όμως το νησί Λανζαρότ έχει εκτεταμένους αμπελώνες και καλλιεργούνται σταφύλια σε αφθονία.

Κάθε ενιαίο κλήμα φυτεύεται στη βάση μιας βαθιάς τάφρου περίπου ενός μέτρου με περίπου 4-5 πέντε μέτρα πλάτος και περιβάλλεται από ημικυκλικούς πέτρινους τοίχους. Ο λάκκος εξυπηρετεί δύο σκοπούς 1) με το βάθος του, προστατεύοντας τα φυτά από τους ισχυρούς ανέμους και 2) με το ηφαιστειογενές έδαφός του, διατηρώντας την υγρασία απίστευτα καλά και παίρνοντας την υγρασία από τα περιστασιακά σύννεφα που περνούν πάνω, έτσι ώστε ακόμη και όταν δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις, τα φυτά αμπέλου δέχονται


αρκετό νερό για την ανάπτυξή τους. Οι αμπελόλακκοι είναι διάσπαρτοι σε μεγάλες περιοχές του νησιού Lanzarote. Κοιτώντας από μακριά, ολόκληρη η περιοχή μοιάζει σα να έχει πληγεί από χιλιάδες μετεωρίτες. Αυτά τα οπτικά στοιχεία δημιουργούν ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο, με αποτέλεσμα να ελκύει πολλούς τουρίστες. Στο νησί αυτό παράγεται κρασί από το 1500.



Ποικιλία Lanzarote

Οι διεθνείς ποικιλίες αμπέλου έχουν φυτευτεί στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970. Έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν εξαιρετικά κρασιά, είτε κάθε μία μόνη της (μονοποικιλιακά), είτε σε συνδυασμό με γηγενείς ελληνικές ή και άλλες ξένες ποικιλίες αμπέλου. Παρακάτω περιγράφονται οι σπουδαιότερες διεθνείς ποικιλίες οινοποίησης που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

Αρίνθο Arinθο Πορτογαλικής προέλευσης λευκό σταφύλι, το αρίνθο συναντάται στην Πελοπόννησο.



Αρίνθο

Βιονιέ Viognier Η κοιτίδα της σπάνιας και εξαιρετικής ποικιλίας λευκού σταφυλιού Viognier, είναι η κοιλάδα του Ροδανού ποταμού στη Γαλλία. Αν και καλλιεργείται με

αρκετή επιτυχία σε ζεστά κλίματα, όπως αυτά της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Αυστραλίας, της Καλιφόρνιας, της Χιλής, της Αργεντινής και της Ν. Αφρικής, ομολογουμένως, η καλύτερη απόδοση της ποικιλίας, με το μέγιστο αρωματικό δυναμικό επιτυγχάνεται στη Ν. Γαλλία.

Στην Ελλάδα, όπου καλλιεργείται διάσπαρτα σε μικρές εκτάσεις, στην Πελοπόννησο και στη Β. Ελλάδα, εγκλιματίστηκε σχετικά εύκολα. Γενικά είναι απαιτητική ποικιλία διότι έχει μειωμένη ανθεκτικότητα σε ασθένειες, μικρή απόδοση και απρόβλεπτη παραγωγή.



Βιονιέ


Γκεβιρτζτραμίνερ Gewurztraminer, αναφέρεται και ως τραμίνερ. Ποικιλία ιταλικής προέλευσης, με επίκεντρο τη Β. Ιταλία και τη Γαλλική Αλσατία. Δίνει πολύ αρωματικά κρασιά. Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μικρή έκταση στην Αρκαδία και στη Φλώρινα. Η ρίζα της λέξης Gewurztraminer είναι γερμανική (από το gewurz που σημαίνει μπαχαρικό).



Γκεβιρτζτραμίνερ, γνωστή και ως τραμίνερ

Γκρενάς μπλαν Grenache blanc

Grenache blanc


Γκρενάς ρουζ Grenache rouge

Γκρενας ρουζ

Και οι δύο παραπάνω ποικιλίες Grenache rouge και Grenache blanc είναι ισπανικής προέλευσης και καλλιεργούνται στην κεντρική Ελλάδα και στη Πελοπόννησο. Χρησιμοποιούνται σαν βελτιωτικές πολλών κρασιών.

Μερλό Merlot Ερυθρή ποικιλία, γαλλικής προέλευσης, καλλιεργούμενη στην περιοχή του

Bordeaux, η οποία κατέλαβε τα τελευταία χρόνια σημαντικές εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα καλλιεργείται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Ζωηρή, μέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στον περονόσπορο και στο βοτρύτη. Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας της στην ξηρασία, απαιτεί κανονική τροφοδοσία με νερό κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Η πρόωμη έκπτυξη των οφθαλμών της την καθιστούν ευαίσθητη στους παγετούς της άνοιξης. Παρουσιάζει τάση για ανθόρροια και ανισορραγία όταν οι καιρικές συνθήκες κατά την άνθηση δεν είναι καλές (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις), αλλά και λόγω υπερβολικής ζωηρότητας. Ξεκινά τη βλάστηση πρώιμα στα μέσα του Μάρτη και ωριμάζει τέλη Αυγούστου. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 2 σταφύλια μέτρια. Το Merlot συμμετέχει στην Παραγωγή αρκετών Τοπικών Οίνων (Αγοριανός, Δράμας, Επανωμίτικος κ.ά.).




Merlot

Μοντεπουλτσιάνο Είναι ερυθρή ποικιλία και κατάγεται από την Ιταλία. Απαντάται ελάχιστα

σε αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας.

Μουρβέντρ. Είναι φυτεμένη στη Βόρειο Ελλάδα, στη Πελοπόννησο και στην Κρήτη.



Μουρβέντρ

Μπαρμπέρα Ερυθρή ποικιλία, η μπαρμπέρα καλλιεργείται σε περιορισμένη έκταση σε αμπελώνες της Β. Ελλάδας.

Νεγκροαμάρο Ερυθρή ποικιλία της νότιας Ιταλίας, το νεγκροαμάρο έχει φυτευτεί πειραματικά σε αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας.

Νεμπιόλο Ερυθρή ποικιλία. Καλλιεργείται στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ugni Blanc Ούνι μπλάν Πολυκλωνική ποικιλία ιταλικής προέλευσης και μεγάλης παραγωγικότητας, από τις πλέον καλλιεργούμενες σε όλο τον κόσμο.

Καλλιεργείται αποτελεσματικά κυρίως στην Ιταλία και τη Γαλλία και σε μικρότερο βαθμό στην Αυστραλία, την Καλιφόρνια, την Αργεντινή κ.ά.

Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μικρή έκταση ξεκινώντας την δεκαετία του 80', κυρίως στις Π.Ε Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου, Αχαΐας, Ηλείας και Λακωνίας. Λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας στη χώρα μας, μπορεί να υπολείπεται σε οξύτητα και άρωμα, ώστε να χρησιμοποιηθεί από μόνη της, αλλά συμμετέχει στην παραγωγή αρκετών τοπικών οίνων.



Ούνι μπλάν

Πινό νουάρ Pinot noir Καλλιεργείται στη βόρειο Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, κυρίως σε ψυχρές περιοχές.



Πινό νουάρ

Ρεφόσκο Ερυθρή ποικιλία ιταλικής προέλευσης. Καλλιεργείται στην Πελοπόννησο, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Ρίσλινγκ Riesling Κατάγεται από τη Γερμανία όπου και καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση. Είναι πολύ αξιόλογη ποικιλία. Καλλιεργείται επίσης στη Γαλλία, Αυστρία, στο Λουξεμβούργο, στη Β. Ιταλία, καθώς και σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα και Ουκρανία, κατά κανόνα σε ψυχρές περιοχές, όπου και προσαρμόζεται καλύτερα. Για αυτόν το λόγο δε θα την πολυσυναντήσουμε στην Ν. Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα όπου καλλιεργείται περιορισμένα σε κάποιες περιοχές, κυρίως στη Μακεδονία στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο.



Riesling

Σαρντονέ Chardonnay



Σαρντονέ

Το Chardonnay αποτελεί πιθανότατα την πιο γνωστή και ευρέως διαδεδομένη λευκή ποικιλία οινάμπελου στον κόσμο και όχι αδίκως, το έχουν αποκαλέσει «βασιλιά των λευκών». Κατάγεται από τη Βουργουνδία της Α. Γαλλίας και οφείλει το όνομά του στο ομώνυμο χωριό, η ονομασία του οποίου προέρχεται από τη λατινική λέξη «chardonnacum», που σημαίνει «μέρος γεμάτο γαϊδουράγκαθα». Προέρχεται από τη διασταύρωση των ποικιλιών Pinot και Gouais Blanc.

Πολύμορφη και πολυδύναμη ποικιλία το Chardonnay, συμμετέχει σε πολλά αξιολογα κρασιά της Β. Γαλλίας και της Βουργουνδίας, δίνοντας σπουδαία λευκά αρωματικά κρασιά. Στην Καμπανία, είναι η λευκή ποικιλία που συμμετέχει στην παραγωγή της σαμπάνιας και ειδικά της καλύτερης ποιότητας, της Blanc des Blanc.

Η προσαρμοστικότητα του Chardonnay σε μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων, εδαφών και τεχνικών οινοποίησης είναι πρωτοφανής, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται σχεδόν σε όλες τις οινοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, σε ψυχρά και θερμά κλίματα, προσφέροντας μια εντυπωσιακή ποικιλομορφία από παραγόμενους οίνους.

Τα Chardonnay των ψυχρών κλιμάτων, δίνουν κρασιά με μέτριο αλκοολικό τίτλο και υψηλή οξύτητα. Τα Chardonnay των θερμών κλιμάτων, όπως αυτά που παράγονται στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο νότο της Γαλλίας και στην Αυστραλία, παρουσιάζουν υψηλότερο αλκοολικό τίτλο και χαμηλότερη οξύτητα. Όταν η ζύμωση ή η ωρίμανση γίνει σε βαρέλι μαζί με τις οινολάσπες, το κρασί παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αρώματα ξύλου και βανίλιας.

Γενικά το Chardonnay δίνει λευκά κρασιά, από ξηρά ημίγλυκα μέχρι και αφρώδη και με ποικίλα αρώματα ανάλογα με τη μέθοδο της οινοποίησης και την περιοχή.

Στην Ελλάδα που ομολογουμένως έχει προσαρμοστεί περίφημα, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και πλέον καλλιεργείται στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και στην Κρήτη.

Semillon Ποικιλία γαλλικής προέλευσης, που καλλιεργείται εκτός από τη Γαλλία, στην Αυστραλία, στη Χιλή, στην Αργεντινή, στη Νότια Αφρική και στη Νέα Ζηλανδία, αλλά το επίκεντρο της καλλιέργειας είναι η περιοχή του Bordeaux της Γαλλίας. Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μικρό βαθμό, κυρίως στη Μακεδονία. Είναι ποικιλία σχετικά αποδοτική

και εύκολη στην καλλιέργεια, καθώς και αρκετά ανθεκτική σε πολλές ασθένειες.




Semillon

Καμπερνέ σοβινιόν Cabernet sauvignon Το καμπερνέ σοβινιόν είναι για πολλούς οινογνώστες και καταναλωτές ο βασιλιάς των ερυθρών ποικιλιών. Έγχρωμη γαλλική ποικιλία, καλλιεργούμενη στην περιοχή Bordeaux και Medoc. Στη χώρα μας μετά από τα πρώτα αποτελέσματα πειραματισμού, συνιστάται για τις περιοχές των Π.Ε Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Αχαΐας και Μεσσηνίας. Ποικιλία μέσης πρωιμότητας, ζωνηρή, μέτρια παραγωγική. Αξιοποιεί πτωχά, ξηρά εδάφη.



Καμπερνέ σοβινιόν

Καμπερνέ φραν Cabernet franc Καλλιεργείται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.



Καμπερνέ φραν

Καρινιάν Carignan Το καρινιάν είναι μια παραγωγική ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.




Carignan

Μακαμπέο Macabeo Καλλιεργείται στην κεντρική Ελλάδα.



Macabeo

Μαλβάζια *Malvasia aromatica**Malvasia aromatica*

Malvasia candia οι δύο ποικιλίες *Malvasia* (*candia* και *aromatica*) καλλιεργούνται ευρέως στην Ιταλία. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται κυρίως στην Κρήτη και στη Πελοπόννησο. Δίνουν κρασιά υψηλόβαθμα με διακριτικά αρώματα.

*Malvasia candia***Cinsault Σενσό**

Μια από τις παλαιότερες ξένες ποικιλίες που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα. Ερυθρή ποικιλία μεγάλης ζωηρότητας και μεγάλων αποδόσεων. Δέχεται κοντό κλάδεμα σε 2 - 3 οφθαλμούς και είναι ευαίσθητη στην ίσκα και στην ευτυπύωση. Ευδοκίμει κυρίως στην Πελοπόννησο,

αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Κυκλάδες και Θράκη.



Cinsault

Σιλβάνερ Sylvaner Λευκή ποικιλία, αυστριακής προέλευσης, καλλιεργούμενη στην κεντρική Ευρώπη. Στη χώρα μας συνιστάται η καλλιέργειά της στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και Κρήτης.

Σιρά Syrah



Σιρά

Έγχρωμη γαλλική ποικιλία, συνιστώμενη στη χώρα μας για την ενίσχυση του ποικιλιακού δυναμικού των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Δωδεκανήσου. Είναι γνωστή και με τα συνώνυμα Petit Sirah, Serine.

Σοβινιόν μπλαν Sauvignon blanc Το Sauvignon Blanc είναι μία εκλεκτή και κοσμοπολίτικη γαλλική ποικιλία, που μας δίνει κάποια από τα δημοφιλέστερα και τα ποιοτικότερα ξηρά

λευκά κρασιά του κόσμου. Εκτός από τη Γαλλία, το συναντάμε συχνά στην Ισπανία, στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να έχουμε κρασιά με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες, που οφείλονται κυρίως στο κλίμα αλλά και στην διαχείριση του αμπελώνα.

Στην Ελλάδα, πρωτοήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 80 και καλλιεργείται σε πολλές περιοχές, από στη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη, παρουσιάζοντας μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων.



Σοβινιόν μπλάν

Τανάτ Tannat Ποικιλία με μεγάλη ζυμρότητα, πρώιμης έκπτυξης και μέσης εποχής ωρίμανσης με καλή παραγωγή. Διαμορφώνεται σε γραμμικά συστήματα. Δίνει ξηρά κρασιά με έντονο βαθύ κόκκινο χρώμα.



Τανατ

Τεμπρανίγιο Η ισπανική ερυθρή ποικιλία τεμπρανίγιο απαντάται σπάνια σε αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου πελάγους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ



Αποξήρανση σταφίδας στη σκιά, στην περιοχή της Νεμέας

ΓΕΝΙΚΑ

Η Κορινθιακή σταφίδα είναι ένα προϊόν συνυφασμένο με την ιστορία της χώρας μας. Αποτελεί το πρώτο, από άποψη αρχαιότητας, εθνικό προϊόν. Είναι εκείνο το προϊόν στο οποίο οφείλετο για πάρα πολλά χρόνια η ευημερία της χώρας μας και το προϊόν το οποίο στήριξε τη χώρα μας σε περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων. Η Κορινθιακή σταφίδα επηρέασε τόσο όσο κανένα άλλο αγροτικό προϊόν την πολιτική, πολιτιστική και οικονομική εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας.

Η καλλιέργεια της σταφίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται κυρίως στην Ελλάδα (Κορινθιακή, Σουλτανίνα) και δευτερευόντως στην Ισπανία (όπου καλλιεργείται η ποικιλία Moscatel). Η Ελλάδα με άλλα λόγια έχει το μονοπώλιο στην καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας.

Σταφίδα επίσης παράγεται και από την ποικιλία αμπέλου Σουλτανίνα. Επειδή η Σουλτανίνα καταναλώνεται και ως επιτραπέζια, η ποικιλία αυτή αναλύεται στο κεφάλαιο των επιτραπέζιων ποικιλιών. Η σταφίδα που παράγεται από τη Σουλτανίνα είναι γνωστή και ως λευκή σταφίδα, ενώ η σταφίδα που παράγεται από την Κορινθιακή σταφίδα είναι γνωστή ως μαύρη σταφίδα.

Η καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας στην Ελλάδα είναι πολύ παλιά και αναφέρεται στην Οδύσσεια και στον Αριστοτέλη. Η μεγάλη εξάπλωση της καλλιέργειας έγινε την περίοδο του 16^{ου} και 19^{ου} αιώνα. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, η Κορινθιακή σταφίδα αποτελούσε το 75% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών για τουλάχιστον 50 χρόνια και βοήθησε στον αστικό μετασχηματισμό της Ελλάδας.



Άπλωμα σταφυλιών στον ήλιο


Έως σήμερα υπάρχουν δύο τύποι Κορινθιακής σταφίδας που έχουν αναγνωρισθεί ως προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και ένας ως Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.):

1. Η Κορινθιακή σταφίδα που παράγεται στην περιοχή της Αιγιάλειας του Νομού Αχαΐας με την ονομασία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΒΟΣΤΙΤΣΑ» (Π.Ο.Π.).
2. Η Κορινθιακή σταφίδα που παράγεται στο Νομό Ζακύνθου, με την επωνυμία «ΣΤΑΦΙΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (Π.Ο.Π.).
3. Η Κορινθιακή σταφίδα που παράγεται στο Νομό Ηλείας έχει αναγνωρισθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) με την ονομασία «ΣΤΑΦΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ»

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η Κορινθιακή σταφίδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι προσαρμοσμένη σε ξηρές συνθήκες, χωρίς άρδευση, όπου μπορεί να παράγει επαρκώς για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης είναι πολύ παραγωγική ποικιλία, δεδομένου ότι είναι γόνιμη και η τσίμπλα.

Αποτελεί προϊόν βλαστικής μεταλλαγής της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου Λιάτικο. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η απουσία κουκουτσιών από τις ρώγες της και έτσι χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερη ποικιλία αμπέλου *Vitis vinifera varietas apyrena*. Η Κορινθιακή σταφίδα έχει τρεις υποποικιλίες: τη μαύρη, τη λευκή και την ερυθρά. Σε μεγαλύτερη έκταση καλλιεργείται η μαύρη Κορινθιακή, η οποία είναι πιο παραγωγική. Η λευκή απαντά διάσπαρτα κατά κύριο λόγο στους αμπελώνες της Ζακύνθου. Η κόκκινη που είναι μικρότερης παραγωγικότητας, σπανίζει και απαντάται σποραδικά στην Κεφαλονιά.



Λιάτικο



Σταφιδαμπελώνας στο Αίγιο Αχαΐας

Η Κορινθιακή σταφίδα είναι ζωηρότατη και παραγωγικότετη ποικιλία και καρποφορεί ακόμα και σε ξερό ξύλο. Η ταξιανθία είναι μετρίου μεγέθους, συνήθως διπλή. Η ρώγα είναι μικρή, σφαιρική, με φλοιό λεπτό, μαλακό, χρώματος ομοιόμορφου κυανομελανού. Μετά την ωριμότητα η σάρκα είναι μαλακή, άχρωμη, με γλυκιά και ευχάριστη γεύση και ελαφρά αρωματική. Ένα ποσοστό περίπου 98% των ρωγών δεν έχουν κουκούτσια.

Οι εγίγαρτες ρώγες είναι μεγάλες και θεωρούνται κακής ποιότητας προϊόν. Ο κορμός του πρέμνου είναι πολύ ισχυρός. Η ωρίμανση αρχίζει από τις αρχές Αυγούστου στα πεδινά και φτάνει μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη στα ορεινά. Ευδοκίμει σε εδάφη ελαφριά, καλώς στραγγιζόμενα, έστω και χαλκώδη, όπου έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Είναι καλλιέργεια ευαίσθητη στα παθογόνα (περονόσπορο, ωίδιο, ίσκα, ευδεμίδα) και γι' αυτό απαιτεί ιδιαίτερο κόπο.



Σταφίδα απλωμένη στο αλώνι. Εάν βρέξει, η σταφίδα, φυσικά, σκεπάζεται



Αποξήρανση σταφίδας υπό σκιά. Μετά τον τρύγο, τα σταφύλια πρέπει να μεταφερθούν στις «Ιστιάδες», διαμορφωμένοι από τον παραγωγό χώρος με μόνιμη σκιά, και να κρεμαστούν ένα προς ένα σε σύρματα, με μεγάλη προσοχή για να μην σπάσει ούτε ρώγα. Ο παραγωγός πρέπει να έχει καθημερινή παρουσία στο χώρο αποξήρανσης. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται 30 με 50 ημέρες και στη συνέχεια ο παραγωγός ξεκρεμά τα σχεδόν αποξηραμένα σταφύλια και τα τοποθετεί για 1 ημέρα κάτω απ' τον ήλιο για να ολοκληρωθεί η αποξήρανση. Να σημειωθεί ότι η αποξήρανση στον ήλιο (στα λεγόμενα αλώνια) διαρκεί μόλις έως 15 ημέρες. Η ουσιαστική διαφορά της αποξήρανσης στη σκιά είναι ότι τα σταφύλια δεν εκτίθενται στις βλαβερές ηλιακές υπεριώδεις ακτινοβολίες και επομένως οφείλουν την αβίαστη αποξήρανσή τους στα ρεύματα αέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, η Κορινθιακή σταφίδα «Σκιάς» έχει ομοιόμορφο σκούρο μπλε/μαύρο χρώμα, «γεμάτο» σώμα, φρουτένια γεύση (χωρίς καραμελοποιημένα σάκχαρα) και αυθεντικά αρώματα Κορινθιακής σταφίδας.



Ο τρύγος γίνεται εφόσον τα σταφύλια έχουν φτάσει τους 15 βαθμούς Baume

Γενικά η **σταφίδα** ζει και αποδίδει σε όλους τους τύπους των εδαφών εκτός των πολύ υγρών και αλατούχων. Προτιμώνται όμως τα μέσης σύστασης εδάφη τα οποία έχουν ελαφρά μηχανική σύσταση και είναι καλά στραγγιζόμενα. Δίνει άριστο προϊόν καλλιεργούμενη σε λόφους και πλαγιές με εδάφη ασβεστούχα, ενώ σε πλούσιους και γόνιμους κάμπους αποδίδει καρπό κατώτερης ποιότητας.



Συσκευαστήριο σταφίδας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ



Αμπέλι εμβολιασμένο αριστερά: σε βαθύριζο υποκείμενο, δεξιά: σε επιπολαιόριζο υποκείμενο

GRAPE VINE GRAFTING



Rootstock: Υποκείμενο, Scion: Εμβόλιο, Graft: Εμβολιασμός

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

Οι ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου (η ευρωπαϊκή άμπελος ανήκει στο είδος *V. vinifera* L.) καλλιεργούνταν αυτόρριζες, δηλαδή χωρίς εμβολιασμό, για πάρα πολλούς αιώνες σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές της Ευρώπης μέχρι την εισβολή από την Αμερική της αφίδας της φυλλοξήρας (*Ductylosphaera vitifolae*).

Η φυλλοξήρα έχει τη φυλλόβια γενεά, που προσβάλλει τα φύλλα και τη ριζόβια γενεά που προσβάλλει τις ρίζες. Η ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας προσβάλλει τις ρίζες των αυτόρριζων πρέμνων του είδους *V. vinifera* με συνέπεια την ξήρανσή τους. Μετά την εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη και την καταστροφή των αμπελώνων, η συνέχιση της καλλιέργειας της αμπέλου έγινε με τη χρήση των γνωστών αμερικάνικων υποκειμένων τα οποία είναι ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας. Έτσι, εμβολιάζοντας την ευρωπαϊκή άμπελο (που είναι ευαίσθητη στη ριζόβια και ανθεκτική στη φυλλόβια φυλλοξήρα) σε αμερικάνικο υποκείμενο (που είναι ανθεκτικό στη ριζόβια φυλλοξήρα και ευαίσθητο στη φυλλόβια), το καινούργιο φυτό είναι ανθεκτικό στη φυλλοξήρα.

Τα αμερικάνικα υποκείμενα:

- Ανήκουν στα είδη *V. berlandieri*, *V. rupestris*, *V. riparia*, τα οποία είναι ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας

ή

- Προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ των ειδών *Vitis vinifera*, *Vitis berlandieri*, *V. rupestris* και *V. riparia*.

Σήμερα, οι περισσότεροι αμπελώνες στον κόσμο, είναι εγκατεστημένοι με φυτά στα οποία η ευρωπαϊκή άμπελος είναι εμβολιασμένη σε αμερικάνικα υποκείμενα. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι αρκετές ελληνικές ποικιλίες όπως το Αηδάνι, το Σαββατιανό και η Σουλτανίνα παρουσιάζουν ευαισθησία και στη φυλλόβια φυλλοξήρα.



Προσβολή αμπέλου από την αφίδα της φυλλοξήρας (επάνω εικ.) η οποία απομυζά τους χυμούς. Στην Ευρώπη η φυλλοξήρα πρωτοεμφανίστηκε το 1867 σε αμπελώνες της Γαλλίας. Όταν η φυλλοξήρα ήρθε στην Ευρώπη, οι ποικιλίες αμπέλου που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν έρθει σε επαφή με το παράσιτο αυτό, υπέκυψαν. Μέσα σε λίγα χρόνια η φυλλοξήρα κατέστρεψε εκατομμύρια στρεμμάτων αμπελώνων, αρχικά στη Γαλλία και ακολούθως στην Ιταλία και στην Ισπανία. Στην κάτω εικ. φαίνεται φύλλο αμπέλου προσβεβλημένο από φυλλοξήρα.

Παλιά, πριν εμφανιστεί η φυλλοξήρα, που τα αμπέλια πολλαπλασιάζοντο με μοσχεύματα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χωρίς δηλαδή να εμβολιάζονται σε αντιφυλλοξηρικά αμερικάνικα υποκείμενα, τα αμπέλια ευδοκίμουν σε κάθε είδους έδαφος, συμπαγές ή χαλκώδες, βαρύ ή ελαφρό, ξερό ή υγρό, με μικρή ή με μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Σήμερα όμως που τα αμπέλια εμβολιάζονται σε αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα, πριν επιλεγθεί το υποκείμενο πρέπει να γίνει ανάλυση εδάφους για να προσδιοριστεί το pH του, η μηχανική του σύσταση, η περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο κλπ. διότι τα αμερικάνικα υποκείμενα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, δεν ευδοκίμουν σε όλους τους τύπους των εδαφών. Μια άλλη σημαντική επίπτωση του εμβολιασμού είναι ότι τα πρέμνα που είναι εμβολιασμένα σε αμερικάνικα υποκείμενα έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια παραγωγικής ζωής από τις αυτόρριζες ποικιλίες (κατά μέσο όρο 30 έτη έναντι 70-80 ετών).

Στις φυλλοξηριώσες περιοχές, η εκλογή του κατάλληλου υποκειμένου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του αμπελώνα. Το υποκείμενο πρέπει να παρουσιάζει καλή προσαρμοστικότητα στο οικολογικό περιβάλλον, απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδηλώσει τις ιδιότητές του και συγχρόνως, η συμβίωσή του με την ποικιλία πρέπει να είναι αρμονική, ώστε κάθε επίδρασή του στην καλλιεργητική συμπεριφορά της ποικιλίας να είναι επωφέλης.

Επειδή ο ρόλος των υποκειμένων στη σύγχρονη Αμπελουργία είναι πολύ σημαντικός, ο κατάλογος των χρησιμοποιούμενων υποκειμένων στις διάφορες αμπελουργικές χώρες συνεχώς διευρύνεται και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακάτω περιγράφονται τα αμερικάνικα υποκείμενα αμπέλου που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας.

Richter No 110, (R110)

Προέρχεται από τη διασταύρωση *V.berlandieri* X *V.rupestris*. Το υποκείμενο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα μας γιατί είναι κατάλληλο για εδάφη ξηρά, αργιλασβεστώδη, συνεκτικά, με αντοχή στο ανθρακικό ασβέστιο 40-45% σε ολικό και 17-22% σε ενεργό. Υποκείμενο ζωνό, κατάλληλο για ποικιλίες μέσης πρωιμότητας ή και όψιμες επιτραπέζιες, με υψηλή αντοχή στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας, ευαίσθητο όμως στους νηματώδεις. Από τη μέχρι τώρα αμπελοκομική εμπειρία στη χώρα μας, δεν παρουσίασε προβλήματα αρμονικής συμβίωσης κατά τον εμβολιασμό του με τις καλλιεργούμενες στη χώρα μας ελληνικές και ξένες ποικιλίες αμπέλου. Η επιτυχία στον επί τόπου εμβολιασμό είναι υψηλή. Έχει ιδιαίτερα πλούσιο ριζικό σύστημα, όμως το ποσοστό

επιτυχίας ριζοβόλησης στο φυτώριο είναι σχετικά μικρό και η παραγωγή ξύλου στη μητρική φυτεία παρουσιάζει προβλήματα εξαιτίας της μη καλής ξυλοποίησης.



Richter 110

140 Ruggeri (140Ru)



Ruggeri 140

Κατάγεται από την Ιταλία. Προέρχεται από τη διασταύρωση *V.berlandieri* X *V.rupestris*. Υποκείμενο με εξαιρετικές ιδιότητες. Είναι πολύ ζωντανό υποκείμενο και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του εμβολίου. Είναι πολύ ανθεκτικό στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας και στην ίσκα.

Συνιστάται σε πτωχά, συνεκτικά, αβαθή, ξηρά εδάφη με περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο έως 80% σε ολικό και έως 40% σε ενεργό. Το ποσοστό ριζοβόλησης στο φυτώριο ανέρχεται σε 30-35%, ενώ η παραγωγή ξύλου στη μητρική φυτεία είναι καλή. Δεν παρουσιάζει προβλήματα ασυμφωνίας κατά τον εμβολιασμό του με τις ευρωπαϊκές ποικιλίες αμπέλου. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα μας.

Paulsen 1103, (P1103)

Paulsen 1103

Κατάγεται από την Ιταλία. Προέρχεται από τη διασταύρωση *V.berlandieri* X *V.rupestris*. Το υποκείμενο αυτό συνδυάζει πολύ καλές ιδιότητες. Είναι ανθεκτικό στα χλωριούχα άλατα. Συνιστάται σε εδάφη αργιλώδη, ξηρά, ρηχά, πτωχά, με περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο μέχρι 40-50% σε ολικό και μέχρι 20% σε ενεργό. Είναι πολύ ζυηρό υποκείμενο, γρήγορης ανάπτυξης, με καλές αποδόσεις σε ξύλο στις μητρικές φυτείες και ριζοβόλησης στο φυτώριο. Συνιστάται για ποικιλίες που μορφώνονται σε γραμμικά και κρεβατίνες. Στη χώρα μας δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες εκτάσεις.

41 B.

Προέρχεται από διασταύρωση της ευρωπαϊκής αμπέλου Chasselas με το *V. berlandieri*. Υποκείμενο εξαιρετικά χρήσιμο για την ελληνική αμπελουργία. Είναι ευρύτατα διαδεδομένο σε περιοχές με ασβεστούχα εδάφη όπου η περιεκτικότητα του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο είναι έως 75% σε ολικό και έως 40% σε ενεργό. Είναι ευαίσθητο στα αλατούχα εδάφη και μέτρια ανθεκτικό στην ξηρασία. Η αντοχή του στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας είναι ικανοποιητική, όμως παρουσιάζει ευαισθησία στους νηματώδεις και στον περονόσπορο. Η παραγωγή ξύλου στις μητρικές φυτείες είναι μικρή. Επίσης μικρό είναι το ποσοστό επιτυχίας ριζοβόλησης στο φυτώριο (15-25%). Κανονικής ζωνρότητας υποκείμενο, συνιστάται για τις πρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες και μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μη αρμονικής συμβίωσης με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, ελληνικές και ξένες.



Ποικιλία αμπέλου Chasselas



41 B

Fercal

Νέο σχετικά υποκείμενο, δημιουργήθηκε στη Γαλλία πριν λίγα χρόνια και στη χώρα μας εισήχθηκε για πειραματισμό τα τελευταία χρόνια. Προέρχεται από διασταύρωση του *Vitis*

berlandieri X Richter. Οι ιδιότητές του είναι παρεμφερείς με αυτές του 41B, σε αυξημένα όρια. Έτσι, είναι περισσότερο ανθεκτικό στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας και στους νηματώδεις. Είναι επίσης περισσότερο ανθεκτικό στην ξηρασία και η αντοχή του στην παρουσία ανθρακικού ασβεστίου είναι μεγαλύτερη.



Fercal

420 A, Millardet et De Grasset (420 A).

Προέρχεται από διασταύρωση του *Vitis berlandieri* X *V. riparia*. Παρά τις καλές ιδιότητες που έχει, αν και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα και στη χώρα μας, μάλλον δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εμβολιασμό και ευπάθειας στην ξηρασία. Επίσης αναφέρθηκε περίπτωση μη αρμονικής συμβίωσης με την ποικιλία Μαυρορωμαίκο. Συνιστάται για δροσερά, γόνιμα εδάφη περιεκτικότητας 40-50% και 20% σε ολικό και ενεργό ανθρακικό ασβέστιο αντίστοιχα. Μέτριας ζωρότητας, δίνει άφθονο ξύλο στη μητρική φυτεία, παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό ριζοβόλησης στο φυτώριο αλλά μέτριες επιδόσεις στον εμβολιασμό. Η χρησιμοποίηση του υποκειμένου αυτού στη χώρα μας πρέπει να γίνεται μετά από μελέτη.

Rupestris du lot.

Είναι ποικιλία του είδους *V. rupestris*. Ανθεκτικό στη ριζόβια μορφή αλλά ευαίσθητο στη φυλλόβια μορφή της φυλλοξήρας. Ευαίσθητο στις ιώσεις, δείχνει ικανοποιητική αντοχή στον περονόσπορο και μέτρια στους νηματώδεις. Έχει μικρό ετήσιο κύκλο βλάστησης, γι' αυτό συνιστάται σε ζεστά κλίματα και σε εδάφη βαθιά, δροσερά, αλλά όχι υγρά διότι είναι υπερβολικά ευαίσθητο στις σηψιρριζίες. Η αντοχή του στο ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους είναι 40% σε ολικό και 14% σε ενεργό, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αντοχή του στα άλατα του εδάφους. Ζωηρό υποκείμενο δίνει μέτρια παραγωγή ξύλου στη μητρική φυτεία, ενώ η ριζοβόλησή του στο φυτώριο είναι καλή (50-60%). Έχει ικανοποιητική συμπεριφορά στον εμβολιασμό. Είναι αρκετά διαδεδομένο στη χώρα μας, ειδικά για ποικιλίες επιτραπέζιας χρήσης και ποικιλίες οινοποιίας υψηλών αποδόσεων.

SO4



SO4

Προέρχεται από διασταύρωση του *Vitis berlandieri* X *V. riparia*. Κατάγεται από τη Γερμανία. Είναι αρκετά ανθεκτικό στους νηματώδεις, ιδιότητα που το καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο υποκείμενο. Αντέχει σε παρουσία ενεργού ανθρακικού ασβεστίου έως 18% και είναι ευαίσθητο στην ξηρασία. Δείχνει πολύ καλή συμπεριφορά στην παραγωγή ξύλου στη μητρική φυτεία, σε ποσοστό ριζοβόλησης και στον εμβολιασμό.



Μοσχεύματα αμερικάνικων υποκειμένων τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε υπαίθριο φυτώριο, προκειμένου να ριζοβολήσουν.



Vitis rupestris



Vitis berlandieri



Vitis riparia

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ



Η εγκατάσταση ενός νέου αμπελώνα αποτελεί ένα πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο απαιτεί την προσεκτική καταγραφή και διερεύνηση μιας σειράς παραγόντων. Με δεδομένο μάλιστα ότι η καλλιέργεια του αμπελιού είναι πολυετής, κάθε λάθος ή παράλειψη κατά τη φύτευση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρόνου και χρήματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Σε περίπτωση που πρόκειται να εγκατασταθεί ένας μεγάλος -επιχειρηματικός- αμπελώνας, η πρώτη ενέργεια πρέπει να είναι η καταγραφή της έκτασης μέσω ενός τοπογραφικού σχεδίου και με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών. Το σχέδιο αυτό θα δείξει ποιες τοποθεσίες είναι ασύμφορες από οικονομικής πλευράς να φυτευτούν λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. μεγάλες κλίσεις, πετρώδη εδάφη, κ.λπ.), ποια αγροτεμάχια θα χρειαστούν παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ποιες θα είναι αυτές (πεζούλες, αποστραγγιστικά κ.λπ.), καθώς και μια εκτίμηση του δυναμικού του κάθε κομματιού ανάλογα με την έκθεση και τη θέση του (έκθεση στον ήλιο, πρόποδες-πλαγιά, κλειστές κοιλάδες, υδάτινοι όγκοι κ.ά.). Παράμετροι όπως το ύψος των βροχοπτώσεων, οι θερμοκρασίες, η ηλιοφάνεια, η γειτνίαση με υδάτινους όγκους και δάση, οι κλειστές κοιλάδες και οι επικρατούντες άνεμοι, καθώς και η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, θα βοηθήσουν στις αποφάσεις.

Το ύψος των βροχοπτώσεων σε μια περιοχή δε θεωρείται γενικά ως κριτήριο επιλογής τόπου για την εγκατάσταση ενός αμπελώνα, αλλά επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή σταφυλιών. Βροχοπτώσεις κατά την ωρίμανση καταστρέφουν την παραγωγή.

Υψόμετρο Το υψόμετρο επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις μεγάλου υψομέτρου (πάνω από 700-800 μέτρα) ο παράγοντας αυτός πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την επιλογή της ποικιλίας. Δηλαδή πρέπει να επιλέγονται ποικιλίες με όψιμη έκπτυξη των οφθαλμών τους την άνοιξη και με πρώιμη ωρίμανση των καρπών τους. Επίσης το χειμώνα, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν πρέπει η θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους -15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα το αμπέλι ζει μέχρι τα 1000 μέτρα υψόμετρο, στις πλαγιές των βουνών.

Επίσης πεδινές περιοχές με υψηλή ζέστη το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, μειώνουν την ποιότητα των οινοποιήσιμων σταφυλιών και στη συνέχεια του κρασιού, διότι επιταχύνεται η ωρίμανση των σταφυλιών και τα κρασιά είναι φτωχά σε "φρουτώδη" αρώματα.

Γενικά, το αμπέλι είναι φυτό των εύκρατων περιοχών. Καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές από 35° έως 50° γεωγραφικό πλάτος. (Το γεωγραφικό πλάτος της χώρας μας είναι από 35 έως 42 μοίρες). Οι πολυάριθμες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, έχουν διαφορετικές θερμικές απαιτήσεις για την πλήρη ωρίμανση της παραγωγής τους. Δηλαδή, το άριστο θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο κάθε ποικιλία “αποδίδει” τα άριστα οινοποιητικά της χαρακτηριστικά είναι διαφορετικό από ποικιλία σε ποικιλία. Γι’ αυτό, όταν η καλλιέργεια της αμπέλου αποσκοπεί στην παραγωγή οίνων ποιότητας θα πρέπει οι κλιματικές (και κυρίως οι θερμικές) απαιτήσεις της ποικιλίας που πρόκειται να φυτευτεί, να συνάδουν με το τοπικό κλίμα. Έτσι, η επιλογή ποικιλίας με μικρές θερμικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου της, δηλαδή μια πρώιμη ποικιλία, εάν καλλιεργηθεί σε μια περιοχή με μεγάλη βλαστική περίοδο, θα έχει σαν αποτέλεσμα απότομη αύξηση των σακχάρων, απώλεια οξέων και ασύγχρονη ωρίμανση των τμημάτων της ρώγας. Αντίστροφα, η επιλογή ποικιλίας με μεγάλες θερμικές απαιτήσεις, δηλαδή με μεγάλο ετήσιο κύκλο, σε μια ήπια-ψυχρή κλιματική περιοχή οδηγεί σε ανεπαρκή ωρίμανση και σε έλλειψη αρωμάτων στον οίνο. Εξάλλου, στις περισσότερες παραδοσιακές οινοπαραγωγικές περιοχές του παλαιού οινικού κόσμου (δηλαδή εκεί που καλλιεργείται το αμπέλι από πολύ παλιά), οι τοπικές ποικιλίες κάθε περιοχής ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και φτάνουν στην πλήρη ωρίμανση της παραγωγής τους κατά τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι οι πλέον κατάλληλες για την ωρίμανση των σταφυλιών (π.χ. Pinot noir στη Βουργουνδία, Riesling στην Αλσατία, Merlot στο Bordeaux, Sangiovese στην Τοσκάνη, Ξινόμαυρο στη Νάουσα, Αγιωργίτικο στη Νεμέα, Μοσχοφίλερο στη Μαντινεία, Ξυνιστέρι στην Κύπρο κ.λπ.).

Κλίση εδάφους Η κλίση του εδάφους του μελλοντικού αμπελώνα επηρεάζει τη διάβρωση του εδάφους, την ποσότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και τη διάταξη των γραμμών του αμπελιού. Έτσι, αν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 20%, η κατασκευή αναβαθμίδων είναι σχεδόν επιβεβλημένη για τη μείωση της έντονης διάβρωσης και για την καλύτερη συγκράτηση των νερών της βροχής, ενώ για κλίσεις μικρότερες από 10% η καλλιέργεια μπορεί να γίνει κατά τη διεύθυνση της κλίσης του εδάφους. Για κλίσεις μεταξύ 10% και 20% προτείνεται η εγκατάσταση των σειρών κατά τις ισοϋψείς του τεμαχίου, δηλαδή κάθετα προς την κλίση του εδάφους, για ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και συγκράτηση των νερών της βροχής κατά τους χειμερινούς μήνες, με τα οποία θα

“ξεδιψάσει” το αμπέλι μας το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε ξηρικούς αμπελώνες. (κοίτα τις παρακάτω εικ.).




Καλλιέργεια αμπέλου σε αναβαθμίδες στη Σάμο



Καλλιέργεια αμπέλου παράλληλα με τη διεύθυνση κλίσης του εδάφους



Αμπέλια στην Πορτογαλία, διαμορφωμένα σε ισοϋψείς πεζούλες.



Ανάλογα με την κλίση του εδάφους, αλλάζει και η κατεύθυνση των γραμμών φύτευσης των πρέμνων.

Θέση-Προσανατολισμός των γραμμών φύτευσης Το αμπέλι αρέσκεται σε πλαγιές με ομαλή κλίση, χωρίς να αποκλείονται τα πεδινά εδάφη μέσης σύστασης, που είναι στραγγερά και ελαφρά, όπως επίσης τα πλαγερά με περισσότερη κλίση αλλά πιο συνεκτικά. Μια μικρή έως μέτρια κλίση του αμπελώνα μπορεί να είναι ευεργετική γιατί ευνοεί τη στράγγιση του εδάφους και την απομάκρυνση των ψυχρών ρευμάτων αέρα. Γενικότερα, είναι σημαντικό το αμπέλι να έχει μια πλήρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και μια καλή κυκλοφορία του αέρα μεταξύ των φυτών.

Επίσης, σε επίπεδες τοποθεσίες και ιδιαίτερα όταν το αγροτεμάχιο είναι στενόμακρο ο προσανατολισμός των σειρών πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες σειρές με μεγαλύτερο μήκος. Αυτό πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να έχουμε και μικρότερο κόστος εγκατάστασης (διότι έχουμε λιγότερα "στηρίγματα" στα άκρα των γραμμών) αλλά και μικρότερο χρόνο για την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών που γίνονται με γεωργικά μηχανήματα, διότι ελαττώνεται ο χρόνος που χρειάζονται να στρίβουν τα μηχανήματα προκειμένου να μπουν από τη μια σειρά στην άλλη.

Βέβαια, η κατεύθυνση των γραμμών φύτευσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως από την περιοχή, από την κλίση του αγροτεμαχίου, από την ποικιλία, από τη χρήση των σταφυλιών, από την κατεύθυνση των ανέμων κλπ. Γενικά, στα ψυχρά κλίματα όταν η κατεύθυνση των γραμμών είναι βοράς-νότος τα φυτά εκτίθενται στον ήλιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μεσημβρινή έκθεση του αμπελώνα δεν είναι πάντοτε επιθυμητή, ιδιαίτερα σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, διότι υπάρχει κίνδυνος τα φυτά να εκτεθούν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να είναι επιζήμιες. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ποικιλίας πρέπει επίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Π.χ. μερικές πρώιμες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου στη χώρα μας, όπως π.χ. η ποικιλία Μαλαγουζιά, και όσες δεν έχουν υψηλό φυσικό δείκτη οξέων, όταν καλλιεργούνται σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, ωριμάζουν πολύ γρήγορα με συνέπεια να χάνουν τα οξέα τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν από μόνες τους ποιοτικά κρασιά. Εννοείται ότι οι γραμμές φύτευσης θα πρέπει να είναι παράλληλες προς την κατεύθυνση των πνεόντων ανέμων της περιοχής, ιδιαίτερα όταν στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ώστε να αποφεύγονται οι μηχανικές βλάβες των φυτών.

Σε παγετόπληκτες περιοχές, οι αμπελώνες που βρίσκονται σε κλειστές κοιλάδες ή χαμηλά σε πρόποδες βουνών, αντιμετωπίζουν προβλήματα παγετού από εγκλωβισμένες ψυχρές

αέριες μάζες. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του υποκειμένου, της ποικιλίας και του συστήματος μόρφωσης, καθώς και στα μελλοντικά μέτρα παγετοπροστασίας που ενδεχομένως θα χρειαστούν. Αντίστοιχο πρόβλημα παγετού αντιμετωπίζουν και οι αμπελώνες που βρίσκονται σε ηπειρωτικές πεδιάδες ή σε οροπέδια. Αντίθετα, αμπελώνες εγκατεστημένοι σε πλαγιές έχουν το φυσικό πλεονέκτημα ότι δεν κινδυνεύουν από παγετούς ακτινοβολίας.

Γειτνίαση με υδάτινους όγκους Η παρουσία υδάτινων όγκων κοντά στο προς φύτευση αγροτεμάχιο, σημαίνει συνήθως μεγαλύτερη νεφοκάλυψη, περισσότερη ακτινοβολία για τα φυτά, λόγω της αντανάκλασης, αλλά και δημιουργία ομίχλης και εξομάλυνση της θερμοκρασίας σε περιπτώσεις πολύ ψυχρών ή πολύ θερμών κλιμάτων. Η γειτνίαση με τη θάλασσα μπορεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε περιπτώσεις θερμών κλιμάτων, καθώς οι θαλάσσιες αύρες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θερμοκρασία (έως και 5° C) βοηθώντας την ομαλότερη ωρίμανση των σταφυλιών.



Αμπελώνες στις όχθες του ποταμού Μοζέλλα, ο οποίος διασχίζει τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται κοντά στην πόλη Schweich της Γερμανίας και έχει γεωγραφικό πλάτος περίπου 50 μοίρες.

Άρδευση Οι ανάγκες του αμπελιού σε νερό ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία τους, την παρουσία ή απουσία ανταγωνισμού από ζιζάνια και τις συνθήκες εξάτμισης στις οποίες εκτίθενται τα αμπέλια. Πάντως, πρέπει να αποφεύγονται περιοχές που αντιμετωπίζουν χρόνιες ελλείψεις νερού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή να εξετάζεται η δυνατότητα συμπληρωματικής άρδευσης στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Η έκθεση των πρέμνων σε έλλειψη εδαφικής υγρασίας, έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη βλαστική τους ανάπτυξη, τη μείωση της ποσότητας και υποβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων σταφυλιών και τελικά τη μείωση του οικονομικού αποτελέσματος της αμπελοκαλλιέργειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας του έτους 2007, ένα ποσοστό 33,8% των καλλιεργούμενων εκτάσεων με αμπέλι αρδεύεται. Είναι επομένως φανερό, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργούμενων φυτών αμπέλου στη χώρα μας εκτίθενται, άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο, σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Σήμερα όμως, οι καινούργιοι αμπελώνες που εγκαθίστανται στη χώρα μας, είναι στην πλειοψηφία τους αρδεύόμενοι. Πάντως, είναι γενικά αποδεκτό, ακόμη και για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, παρά την ύπαρξη διαφωνιών, ότι η εφαρμογή άρδευσης σε συγκεκριμένα φαινολογικά στάδια επιδρά θετικά στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα των παραγομένων σταφυλιών. Άρα, κατά την επιλογή ενός αγροτεμαχίου, πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας εύρεσης νερού άρδευσης.

Βέβαια, κατά την εξέταση κάθε ενός παράγοντα που αυξάνει την απόδοση του αμπελώνα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στα κρασοστάφυλα, είναι γενικά παραδεκτό, σε αντίθεση με άλλες καλλιέργειες, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων υποβαθμίζονται σημαντικά όταν η απόδοση αυξάνει. Δηλαδή, εάν ένας παραγωγός επιθυμεί να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας στο κρασί του, δε θα πρέπει να ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο παραγωγής σταφυλιών, πέραν από το οποίο τα τεχνολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού αλλοιώνονται σημαντικά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θα παραχθούν κρασιά με την ένδειξη Π.Ο.Π (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) τότε θα πρέπει να καλλιεργηθεί συγκεκριμένη ποικιλία ή και ποικιλίες, που ορίζονται από τη νομοθεσία. Π.χ. ο οίνος Π.Ο.Π. Μαντινεία παράγεται μόνο από νωπά σταφύλια των ποικιλιών Μοσχοφίλερο (σε ποσοστό τουλάχιστον 85%) και Ασπρούδες που καλλιεργούνται στην περιοχή Μαντινεία της Αρκαδίας. Ο οίνος Π.Ο.Π. Μεσενικόλα παράγεται μόνο από νωπά σταφύλια των ποικιλιών Μαύρο Μεσενικόλα 70 % και Carignan και Syrah 30% που καλλιεργούνται σε συγκεκριμένη περιοχή της Καρδίτσας.

Στην περίπτωση όμως που η επιλογή γίνεται χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς, μοναδικό κριτήριο δεν πρέπει να είναι το είδος του κρασιού που πρόκειται να παραχθεί. Πρέπει να εξεταστούν ζητήματα όπως το κλίμα και το έδαφος του μελλοντικού αμπελώνα, καθώς δεν ταιριάζουν όλες οι ποικιλίες σε κάθε οικοσύστημα. Καθοριστικής σημασίας στοιχεία για την επιλογή μιας ποικιλίας είναι ο βαθμός προσαρμοστικότητας που έχει επιδείξει η συγκεκριμένη ποικιλία στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό, για να αποφασίσουμε ποιο υποκείμενο και ποια ποικιλία θα καλλιεργήσουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να το συζητήσουμε με ένα γεωπόνο, με έναν "καλό" αμπελοκαλλιεργητή και με έναν έμπειρο φυτωριόχο που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

ΕΔΑΦΟΣ

Το έδαφος θα πρέπει να πληροί ορισμένα ελάχιστα προσόντα αν και το αμπέλι "ζεί" λίγο πολύ σε όλα τα εδάφη αρκεί να μην έχουν πολύ υγρασία, πολλά άλατα και την κατάλληλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Για έναν επιχειρηματικό όμως αμπελώνα, πρωταρχικής σημασίας μεταξύ των απαιτήσεων του εδάφους είναι το επαρκές βάθος (75 - 100 εκ. διαπερατό έδαφος) και η ικανότητα αποστράγγισης. Τα εδάφη χωρίς βάθος περιορίζουν την ανάπτυξη των ριζών και την ικανότητα των αμπελιών να αποκτήσουν το απαραίτητο νερό κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων ξηρασίας. Οι ρίζες απαιτούν επίσης καλό αερισμό. Η ανάπτυξη των ριζών και η ευρωστία της αμπέλου μειώνονται όταν το έδαφος είναι βαρύ. Το αμπέλι προτιμά τα μέσης σύστασης αμμοαργιλώδη ούτε πολύ ελαφρά αμμώδη εδάφη αλλά ούτε πολύ βαριά αργιλώδη εδάφη. Στα εδάφη αυτά εξασφαλίζεται

καλή στράγγιση και συγκρατείται επαρκής ποσότητα νερού για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών. Επιπλέον ζεσταίνονται καλύτερα, εξασφαλίζοντας έτσι γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και πρωίμηση της παραγωγής.



Αμπέλι φυτεμένο σε "αναχώματα" για καλύτερη στράγγιση

Επίσης τα εδάφη πρέπει να είναι μέτριας γονιμότητας. Η πείρα έχει δείξει ότι τα πολύ γόνιμα εδάφη δεν είναι πάντοτε επιθυμητά διότι ευνοούν την υπερβολική βλαστική ανάπτυξη.

Πριν από τη φύτευση του αμπελώνα πρέπει να γίνεται ανάλυση εδάφους για τον προσδιορισμό του pH, της οργανικής ουσίας και της διαθεσιμότητας των μακροστοιχείων (P, K, Mg). Ένα έδαφος είναι ιδανικό για τα αμπέλια όταν η τιμή του pH κυμαίνεται από 6,0 – 7,0 αν και το αμπέλι αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ελαφρά όξινα και σε ελαφρά αλκαλικά εδάφη.

Σχετικά με την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία μπορούμε να πούμε ότι σε ελαφρά, αμμώδη εδάφη φροντίζουμε με την κατάλληλη λίπανση, κυρίως καλοχωνεμένη κοπριά, να φτάσουμε σε τιμές 1-1,5%, ενώ σε βαρύτερα, αργιλώδη εδάφη το ποσοστό αυτό καλό είναι να είναι 2-3%. Η οργανική ουσία αυξάνει το πορώδες του εδάφους, την υδατοικανότητά του, την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, συντελεί ώστε το pH του εδάφους να είναι γύρω στο επτά.

Επιπλέον, αυξάνει τη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους, με επακόλουθο τη βελτίωση της γονιμότητός του.

Αναλόγως των αποτελεσμάτων της εδαφολογικής ανάλυσης πρέπει να προστίθενται στο έδαφος στοιχεία με μικρή κινητικότητα όπως κάλιο, φώσφορος, και μαγνήσιο.

Πριν το φύτεμα των νεαρών φυτών πρέπει το έδαφος να είναι ψιλοχωματισμένο και αφράτο για να έρχεται σε τέλεια επαφή η ρίζα με το έδαφος έτσι ώστε αναπτυχθεί καλά το ριζικό τους σύστημα αλλά και να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ο επιτόπιος εμβολιασμός όταν φυτεύουμε έρριζα ανεμβολίαστα υποκείμενα. Γι' αυτό σε σφιχτά εδάφη το βαθύ όργωμα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, πρέπει να γίνεται 1-2 χρόνια πριν το φύτεμα για να "καθίσουν" τα χώματα με το νερό της βροχής και να μην έχουμε κενά. Εννοείται ότι σε ελαφρά εδάφη το όργωμα μπορεί να γίνει το προηγούμενο καλοκαίρι ή έστω το προηγούμενο φθινόπωρο πριν το φύτεμα. Ποτέ δεν πρέπει να οργώνουμε σε μεγάλο βάθος την άνοιξη πριν το φύτεμα, χωρίς να αφήσουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να "καθίσουν" με τις βροχές τα χώματα. Επίσης, πάντα πριν φυτέψουμε τα νεαρά φυτά μας πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουν "καθίσει" τα χώματα και ποτέ δεν πρέπει να βιαζόμαστε να φυτέψουμε πριν "καθίσουν" καλά καλά τα χώματα.

Σε αγροτεμάχια που συγκρατούν το νερό, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται φαινόμενα ασφυξίας ριζών, συμπίεσης και διάβρωσης των εδαφών, τροφопενιών και ασθενειών. Σε περιπτώσεις σχετικά ρηχών εδαφών καλό είναι να δίνεται μια ελαφριά κλίση στο αγροτεμάχιο, έτσι ώστε να απομακρύνονται να νερά της βροχής. Για βαθύτερα εδάφη ίσως χρειαστεί να γίνει ένα αποστραγγιστικό δίκτυο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Εάν στη θέση του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο καινούργιος αμπελώνας υπήρχαν πολυετή φυτά, θα πρέπει απαραίτητως αυτά να εκριζωθούν, με τέτοιο τρόπο ώστε να απομακρυνθούν όλες οι ρίζες. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει με βαθιά εκσκαφικά μηχανήματα, τα οποία, μαζί με το χώμα, ανασηκώνουν και τις βαθιές ρίζες. Το ιδανικότερο θα ήταν, ο νέος αμπελώνας να εγκατασταθεί σε ένα έδαφος στο οποίο δεν προϋπήρχε άλλη πολυετής καλλιέργεια, όπως αμπελώνας, δενδρώνας ή δασική έκταση, για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Σε περίπτωση που θέλουμε να εκριζώσουμε έναν παλιό αμπελώνα και στην ίδια θέση να φυτέψουμε έναν καινούργιο, δηλαδή να κάνουμε αναμπέλωση, καλό είναι να καταστρέψουμε τα παλιά πρέμνα έτσι ώστε να καταστραφούν και οι νηματώδεις που είναι φορείς του μολυσματικού εκφυλισμού αλλά και οι μύκητες που προκαλούν σηψιρριζίες. Τα παλιά πρέμνα μπορούν να καταστραφούν με την εφαρμογή ενός διασυστηματικού ζιζανιοκτόνου, όπως το glyphosate, με το οποίο ψεκάζεται στο φύλλωμα των πρέμνων μετά τον τρύγο. Τα πρέμνα στη συνέχεια πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους για αρκετό διάστημα μετά τον ψεκασμό (τουλάχιστον 4-5 μήνες), ώστε να καταστραφεί ολοκληρωτικά το ριζικό τους σύστημα και καλό είναι να μην εκριζωθούν πριν τον επόμενο Απρίλιο. Στη συνέχεια, μέχρι την εγκατάσταση του καινούργιου αμπελώνα, πρέπει, για ένα διάστημα μέχρι 5 ετών, να κάνουμε αγρανάπαυση ή/και αμειψισπορά και βαθιά οργώματα έτσι ώστε να βγούν στην επιφάνεια οι παλιές ρίζες, τις οποίες και απομακρύνουμε και να λιαστεί το έδαφος. Πολλοί καλλιεργητές όμως, επειδή το διάστημα των 5 ετών είναι οικονομικά ασύμφορο, μετά τον τρύγο εκριζώνουν το αμπέλι, απομακρύνουν τις ρίζες, εφαρμόζουν ένα νηματωδοκτόνο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή αφήνουν το χωράφι χέρσο (απαλλαγμένο τελείως από ζιζάνια) ή καλλιεργούν κάποιο σιτηρό το οποίο το καίνε το επόμενο καλοκαίρι έτσι ώστε να εξαλειφθούν τυχόν νηματώδεις που πιθανόν να υπάρχουν στο επιφανειακό έδαφος. Στη συνέχεια κάνουν μια ανάλυση εδάφους για τυχόν ύπαρξη νηματωδών σκωλήκων και κατόπιν φυτεύουν το καινούργιο αμπέλι.

Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι τα φυτά της αμειψισποράς έχουν κι αυτά το ρόλο τους στη βελτίωση του εδάφους. Έτσι, ενώ τα ψυχανθή είναι γνωστά για τον εμπλουτισμό του εδάφους σε άζωτο, αποτελούν καλούς ξενιστές για τους νηματώδεις γι' αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται. Για το λόγο αυτό, τα αγρωστώδη όπως σιτάρι, βρώμη, σίκαλη κ.λπ. για διάστημα δυο με τρία χρόνια, είναι πιο κατάλληλα για την εξυγίανση του εδάφους ενός παλιού αμπελώνα.

Πρωτού φυτέψουμε τον καινούργιο αμπελώνα πρέπει οπωσδήποτε να απαλλάξουμε το χωράφι μας από τα πολυετή και δυσεξόντωτα ζιζάνια όπως είναι η αγριάδα, η κύπερη και ο βέλιουρας (κοίτα εικ.).



Αγριάδα. Αναπτύσσει ρίζες μέχρι βάθους 30-36 εκ. Δεν ανθοφορεί. Ένας φρεσκοκομμένος βλαστός αγριάδας, αν βρει λίγο υγρασία ριζώνει πολύ γρήγορα.



Κύπερη. Πολλαπλασιάζεται με ριζώματα και κονδύλους



Βέλιουρας. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους και ριζώματα

Τα δυσεξόντωτα αυτά ζιζάνια καταπολεμούνται μόνο με βαθύ σκάψιμο του αμπελιού μας τους καλοκαιρινούς μήνες και στη συνέχεια με απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων τους δηλαδή βλαστών, κονδύλων και ριζωμάτων. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τα ζιζάνια αυτά είναι σχεδόν αδύνατον να απομακρυνθούν μετά το φύτεμα των πρέμνων (δεδομένου ότι τα χημικά ζιζανιοκτόνα πρέπει να αποφεύγονται διότι είναι επιβλαβή στα νεαρά φυτά αμπέλου) διότι, στους ξηρικούς αμπελώνες, τους καλοκαιρινούς μήνες δεν πρέπει επομένως να αναμοχλεύουμε το έδαφος του αμπελώνα μας, επειδή καταστρέφουμε τα πολύ λεπτά ριζικά τριχίδια, που αναπτύσσει το αμπέλι το καλοκαίρι και τα οποία "ανεβαίνουν" στην επάνω επιφάνεια του εδάφους για να απορροφήσουν τις ελάχιστες διαθέσιμες ποσότητες νερού. Δηλαδή αφού φυτέψουμε τα φυτά μας και μετά, τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν επιτρέπεται να "αναμοχλεύουμε" ποτέ το έδαφος, ιδιαίτερα πριν την ωρίμανση των σταφυλιών, εάν πρόκειται για αμπελώνα που έχει μπει στην καρποφορία, γιατί υπάρχει κίνδυνος να ξεραθούν τα φυτά μας από έλλειψη εδαφικής υγρασίας. Άρα τα ζιζάνια αυτά πρέπει οπωσδήποτε να εξοντωθούν πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα.

Εννοείται ότι και μετά την εξόντωσή τους, που πρέπει να γίνεται πριν τη φύτευση του αμπελώνα, τα ζιζάνια αυτά πρέπει να βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση από τον αμπελοκαλλιεργητή και να καταπολεμούνται έγκαιρα όταν εμφανίζονται σε μικρές κηλίδες μέσα στον αμπελώνα.

ΦΥΤΕΥΣΗ

Η εγκατάσταση των αμπελώνων γίνεται συνήθως, είτε με τη φύτευση εμβολιασμένων έρριζων φυτών, είτε με τη φύτευση απλών ανεμβολίαστων έρριζων μοσχευμάτων-υποκειμένων, τα οποία εμβολιάζονται μετά την εγκατάστασή τους στο χωράφι. Στην περίπτωση των ανεμβολίαστων μοσχευμάτων, ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται προς το τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου ή τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Μετά τη φύτευση των νεαρών φυτών πρέπει ο καλλιεργητής να τα ποτίζει ώστε να έχουν αρκετό νερό για την ανάπτυξή τους και να καταπολεμά έγκαιρα τα ζιζάνια. Για τη ζιζανιοκτονία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καλό είναι να αποφεύγονται τα χημικά μέσα. Τα νεαρά φυτά είναι ευαίσθητα στα περισσότερα ζιζανιοκτόνα και γι' αυτό απαγορεύεται αυστηρά η χρήση τους σε νέους αμπελώνες. Η απομάκρυνση των ζιζανίων σε νέους αμπελώνες πρέπει να γίνεται μηχανικά.

Η **πυκνότητα των φυτών** στο νέο αμπελώνα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Οι αποστάσεις φύτευσης εξαρτώνται κυρίως από τη σύσταση και το βάθος του εδάφους και από την ποικιλία. Σε τοποθεσίες με συχνή ξηρασία όπως σε πολλά νησιά ή και σε εδάφη με μικρό βάθος, οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και αντίθετα.

Γενικά, η απόσταση μεταξύ των νέων φυτών είναι από 1 έως και 2 μέτρα επί της γραμμής φύτευσης και η απόσταση μεταξύ των γραμμών φύτευσης από 2 έως 2,5 μέτρα. Η απόσταση μεταξύ των σειρών αποφασίζεται και σύμφωνα με το μέγεθος των γεωργικών μηχανημάτων και των παρελκομένων όπως ψεκαστικά κ.ά. Στις μικρές καλλιέργειες, που η άροση γίνεται με μικρές φρέζες, η απόσταση μεταξύ των γραμμών μπορεί να είναι και μικρότερη.

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες φυτεύονται λιγότερα πρέμνα ανά στρέμμα με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτά, αφού ο χρωματισμός των σταφυλιών αποτελεί ένα από τα κορυφαία εμπορικά χαρακτηριστικά. Έτσι, οι αποστάσεις φύτευσης είναι συνήθως 2,60-2,70 μ. μεταξύ των γραμμών και 1,30-1,40 μ. επί της γραμμής. Αντίθετα, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες φυτεύονται στα 2,30 μ. μεταξύ των γραμμών και στα 0,90-1,00 μ. επί της γραμμής.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορούν να καλλιεργηθούν και πιο πυκνά, κάτι που γινόταν στο παρελθόν, αλλά αυτό δε γίνεται σήμερα διότι δεν μπορούν να

γίνουν μηχανικά οι διάφορες καλλιεργητικές εργασίες. Η μεγαλύτερη διαφορά όμως μεταξύ επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών βρίσκεται στο κόστος εγκατάστασης των υποστυλώσεων που στηρίζουν τα πλαστικά σκεπάσματα και τα αντιχαλαζικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των επιτραπέζιων ποικιλιών. Το κόστος αυτής της εγκατάστασης είναι αρκετά υψηλό, γι' αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον καλλιεργητή.



Δίκτυο για την προστασία των σταφυλιών από πουλιά, έντομα κ.λπ.



Αντιβρόχινα - αντιχαλαζικά δίχτυα



Αντιβρόχινα-αντιχαλαζικά δίχτυα

Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε, για την οικονομική πλευρά του θέματος, ότι ένας αμπελώνας πυκνής φύτευσης θα μπει πιο γρήγορα (3ος χρόνος) σε παραγωγή από έναν αραιής φύτευσης (5ος-6ος χρόνος), λόγω κυρίως των χαμηλότερων αναγκών σε μόνιμο ξύλο και διαμόρφωσης ισχυρού κορμού. Από την άλλη πλευρά, τα κόστη υλικών και εργασίας για έναν αμπελώνα π.χ. 700 φυτών/στρέμμα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά ενός αμπελώνα πυκνότητας π.χ. 200 φυτών/στρέμμα.



Πλαστικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί όταν τα φυτά φέρουν σταφύλια. Με την κάλυψη με πλαστικά εξασφαλίζεται σταθερή παραγωγή και έτσι διασφαλίζονται οι εξαγωγές. Επίσης ο αμπελουργός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κανονική σοδειά και σε όψιμη, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Καλό είναι να τοποθετούνται λίγο πριν αρχίσουν οι βροχές.

Συνοπτικά καλό είναι να θυμόμαστε πως η φύτευση πρέπει να είναι τόσο πυκνή όσο μας επιτρέπουν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, ο σχεδιασμός της μόρφωσης των πρέμνων, τα μηχανήματα και ο προϋπολογισμός αλλά όχι τόσο αραιή ώστε να μένει ανεκμετάλλευτη επιφάνεια.

Το φύτεμα μπορεί να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και μέχρι και τα τέλη του Μάρτη ή και του Απρίλη στη βόρεια Ελλάδα ειδικά σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και με ανοιξιάτικους παγετούς. Ποτέ δεν πρέπει να βιαζόμαστε να φυτέψουμε εάν δεν έχει πρώτα "στραγγίξει" καλά το έδαφος. Να μη φυτεύουμε ποτέ σε εδάφη που είναι κορεσμένα με νερό δηλαδή που είναι λασπερά. Επίσης ποτέ δεν πρέπει να βιαζόμαστε να φυτέψουμε σε περιοχές με ανοιξιάτικους παγετούς. Τα νεαρά φυτά είναι πολύ ευαίσθητα

σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα έρριζα εμβολιασμένα φυτά, που αποτελούν την πλειοψηφία του εμπορίου αλλά και για τα έρριζα-ανεμβολίαστα. Σε περίπτωση που τα φυτά μεταφυτεύονται με μπάλα χώματος, δηλαδή είναι μέσα σε γλάστρα ή σε πλαστική σακούλα, το φύτεμα μπορεί να γίνει ακόμη και στις αρχές του καλοκαιριού αρκεί βέβαια μετά το φύτεμα να ποτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, πρέπει να έχει προηγηθεί ψιλοχωματισμός του εδάφους γιατί θα βοηθήσει τις ρίζες να έρθουν σε καλή επαφή με το έδαφος και θα περιορίσει τα σημεία όπου εγκλωβίζεται ο αέρας δημιουργώντας κενά μεταξύ ριζών και εδάφους.

Μετά το φύτεμα πρέπει να συμπιέζεται καλά το χώμα γύρω γύρω από το λάκκο και πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί ένα πολύ καλό πότισμα το οποίο, μεταξύ των άλλων, βοηθάει την καλύτερη επαφή του εδάφους με τις ρίζες. Το πότισμα των νεαρών φυτών πρέπει να συνεχίζεται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.



Νεοφυτεμένο εμβολιασμένο φυτό αμπέλου. Διακρίνεται το κερί (με το πράσινο χρώμα) το οποίο καλύπτει το εμβόλιο και το σημείο εμβολιασμού. Το κερί δεν το αφαιρούμε κατά τη φύτευση. Μετά το φύτεμα ακολουθεί πότισμα.

Καλό είναι κατά το φύτεμα να σκεπάζεται με χώμα το νεαρό φυτό, μέχρι την κορυφή, ιδιαίτερα σε ξηρικές περιοχές. Η κάλυψη με χώμα το προστατεύει από διάφορους κινδύνους όπως από τις παγωνιές, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αποκόλληση στο σημείο εμβολιασμού και από τις ξηρασίες. Χρειάζεται προσοχή βέβαια μήπως σε αυτή την περίπτωση αναπτυχθούν ρίζες από το εμβόλιο. Γι' αυτό στα νεαρά φυτά θα πρέπει ο καλλιεργητής να αφαιρεί το χώμα, ανά τακτά διαστήματα, και να ελέγχει εάν έχει βγάλει ρίζες το εμβόλιο. Σε περίπτωση που έχουν βγεί ρίζες από το εμβόλιο, πρέπει να τις αφαιρεί το συντομώτερο δυνατό. Αυτό πρέπει να γίνει διότι τα φυτά μας θα είναι επιρρεπή σε προσβολή από φυλλοξήρα αλλά και θα αδρανήσει το ριζικό σύστημα του υποκειμένου (το οποίο είναι βαθύτερο από το ριζικό σύστημα του εμβολίου) και έτσι τα φυτά μας θα είναι ευαίσθητα στην ξηρασία. Εδώ πρέπει να τονιστεί, ότι μετά την αφαίρεση των ριζών του εμβολίου, πρέπει οπωσδήποτε να ξανασκεπάσουμε τα φυτά μας με χώμα γιατί μπορεί να πάθουν θερμοπληξία. Εννοείται ότι τις ρίζες πρέπει να τις αφαιρούμε έγκαιρα για να μην κάνουμε μεγάλες τομές στα φυτά μας. Σε περίπτωση εδαφών που δημιουργούν κρούστα, πρέπει αυτή να καταστρέφεται έγκαιρα ώστε να μπορούν να "πετάξουν" τα νεαρά φυτά μας.



Όταν λειώσουν τα χιόνια και εκλείψει ο κίνδυνος παγετού, τότε μπορούμε να φυτέψουμε το αμπέλι μας.

Η συνεχής καταπολέμηση των ζιζανίων (όχι όμως χημικά) στο νέο αμπελώνα μας είναι απολύτως απαραίτητη.



Τα νεαρά φυτά μας πρέπει απαραίτητα να αρδεύονται και να προστατεύονται από τα ζιζάνια. Στην επάνω εικόνα διακρίνονται οι "λεκάνες" που έχουν φτιαχτεί για να κρατάνε το νερό του ποτίσματος. Στην κάτω εικόνα έχει τοποθετηθεί μαύρο πλαστικό στις γραμμές φύτευσης για να μη φυτρώσουν ζιζάνια.

Επίσης εάν το εμβόλιο είναι καλυμμένο με κερί, (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα)

δεν πρέπει να το αφαιρούμε κατά τη φύτευση. Το μάτι "σπάει" εύκολα το κερί, όταν "πετάει". Παράλληλα το κερί το προστατεύει. Όταν φυτεύουμε ανεμβολίαστα ριζοβολημένα υποκείμενα, πρέπει να φροντίζουμε ώστε όλα τα φυτά μας να έχουν το ίδιο επιθυμητό πάχος. Φυτά τα οποία είναι χοντρότερα ή λεπτότερα από το επιθυμητό, μπορεί να αποτύχουν στον εμβολιασμό, οπότε θα χρειαστεί αυτά τα φυτά να εμβολιαστούν πάλι, την επόμενη βλαστική περίοδο, με συνέπεια να έχουμε φυτά ανομοιόμορφα. Εάν οι κληματόβεργες είναι χοντρότερες από το κανονικό, τότε ίσως πρέπει να αφαιρέσουμε μερικά φύλλα έτσι ώστε να αποκτήσουν το επιθυμητό πάχος. Επίσης, για να μην αποκτήσουν τα φυτά μας χοντρές κληματίδες δεν πρέπει να τα "ταΐζουμε" πολύ με νερό και θρεπτικά στοιχεία.



Οι ρίζες των έρριζων εμβολιασμένων φυτών και των ανεμβολίαστων υποκειμένων πριν φυτευτούν στην οριστική τους θέση στο χωράφι, αφαιρούνται στο $\frac{1}{4}$ του μήκους στο οποίο έρχονται από το φυτώριο, δηλαδή περίπου στα 3-4 εκ.

Εάν τα νεαρά φυτά μας είναι γυμνόρριζα καλό θα είναι, πριν τα φυτέψουμε, να τα βάλουμε σε ένα δοχείο με νερό για 10-15 ώρες, ώστε να ενυδατωθούν. Εάν πρόκειται να καθυστερήσουμε να τα φυτέψουμε και τα παραλάβουμε γυμνόρριζα από το φυτώριο, θα πρέπει να τα "παραχώσουμε" σε καλά скаμμένο χώμα, ώστε να παραμείνουν εκεί για όσες ημέρες χρειαστεί έως την ημέρα της φύτευσης.



Τα εμβολιασμένα φυτά, προτού φυτευτούν, πρέπει να τοποθετηθούν για 10-15 ώρες στο νερό.



Φυτά τα οποία θα καθυστερήσουν να φυτευτούν, μετά την παραλαβή τους από το φυτώριο, πρέπει να παραχωθούν μέσα στο έδαφος μέχρις ότου φυτευτούν.

Για τον σκοπό αυτό, ανοίγουμε ένα αυλάκι στο χώμα βάθους 25 πόντων περίπου, βάζουμε τα φυτά μέσα με μικρή κλίση και τα σκεπάζουμε έτσι ώστε να είναι όλο το ριζικό τους σύστημα καλά παραχωμένο στο χώμα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Το χώμα αν δεν έχει την κατάλληλη υγρασία που θα τα διατηρήσει υγρά πρέπει να ποτιστεί. Αυτός ο τρόπος της παράχωσης βοηθάει τα φυτά να διατηρήσουν τους χυμούς τους έως την ημέρα της φύτευσης. Τα φυτά δεν μπορεί να παραμείνουν εκεί περισσότερο από 15 ημέρες και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εαρινής βλάστησης.

Ο κάθε λάκκος που θα ανοίξουμε, για να φυτέψουμε τα φυτά στη μόνιμη θέση τους στο χωράφι, πρέπει να έχει βάθος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος του φυτού. Εάν έχουμε πολύ

καλά χωνεμένη κοπριά, μπορούμε να ρίξουμε στο βάθος του κάθε λάκκου μια μικρή φτυαριά και να τη σκεπάσουμε με λίγο χώμα. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, θα κόψουμε τις ρίζες των νέων φυτών (πριν τα φυτέψουμε στις οριστικές τους θέσεις στο χωράφι) με ένα καλό ψαλίδι, αφήνοντας μόνο ένα μήκος 3 – 4 εκατοστών. Το φυτό θα βγάλει σύντομα νέες ρίζες. Βάζοντας το φυτό στο κέντρο του λάκκου ρίχνουμε το χώμα περιμετρικά, πατώντας το πολύ καλά ώστε να έλθουν σε τέλεια επαφή οι ρίζες με το χώμα. Καλό είναι στη συνέχεια να καλύψουμε τα νεαρά φυτά μας με χώμα όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Τώρα που το χώμα εκεί είναι φρέσκο, είναι η κατάλληλη στιγμή να μπήξουμε ένα πάσσαλο στήριξης του φυτού, με μήκος περίπου 1 μέτρο έξω από το χώμα. Εκεί θα δένονται οι νέοι βλαστοί ώστε να μη σπάσουν με τον πρώτο άνεμο.




Δεν ξεχνάμε ποτέ τον πάσσαλο στήριξης στα νεαρά φυτά όπου δένουμε τη νεαρή βλάστηση.



Νεοφυτεμένο εμβολιασμένο μόσχευμα. Διακρίνεται η παραφίνη (με το μωβ χρώμα) που έχει καλύψει το εμβόλιο και το σημείο εμβολιασμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ




Γυμνόρριζα, έρριζα εμβολιασμένα φυτά αμπέλου. Φαίνεται η παραφίνη (με το πράσινο χρώμα) στην οποία έχει εμβαπτισθεί το εμβόλιο και το επάνω μέρος του υποκειμένου μετά τον εμβολιασμό. Τα φυτά φυτεύονται στη μόνιμη θέση τους στο χωράφι, όπως είναι, δηλαδή με την παραφίνη. Έτσι πολλαπλασιάζεται το αμπέλι μετά την εμφάνιση της φυλλοξήρας.

Έτσι πολλαπλασιάζεται το αμπέλι πριν εμφανιστεί η φυλλοξήρα

ΓΕΝΙΚΑ

Επειδή ο τρόπος πολλαπλασιασμού της αμπέλου είναι άμεσα συνυφασμένος με την προσβολή των φυτών από την αφίδα της φυλλοξήρας, γι' αυτό εδώ θα γίνει μια μικρή αναφορά για τη φυλλοξήρα.



Φυλλοξήρα

Η καλλιέργεια του αμπελιού διαδόθηκε κατά το μεσαίωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε σοβαρή κρίση στην αμπελοκαλλιέργεια από την εισβολή στην Ευρώπη των ασθενειών του ωιδίου (που οφείλεται στο μύκητα *Unicula necator*) του περονόσπορου (που οφείλεται στο μύκητα *Plasmopara viticola*) και από την προσβολή των αμπελιών από την αφίδα της φυλλοξήρας (*Dactylosphaera vitifoliae*). Η φυλλοξήρα κατέστρεψε ολοκληρωτικά τους αμπελώνες της Ευρώπης, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν αυτόρριζοι δηλαδή ανεμβολίαστοι. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 1885 στη Μακεδονία και στη Θράκη και προχωρώντας προς τα κάτω έφτασε το 1928 στη Θεσσαλία, το 1942 διαδόθηκε μέχρι την Εύβοια και το 1946 εμφανίστηκε στην Αττική. Από το 1968 εισέβαλε στο κατεχοχήν αμπελουργικό διαμέρισμα, την Πελοπόννησο.

Η φυλλοξήρα έχει δυο γενεές: α. τη φυλλόβια, που προσβάλλει τα φύλλα και β. τη ριζόβια που προσβάλλει τις ρίζες. Οι ρίζες των φυτών των αμερικάνικων ειδών αμπέλου *Vitis riparia*, *Vitis rupestris*, *Vitis berlandieri* κ.ά. αντέχουν στις προσβολές της ριζόβιας φυλλοξήρας, μορφή που προκαλεί την καταστροφή, δεδομένου ότι η φυλλόβια μπορεί να καταπολεμηθεί με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Στην ευρωπαϊκή άμπελο (που ανήκει στο είδος *Vitis vinifera*), στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι καλλιεργούμενες ποικιλίες, η φυλλοξήρα προσβάλλει το ριζικό σύστημα. Το υπέργειο μέρος της ευρωπαϊκής αμπέλου είναι ανθεκτικό στη φυλλοξήρα. Έτσι, εμβολιάζοντας την ευρωπαϊκή άμπελο (της οποίας το υπέργειο μέρος αντέχει στη φυλλόβια φυλλοξήρα) σε αμερικάνικα υποκείμενα (των οποίων το ριζικό σύστημα αντέχει στη ριζόβια φυλλοξήρα), αποκτούμε φυτά αμπέλου ανθεκτικά στη φυλλοξήρα.

Τα συμπτώματα στο ριζικό σύστημα της αμπέλου που έχει προσβληθεί από φυλλοξήρα αποτελούν τα πολυάριθμα φυμάτια στα ριζίδια και τα μεγάλα καρκινώματα στις ενήλικες ρίζες, με αποτέλεσμα τη βαθμιαία καταστροφή του ριζικού συστήματος, την περαιτέρω επιμόλυνσή του από ιούς, βακτήρια, μύκητες κ.λπ. και τον τελικό θάνατο των φυτών.

Τα συμπτώματα στο υπέργειο μέρος του πρέμνου είναι η καθυστερημένη και υποανάπτυκτη βλάστηση των κληματίδων οι οποίες αποκτούν κοντά μεσογονάτια διαστήματα, μικρά φύλλα και φέρουν μικρά υποανάπτυκτα σταφύλια. Επίσης ξεραίνονται τα φύλλα, πέφτουν πρόωρα και τελικά ξεραίνεται ολόκληρο το φυτό.



Συμπτώματα σε φύλλο αμπελιού προσβεβλημένο από φυλλοξήρα

Η ριζόβια φυλλοξήρα εξαπλώνεται και διαδίδεται από αμπελώνα σε αμπελώνα και από περιοχή σε περιοχή με τους παρακάτω τρόπους:

- α. με έντομα που μετακινούνται στο έδαφος από ρίζα σε ρίζα.
- β. με έντομα που μετακινούνται στην επιφάνεια το εδάφους τους θερινούς μήνες.
- γ. με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό.
- δ. με μολυσμένο χώμα, εργαλεία όπως υνιά, φρέζες, τσάπες κτλ.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι αρκετές ελληνικές ποικιλίες όπως το Αηδάνι, το Σαββατιανό, η Σουλτανίνα κ.ά. παρουσιάζουν ευαισθησία και στη φυλλόβια φυλλοξήρα. Επιπλέον, ο εμβολιασμός σε αμερικάνικα υποκείμενα έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα και κυρίως το ότι τα αμερικάνικα υποκείμενα δεν προσαρμόζονται σε όλα τα εδάφη, δε συμφωνούν στον εμβολιασμό με όλες τις ποικιλίες και τα εμβολιασμένα πρέμνα έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια παραγωγικής ζωής από τις αυτόρριζες ποικιλίες (κατά μέσον όρο 30 έτη έναντι 70-80 που έχουν τα αυτόρριζα φυτά).

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Το φυτό της αμπέλου μπορεί να πολλαπλασιαστεί και εγγενώς, δηλαδή με σπορόφυτα (που προέρχονται από το φύτευμα των σπόρων των σταφυλιών) και αγενώς. Λόγω του υψηλού βαθμού ετεροζυγωτίας όμως η άμπελος, όταν πολλαπλασιάζεται εγγενώς, δίνει απογόνους (δηλαδή σπορόφυτα τα οποία προέρχονται από το φύτευμα των σπόρων της) με εντελώς διαφορετικά γονοτυπικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά από αυτά των γονέων. Κατά συνέπεια, ο τρόπος αυτός πολλαπλασιασμού δε χρησιμοποιείται στην πράξη. Άλλωστε πολλές ποικιλίες αμπέλου είναι τυχαία σπορόφυτα (από ελεύθερη επικονίαση) ή σπορόφυτα προερχόμενα από ελεγχόμενες διασταυρώσεις (από ελεγχόμενη επικονίαση). Γι' αυτό, για τον πολλαπλασιασμό της αμπέλου, χρησιμοποιείται ο αγενής τρόπος πολλαπλασιασμού και κυρίως με μοσχεύματα χειμερινού ξύλου, καταβολάδες και εμβολιασμό. Πριν από την προσβολή της αμπέλου από τη φυλλοξήρα, το αμπέλι πολλαπλασιάζετο με ανεμβολίαστα μοσχεύματα και με καταβολάδες. Δηλαδή το αμπέλι ήταν αυτόρριζο, δεν εμβολιάζετο με άλλα λόγια σε αμερικάνικα αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα, όπως εμβολιάζεται σήμερα. Σήμερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το αμπέλι πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό της επιθυμητής ποικιλίας σε μόσχευμα (το οποίο μπορεί να φέρει ή και να μη φέρει ρίζες όπως αναλύεται παρακάτω) αμερικάνικου

υποκειμένου. Η μέθοδος αυτή είναι και η μόνη αποτελεσματική για το φύτεμα νέων αμπελώνων. Τα μοσχεύματα από τα αμερικάνικα υποκείμενα αμπέλου, τα οποία είναι ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ), ανάλογα με το πώς θα τα χειριστούμε μετά την κοπή τους από το μητρικό φυτό, τα ξεχωρίζουμε στις δύο παρακάτω κατηγορίες:

1. Σε **μοσχεύματα ριζοβολίας** ή αλλιώς **ριζοβολίσιμα μοσχεύματα** τα οποία, μετά την κοπή τους από το μητρικό φυτό, μεταχειρίζονται με τέτοιο τρόπο (όπως θα αναλυθεί παρακάτω) ώστε πρώτα να εκπτύξουν ριζικό σύστημα και μετά να εμβολιαστούν.
2. Σε **εμβολιάσιμα μοσχεύματα**, τα οποία μετά την κοπή τους από το μητρικό φυτό εμβολιάζονται πρώτα με την επιθυμητή ποικιλία και μετά μεταχειρίζονται με τέτοιο τρόπο (όπως θα αναλυθεί παρακάτω) ώστε και να ριζοβολήσουν και να επέλθει συγκόλληση στο σημείο εμβολιασμού.

Συλλογή μοσχευμάτων υποκειμένων

Κατά το τέλος του χειμώνα αρχές άνοιξης συλλέγονται κληματίδες οι οποίες πρέπει να είναι επαρκώς ώριμες. Καταλληλότερος χρόνος κοπής των κληματίδων είναι το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου. Εννοείται ότι δεν επιλέγονται κληματίδες ακατάλληλες, όπως προσβεβλημένες από διάφορα αίτια, πολύ λεπτές ή πολύ χοντρές κ.λπ. Μετά την κοπή τους τα μοσχεύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μην αφυδατωθούν. Εάν δε χρησιμοποιηθούν αμέσως, πρέπει να τοποθετούνται σε ψυκτικούς θαλάμους. Συνήθως δένονται σε δέματα, και τοποθετούνται μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους προκειμένου να διατηρηθούν μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν.

Στη συνέχεια, προτού χρησιμοποιηθούν, βγαίνουν από τους ψυκτικούς θαλάμους και τεμαχίζονται σε μοσχεύματα ριζοβολίας (τα οποία πρέπει να έχουν διάμετρο 4-6 χιλιοστά) και σε εμβολιάσιμα μοσχεύματα (τα οποία πρέπει να έχουν διάμετρο 6,5-11 χιλιοστά). Κατά τον τεμαχισμό των κληματίδων η τομή στο κάτω μέρος του μοσχεύματος γίνεται κάθετα προς τον άξονα και σε απόσταση 2 – 3 cm από τον τελευταίο κόμβο, η δε τομή στο άνω άκρο γίνεται με κλίση 45 μοιρών και σε απόσταση τουλάχιστον 3 cm από τον τελευταίο κόμβο.

Διατήρηση των μοσχευμάτων στους ψυκτικούς θαλάμους. Κατά τη συντήρηση των μοσχευμάτων μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους, τα μοσχεύματα πρέπει να

προφυλάσσονται από αφυδάτωση, ασφυξία, πρόωπη εκβλάστηση των οφθαλμών τους καθώς και από προσβολές παρασίτων.

Η αφυδάτωση των μοσχευμάτων αποτελεί το κύριο πρόβλημα κατά τη διατήρησή τους. Εάν χάσουν νερό πάνω από 15% τα μοσχεύματα αχρηστεύονται δηλαδή χάνουν την ικανότητά τους και να βλαστήσουν και να ριζοβολήσουν.

Τα μοσχεύματα κατά τη διάρκεια της διατήρησής τους, επιτελούν τη λειτουργία της αναπνοής, της οποίας η ένταση είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία. Πέραν τούτου, η έκλυση CO₂ μπορεί να προκαλέσει ασφυξία των μοσχευμάτων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η διατήρηση των μοσχευμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 1° C), σχετική υγρασία 100% και επαρκή αερισμό. Σε περιπτώσεις που η σχετική υγρασία είναι μικρότερη του 90% συνιστάται η τοποθέτηση των μοσχευμάτων σε πλαστικούς σάκκους.

Όπου δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ψυκτικού θαλάμου για τη συντήρηση των μοσχευμάτων, τα μοσχεύματα συνήθως τοποθετούνται σε ψυχρές αποθήκες, με καλό αερισμό. Μεμονωμένοι παραγωγοί επίσης, πολλές φορές βάζουν τα μοσχεύματα μέσα στο έδαφος, τα σκεπάζουν με χώμα και τα διαβρέχουν με νερό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Καλό είναι επίσης, τα μοσχεύματα, πριν από την τοποθέτησή τους στους χώρους διατήρησης να εμβαπτίζονται σε νερό και σε μυκητοκτόνα διαλύματα.

Η δημιουργία νέων αμπελώνων σε φυλλοξηριώσες περιοχές γίνεται κυρίως με τους παρακάτω δύο τρόπους:

α) Με τη φύτευση ριζοβολημένων ή με άλλα λόγια έρριζων μοσχευμάτων υποκειμένων α.ρ.μ.φ στις οριστικές τους θέσεις στον αμπελώνα, τα οποία στη συνέχεια (αφού παραμείνουν δηλαδή στο έδαφος για ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα για να ριζώσουν καλά) εμβολιάζονται επιτόπου με τις ποικιλίες παραγωγής. Η ριζοβολία των μοσχευμάτων γίνεται συνήθως σε υπαίθρια φυτώρια ή μέσα στο θερμοκήπιο σε συνθήκες υδρονέφωσης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

β) Με τη φύτευση έτοιμων φυτών, δηλαδή έρριζων υποκειμένων τα οποία έχουν (ήδη) εμβολιαστεί με τις ποικιλίες παραγωγής. Τα φυτά αυτά έχουν εμβολιαστεί με τη μέθοδο του επιτραπέζιου εμβολιασμού, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω.

Εννοείται ότι στις μη φυλλοξηριώσες περιοχές (που τέτοιες περιοχές δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, με μια εξαίρεση τη νήσο Σαντορίνη), όπου δεν είναι απαραίτητη η χρήση

αμερικάνικων υποκειμένων α.ρ.μ.φ., οι αμπελώνες δημιουργούνται με αυτόρριζα φυτά ποικιλιών παραγωγής. Τα αυτόρριζα φυτά αποκτώνται είτε με τη ριζοβολία μοσχευμάτων είτε με καταβολάδες, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. Υπάρχει βέβαια και η μέθοδος της ιστοκαλλιέργειας, αλλά εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαδικασία ριζοβόλησης μοσχευμάτων υποκειμένων α.ρ.μ.φ

Η ριζοβολία των μοσχευμάτων μπορεί να γίνει ή σε υπαίθριο φυτώριο ή μέσα στο θερμοκήπιο σε υδρονέφωση, με διαφόρους τρόπους και τεχνικές, που μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, από καλλιεργητή σε καλλιεργητή και από φυτωριούχο σε φυτωριούχο. Σε γενικές γραμμές όμως η διαδικασία έχει ως εξής:

Ριζοβολία μοσχευμάτων σε υπαίθριο φυτώριο Στο υπαίθριο φυτώριο τοποθετούνται για να “βγάλουν” ρίζες α. τα απλά (ανεμβολίαστα) μοσχεύματα β. τα μοσχεύματα τα οποία έχουν εμβολιαστεί με επιτραπέζιο εμβολιασμό και στη συνέχεια έχουν τοποθετηθεί για ένα διάστημα σε κατάλληλο θερμοθάλαμο προκειμένου να συγκολληθεί το εμβόλιο με το υποκείμενο.

Επειδή τα μοσχεύματα των υποκειμένων α.ρ.μ.φ ριζοβολούν συνήθως δύσκολα και επιπλέον τα εμβολιασμένα μοσχεύματα είναι ευαίσθητα (κυρίως στο σημείο εμβολιασμού), το φυτώριο πρέπει να προσφέρει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για ριζοβόληση. Δηλαδή η τοποθεσία του φυτωρίου δεν πρέπει να έχει παγετούς και ψυχρά ρεύματα αέρα. Επίσης, το έδαφος του φυτωρίου πρέπει να ευνοεί τη ριζοβολία των μοσχευμάτων, δηλαδή να είναι μέσης μηχανικής σύστασης, ψιλοχωματισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο και απαλλαγμένο από παθογόνα και φορείς ιώσεων. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η εγκατάσταση φυτωρίου σε εδάφη όπου προϋπήρχε αμπελώνας.

Η προετοιμασία του εδάφους γίνεται με όργωμα σε βάθος 50-60 εκατοστών, δεύτερο όργωμα σε βάθος 15 εκατοστών και φρεζάρισμα. Πριν το βαθύ όργωμα προστίθεται καλιούχο λίπασμα (20 μον. καλίου ανά στρέμμα) και υπερφωσφορικό λίπασμα (15 μον. φωσφόρου ανά στρέμμα). Μετά την κατεργασία προστίθεται άζωτο (15 μον. αζώτου ανά στρέμμα) και οργανική ουσία (2 τον. κοπριάς το στρέμμα). Τα μοσχεύματα φυτεύονται στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου. Η φύτευση των μοσχευμάτων γίνεται μέσα σε αυλάκια

τα οποία στη συνέχεια σκεπάζονται και σχηματίζουν σαμάρια. Τα αυλάκια έχουν βάθος 25 εκατοστά και η απόσταση μεταξύ των είναι περίπου 0,80 μέτρα. Στη διάρκεια μεταφοράς των μοσχευμάτων από τους χώρους συντήρησής των μέχρι το φυτώριο, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας τους από την αφυδάτωση. Και τα μοσχεύματα ριζοβόλησης και τα εμβολιασμένα φυτεύονται μέσα στο αυλάκι με κλίση και σε τέτοιο βάθος, ώστε τα 2/3 του μήκους τους να είναι μέσα στο έδαφος.

Κατά μια άλλη τεχνική, καλύπτεται όλο το μόσχευμα με χώμα. Μετά γίνεται επιμελημένο παράχωμα των μοσχευμάτων και συμπίεση του χώματος έτσι ώστε να έρθει σε καλή επαφή το έδαφος με το μόσχευμα και να προστατευτούν από την αφυδάτωση. Ακολουθεί πότισμα. Η φύτευση των μοσχευμάτων στα σύγχρονα φυτώρια γίνεται από εξειδικευμένα μηχανήματα έτσι ώστε και η διαδικασία επιταχύνεται και συμπιέζεται το κόστος.

Τα απλά μοσχεύματα ριζοβόλησης φυτεύονται σε απόσταση 3-4 εκ.(16-18.000 μοσχ./στρ.) και τα εμβολιασμένα σε απόσταση 5 εκ. (12-14.000 μοσχ./στρ.). Μετά τη φύτευση και το παράχωμα των μοσχευμάτων γίνεται άρδευση.



Εμβολιασμένα μοσχεύματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος προκειμένου να ριζοβολήσουν.



Τα μοσχεύματα τοποθετούνται στο έδαφος για ριζοβολία



Μοσχεύματα αμπέλου, τοποθετημένα σε υπαίθριο φυτώριο για ριζοβόληση, μετά την έκπτυξη των οφθαλμών τους.



Μοσχεύματα αμπέλου τοποθετημένα σε ατομικά γλαστράκια ριζοβολίας, μετά την έκπτυξη των οφθαλμών τους.



Απλά (ανεμβολίαστα) μοσχεύματα αμπέλου σε υπόστρωμα ριζοβολίας.



Μόσχευμα αμπέλου μετά την εξαγωγή του από το υπόστρωμα ριζοβολίας. Φαίνεται το ριζικό σύστημα και ο βλαστός που έχει προκύψει μετά την έκπτυξη του οφθαλμού.



Ριζοβολημένα μοσχεύματα αμπέλου τα οποία στη συνέχεια εμβολιάστηκαν με επιτραπέζιο εμβολιασμό. Το κόκκινο χρώμα που φαίνεται είναι η παραφίνη στην οποία εμβαπτίστηκαν μετά τον εμβολιασμό.

Ριζοβολία μοσχευμάτων μέσα σε θερμοκήπιο. Μέσα στο θερμοκήπιο τα μοσχεύματα τοποθετούνται ή σε πάγκους ριζοβολίας ή σε ατομικά γλαστράκια. Ο χώρος του θερμοκηπίου πρέπει να έχει σχετικά υψηλή θερμοκρασία (όχι κάτω από 20° C) και υψηλή σχετική υγρασία (περίπου 70-80%). Ένα σύγχρονο θερμοκήπιο διαθέτει πάντα σύστημα υδρονέφωσης έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος αφυδάτωσης των μοσχευμάτων. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα κατά τη διάρκεια παραμονής των μοσχευμάτων στο θερμοκήπιο να μην προσβληθούν από διάφορα παράσιτα. Τα μοσχεύματα παραμένουν μέσα στο θερμοκήπιο μέχρις ότου αναπτύξουν επαρκές ριζικό σύστημα και παράλληλα εκπτύξουν τους οφθαλμούς τους (κοίτα παρακάτω εικ.). Στη συνέχεια απομακρύνονται από τους πάγκους ριζοβολίας, τοποθετούνται πρώτα στη σκιά, προκειμένου να σκληραγωγηθούν και μετά μπορούν α. τα ανεμβολίαστα ή να φυτευτούν στις οριστικές τους θέσεις στο χωράφι όπου θα εμβολιαστούν με επιτόπιο εμβολιασμό ή να εμβολιαστούν με επιτραπέζιο εμβολιασμό και μετά να φυτευτούν στη μόνιμη θέση τους στο χωράφι και β. τα εμβολιασμένα, φυτεύονται στις οριστικές τους θέσεις στο χωράφι.



Στην επάνω εικόνα φαίνονται ανεμβολίαστα μοσχεύματα, γνωστά και ως απλά μοσχεύματα μέσα στο θερμοκήπιο στους πάγκους ριζοβολίας. Στην κάτω φωτογραφία, εμβολιασμένα μοσχεύματα έχουν τοποθετηθεί σε ατομικά γλαστράκια προκειμένου να ριζοβολήσουν.

Αφότου εμφανίστηκε στην Ελλάδα η φυλλοξήρα και μετά, ο πολλαπλασιασμός της αμπέλου γίνεται μόνο με εμβολιασμό ποικιλιών παραγωγής σε αμερικάνικα υποκείμενα α.ρ.μ.φ.

Η δυνατότητα των μοσχευμάτων να εκπτύξουν ριζικό σύστημα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:

1. Από το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο υποκείμενο. Π.χ. το Richter110 είναι ένα υποκείμενο το οποίο ριζοβολεί σχετικά δυσκολώτερα συγκριτικά με τα υπόλοιπα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας.
2. Από τη θρεπτική κατάσταση του μητρικού φυτού από το οποίο ελήφθησαν τα μοσχεύματα. Π.χ. η μεγάλη περιεκτικότητα των μοσχευμάτων σε υδατάνθρακες, που αποτελούν πηγή ενέργειας για τη διαδικασία της ριζογένεσης, αυξάνει την ικανότητα ριζοβόλησης. Με άλλα λόγια τα μοσχεύματα πρέπει να λαμβάνονται από πρέμνα που βρίσκονται σε θρεπτική ισορροπία και από επαρκώς ώριμες κληματίδες.
3. Από την παρουσία οξυγόνου. Η παρουσία οξυγόνου ευνοεί τη ριζογένεση. Επίσης, ο σχηματισμός των ριζών ευνοείται σε συνθήκες σκότους.
4. Από τη θερμοκρασία. Η ριζογένεση και εν συνεχεία η ανάπτυξη των ριζών είναι δυνατή μεταξύ 11 και 35 βαθμών Κελσίου με άριστη τη θερμοκρασία των 25 - 28 βαθμών Κελσίου. Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται διότι προκαλούν έκπτυξη των οφθαλμών νωρίτερα της διαδικασίας ριζογένεσης με αποτέλεσμα την αφυδάτωση και το "θάνατο" των μοσχευμάτων.

Άλλοι παράγοντες που επιδρούν στη ριζοβόληση των μοσχευμάτων αποτελούν η ηλικία των μοσχευμάτων, το μήκος τους και το μέρος του βλαστού από το οποίο προέρχονται. Από την άποψη ηλικίας, τα μοσχεύματα ενός έτους ριζοβολούν ευχερέστερα από μοσχεύματα που περιλαμβάνουν στη βάση τους ξύλο ηλικίας δύο ετών. Μεγαλύτερο ποσοστό ριζοβόλησης παρουσιάζουν τα μεγαλύτερου μήκους μοσχεύματα. Η ευχέρεια επίσης της ριζοβόλησης επηρεάζεται από το τμήμα της κληματίδας από το οποίο προέρχεται το μόσχευμα. Μοσχεύματα προερχόμενα από το μέσο της κληματίδας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στη ριζοβόληση σε σύγκριση με τα μοσχεύματα της βάσης της κληματίδας και ακόμα μεγαλύτερο από τα μοσχεύματα του ακραίου τμήματος της κληματίδας. Εννοείται επίσης ότι μοσχεύματα λαμβάνονται μόνο από υγιή πρέμνα και όχι από πρέμνα που έχουν προσβληθεί από εχθρούς και ασθένειες. Επίσης τα μοσχεύματα

πρέπει να λαμβάνονται από καλά ξυλοποιημένες κληματίδες. Η καλή ξυλοποίηση συσχετίζεται με τον επαρκή εμπλουτισμό των κληματίδων με υδατάνθρακες που συνιστούν ευνοϊκό παράγοντα ριζογένεσης.

Τα μοσχεύματα πρέπει να παραμείνουν στο υπόστρωμα ριζοβολίας ή στο έδαφος, μέχρις ότου αποκτήσουν 2-3 καλά αναπτυγμένες ρίζες. Τα μοσχεύματα αυτά τα οποία δεν έχουν αναπτύξει επαρκές ριζικό σύστημα (δηλαδή 2-3 καλά αναπτυγμένες ρίζες) καλό είναι να μη χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια τα ριζοβολημένα πλέον μοσχεύματα εάν είναι ανεμβολίαστα εμβολιάζονται με τις επιθυμητές ποικιλίες ή εάν είναι εμβολιασμένα προωθούνται για φύτευση στο χωράφι.

ΕΜΒΟΛΙΟΦΟΡΕΣ ΚΛΗΜΑΤΙΔΕΣ

Εμβολιοφόρες κληματίδες, είναι οι κληματίδες αυτές από τις οποίες θα παρθούν τα εμβόλια. Οι εμβολιοφόρες κληματίδες συλλέγονται κατά τη διάρκεια του χειμερινού κλαδέματος από πρέμνα ηλικίας άνω των 5 ετών, τα οποία ευρίσκονται σε άριστη θρεπτική ισορροπία, αντιπροσωπεύουν την ποικιλία και τον κλώνο της επιθυμητής ποικιλίας και είναι σε άριστη υγιεινή κατάσταση. Το μήκος τους δεν πρέπει να είναι μικρότερο από μισό μέτρο και πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε οφθαλμούς, εννοείται σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το πάχος τους πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 6,5mm.

Οι εμβολιοφόρες κληματίδες χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν η οποία βέβαια μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, από καλλιεργητή σε καλλιεργητή και από φυτωριούχο σε φυτωριούχο. Μια συνήθης μέθοδος είναι να στρωματώνονται μέσα σε διάφορα υλικά (τύρφη, περλίτης, πριονίδι ξύλου κ.λπ.), σε χώρους με υψηλή σχετικά υγρασία, επαρκή αερισμό και χαμηλή θερμοκρασία. Κατά μια άλλη μέθοδο τοποθετούνται μέσα σε πλαστικές σακούλες οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία 1° C. Κατά μια άλλη τεχνική πριν την τοποθέτησή τους στους πλαστικούς σάκκους, οι εμβολιοφόρες κληματίδες βυθίζονται κατά τα δύο άκρα τους σε λιωμένη παραφίνη για την πληρέστερη προστασία τους από αφυδάτωση. Πάντα βέβαια λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσβληθούν από εχθρούς και ασθένειες.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Τους εμβολιασμούς του αμπελιού τους ξεχωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε αυτούς που γίνονται σε φυτά φυτεμένα στις οριστικές τους θέσεις στο χωράφι και λέγονται επιτόπιοι εμβολιασμοί και σε αυτούς που γίνονται στο φυτώριο, ή σε κάποιο άλλο κλειστό χώρο και ονομάζονται επιτραπέζιοι εμβολιασμοί.

Επιτόπιοι εμβολιασμοί.

Α. Μαγιόρκειος εμβολιασμός ή εμβολιασμός με κοιμώμενο μάτι. Εφαρμόζεται σε νεαρά ετήσια φυτά αμπέλου τα οποία νωρίς το φθινόπωρο ευρίσκονται σε πολύ καλή βλαστική κατάσταση. Μάλιστα καλό είναι να ποτίσουμε τα νεαρά φυτά μια εβδομάδα πριν τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός γίνεται κοντά στο έδαφος, σε κληματίδες που έχουν πάχος περίπου ένα εκατοστό ή και περισσότερο. Η διαδικασία του εμβολιασμού φαίνεται αναλυτικά στις παρακάτω εικόνες (Α,Β,Γ,Δ).



A



B



Г



Δ

Εικ. Α,Β,Γ,Δ. Α,Β: Κόβουμε ένα μέρος της φλούδας από το υποκείμενο με πολύ λίγο ξύλο σε σχήμα σφήνας, όπως φαίνεται στη φωτογραφία Γ (χωρίς τους οφθαλμούς). Αφαιρούμε από το εμβόλιο το μάτι, το οποίο πρέπει να είναι καλά ψημένο, με λίγο ξύλο, σε σχήμα σφήνας, όπως ακριβώς φαίνεται στη φωτογραφία Γ. Τοποθετούμε το μάτι μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο νερό, ώστε να μην αφυδατωθεί. Δ: Τοποθετούμε το μάτι από το εμβόλιο μέσα στην τομή του υποκειμένου. Οι τομές στο υποκείμενο και στο εμβόλιο πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ώστε όταν τοποθετηθεί το μάτι μέσα στη σχισμή, η επαφή να είναι τέλεια. Στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορες μηχανές που πετυχαίνουν τομές ακριβώς ιδίων διαστάσεων στο υποκείμενο και στο εμβόλιο.

Ακολουθεί επιμελημένο δέσιμο, σκέπασμα του εμβολίου με ένα αμπελόφυλλο και ελαφρύ παράχωμα για να διατηρήσει την υγρασία του. Το μέρος του εμβολιασμού καλό είναι να μείνει καλυμμένο με χώμα όλο το χειμώνα, για να προφυλαχτεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Β. Εγκεντρισμοί.

Β.1 Εγκεντρισμός με σχισμή (κοίτα παρακάτω εικ.). Γίνεται συνήθως στον αμπελώνα, τέλη άνοιξης, τον πρώτο ή το δεύτερο χρόνο μετά τη φύτευση των απλών, ή αλλιώς ανεμβολίαστων μοσχευμάτων. Όταν το κλήμα είναι πολύ χοντρό, το φυτό δηλαδή είναι μεγάλης ηλικίας, είναι πιο δύσκολο να πετύχει ο εμβολιασμός αυτός, διότι δεν επουλώνεται εύκολα η τομή.




Εγκεντρισμός με σχισμή



Εγκεντρισμός σε μεγάλης ηλικίας πρέμνο για αλλαγή της ποικιλίας. Η τομή ακολούθως θα καλυφθεί με κόλα εμβολιασμού.

Β.2 Πλάγιος εγκεντρισμός.



Πλάγιος εγκεντρισμός

Όπως φαίνεται στην επάνω εικόνα, κάνουμε μια λοξή τομή στην κληματίδα που πρόκειται να εμβολιάσουμε. Φτιάχνουμε ανάλογα μια σφήνα με ένα μάτι από το εμβόλιο, τοποθετούμε όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα και καλύπτουμε με αλοιφή εμβολιασμού.



Αλλαγή ποικιλίας με εμβολιασμό τύπου Ταφ στον Τύρναβο . Ο κορμός του πρέμνου κόπηκε το Φεβρουάριο και ο εμβολιασμός έγινε αρχές Απρίλη. Οι εμβολιοφόρες κληματίδες είχαν μαζευτεί κατά το χειμερινό κλάδεμα και είχαν διατηρηθεί στο ψυγείο. Την προηγούμενη μέρα του εμβολιασμού είχαν βγεί από το ψυγείο και είχαν τοποθετηθεί στο νερό.

Επιτραπέζιοι εμβολιασμοί


Οι επιτραπέζιοι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται σε κλειστούς, ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες για την επιτυχία του εμβολιασμού. Την περίοδο του εμβολιασμού οι κληματίδες των υποκειμένων κόβονται συνήθως σε τεμάχια των 40 εκ. και τα εμβόλια-κληματίδες συνήθως σε μικρότερα τεμάχια, ανάλογα βέβαια και με το είδος της εμβολιαστικής μηχανής και έπειτα τοποθετούνται (υποκείμενο και εμβόλιο) στις εμβολιαστικές μηχανές οι οποίες, κάνοντας ένα είδος τομής (ωμέγα, σταυρωτή κ.λπ.) τοποθετούν το ένα μέσα στο άλλο (κοίτα παρακάτω εικ.).



Επιτραπέζιος εμβολιασμός τομής σχήματος Ω.



Φαίνεται το μηχάνημα εμβολιασμού και διάφορες τομές Ω, V, T



Διάφορες τομές σε επιτραπέζιους εμβολιασμούς.



Επιτραπέζιοι εμβολιασμοί με εμβολιαστικές μηχανές



Εμβολιασμένα μοσχεύματα τοποθετημένα σε κιβώτιο προκειμένου να επέλθει συγκόλληση στο σημείο εμβολιασμού



Μετά τον εμβολιασμό, τα εμβολιασμένα μοσχεύματα παραφινώνονται.



Μηχανή επιτραπέζιου εμβολιασμού. Στη μηχανή τοποθετούνται κληματίδες και από το υποκείμενο και από το εμβόλιο. Η μηχανή κάνει δύο τομές (αρσενικό-θηλυκό), έτσι ώστε η μια (κληματίδα) να θηλυκώνει μέσα στην άλλη.

Αμέσως μετά τον εμβολιασμό οι κληματίδες εμβαπτίζονται σε παραφίνη, με ορμόνη και μυκητοκτόνα για την προστασία και την καλύτερη δυνατή ένωση υποκειμένου και εμβολίου. Έπειτα, τοποθετούνται σε στρώσεις σε ξύλινα κιβώτια, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Μέσα στο κιβώτιο προστίθεται άμμος για την κάλυψη των κενών χώρων και την ομοιόμορφη διατήρηση της υγρασίας. Τα κιβώτια τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες για 10-15 ημέρες, σε θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών Κελσίου και υγρασία 80% ώστε να επιτευχθεί συγκόλληση υποκειμένου και εμβολίου. Μετά την επιτυχή συγκόλληση οι κληματίδες τοποθετούνται για ριζοβόληση.


ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑ

Επειδή η φυλλοξήρα προσέβαλε όλους τους αμπελώνες της χώρας μας, η μέθοδος του πολλαπλασιασμού της αμπέλου με καταβολάδα χρησιμοποιείται πολύ σπάνια και σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών σε μητρικούς αμπελώνες αμερικάνικων υποκειμένων ή για την κάλυψη κενών σε μη φυλλοξηριώσες


περιοχές (που είναι πολύ σπάνιο να βρεί κάποιος στη χώρα μας) όπως π.χ. στη νήσο Σαντορίνη.

Στις φυλλοξηριώσεις περιοχές χρησιμοποιείται πολλές φορές για να καλύψει τα κενά από φυτά αμπέλου που κατεστράφησαν διότι είναι μάλλον αδύνατον στο αμπέλι στη θέση ενός φυτού που κατεστράφηκε να φυτέψουμε ένα καινούργιο φυτό και να "πιάσει".

Εννοείται όμως ότι τα καινούργια φυτά που θα προκύψουν (από την καταβολάδα) θα είναι ευάλωτα στη ριζόβια φυλλοξήρα αφού θα είναι αυτόρριζα ευρωπαϊκά αμπέλια. Παλαιότερα, πριν την εμφάνιση της φυλλοξήρας, που οι αμπελώνες ήταν αυτόρριζοι, (δηλαδή δεν ήταν εμβολιασμένοι σε αμερικάνικα υποκείμενα) η δημιουργία καινούργιων φυτών, γινότανε με καταβολάδες ή με τη ριζοβολία μοσχευμάτων.



Απλή καταβολάδα



Οφιοειδής καταβολάδα

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η απλή καταβολάδα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μια μακριά σχετικά μήκους κληματίδα της κόμης του πρέμνου κάμπτεται μέσα σε αυλάκι βάθους 20 – 30 cm με τέτοιο τρόπο ώστε, να παραμείνουν δύο -τρεις μόνο οφθαλμοί εκτός εδάφους, όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες. Το επάκριο μέρος της κληματίδας που είναι εκτός εδάφους το κρατάμε όρθιο, δηλαδή σε κατακόρυφο θέση, δένοντάς το σε ένα πάσσαλο. Το αυλάκι καλύπτεται με υγρό χώμα έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η ριζοβολία της κληματίδας. Οι οφθαλμοί που βρίσκονται από το σημείο έκφυσής της από το αρχικό πρέμνο έως την επιφάνεια του εδάφους αφαιρούνται. Επίσης, καλό είναι να χαράζεται ή να “στρίβεται” ελαφρά το μέρος της βέργας που θα μπει μέσα στη γή, ώστε να ενθαρρυνθεί η έκπτυξη των ριζών. Καταλληλότερος χρόνος εφαρμογής της μεθόδου αυτής είναι ο χειμώνας, λίγο πριν την έναρξη της βλάστησης την άνοιξη. Την επόμενη βλαστική περίοδο οι οφθαλμοί που βρίσκονται εκτός εδάφους αρχίζουν να εκπύσσονται και να δίνουν βλαστούς, ενώ από τα γόνατα που βρίσκονται εντός του εδάφους αρχίζουν να εκπύσσονται ρίζες. Η αποκοπή της καταβολάδας από το μητρικό φυτό γίνεται όταν η καταβολάδα έχει αναπτύξει επαρκές ριζικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να επιβιώσει μόνη της όταν αποκοπεί από το μητρικό φυτό. Συνήθως αποκόπτεται μετά από δύο έως τρία έτη. Παραλλαγή της απλής καταβολάδας είναι η οφιοειδής καταβολάδα όπως φαίνεται στην εικόνα. Το πρέμνο το οποίο “θρέφει” καταβολάδες προετοιμάζεται με ειδικό τρόπο, συγκεκριμένα φορτώνεται με λιγότερα σταφύλια και δέχεται αυξημένες φροντίδες όσο καιρό τροφοδοτεί την καταβολάδα με νερό και θρεπτικά στοιχεία.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πριν εμφανιστεί η φυλλοξήρα οι καταβολάδες ήταν ο κύριος τρόπος, όχι μόνο συμπλήρωσης των κενών του αμπελώνα μας, αλλά και πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Διακρίνεται ο κορμός και οι κληματίδες που έχουν κλαδευτεί, οι οποίες ονομάζονται παραγωγικές μονάδες. Οι μεγάλες τομές πρέπει να αποφεύγονται διότι κάνουν το αμπέλι να “γερνά” γρήγορα και όταν γίνονται θα πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.



Χαράκι στον κορμό του πρέμνου

ΓΕΝΙΚΑ

Το κλάδεμα του αμπελιού διακρίνεται σε **κλάδεμα διαμόρφωσης** και σε **κλάδεμα καρποφορίας**. Το κλάδεμα καρποφορίας διακρίνεται σε χειμερινό που γίνεται το χειμώνα, κατά τη διάρκεια του ληθάργου και σε θερινό που γίνεται κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

Το κλάδεμα διαμόρφωσης γίνεται κυρίως τα πρώτα χρόνια της ζωής του πρέμνου, αλλά και αργότερα, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και παραγωγικού σχήματος, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας που επιθυμούμε.

Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται κάθε χρόνο και έχει σκοπό τη ρύθμιση της παραγωγής. Διακρίνεται σε κοντό, κατά το οποίο οι κληματίδες κλαδεύονται στα 1-3 μάτια (και ονομάζονται κεφαλές), σε μακρύ κατά το οποίο οι κληματίδες κλαδεύονται στα 4 μάτια και άνω (και ονομάζονται αμολυτές) και σε μικτό κατά το οποίο στο πρέμνο αφήνονται και κεφαλές και αμολυτές. Οι κεφαλές και οι αμολυτές ονομάζονται παραγωγικές μονάδες.

Το κλάδεμα καρποφορίας έχει σκοπό:

- α. Να ισορροπήσει την παραγωγή με τη βλάστηση σε συνδυασμό με την ηλικία και την ευρωστία του πρέμνου.
- β. Να "ενθαρρύνει" το πρέμνο στο να δίνει σταθερή παραγωγή κάθε έτος.
- γ. Να βελτιώσει την ποιότητα των σταφυλιών.
- δ. Να διατηρήσει το σχήμα του πρέμνου.

Από τα **σχήματα διαμόρφωσης** που εφαρμόζονται σήμερα, ξεχωρίζουν τα τρία βασικά (με διάφορες παραλλαγές το καθένα, ανάλογα με την κάθε περιοχή, την ποικιλία και τον καλλιεργητή) δηλαδή το **κυπελλοειδές**, το **γραμμικό** και η **κρεβατίνα** όπως φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.

Η επιλογή του συστήματος διαμόρφωσης και του κλαδέματος καρποφορίας είναι καθοριστικής σημασίας και πρέπει να έχουν προαποφασιστεί πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα, αφού σχετίζονται με την επιλεγμένη ποικιλία, το έδαφος, τις αποστάσεις φύτευσης των φυτών και το κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης.

Στη χώρα μας έχουν επικρατήσει τα γραμμικά σχήματα, ενώ το κυπελλοειδές έχει διατηρηθεί σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, ειδικά σε αυτές με ξηροθερμικό κλίμα, όπως στα νησιά του Αιγαίου και σε ορισμένους ορεινούς, παλαιούς αμπελώνες, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε επικλινείς "δύσβατες" περιοχές που είναι δύσκολο να γίνει μηχανοποίηση της καλλιέργειας όπως στην Αιγιαλεία, Ζίτσα και Ραψάνη. Διατηρείται κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους, γιατί τα φυτά δε χρειάζονται μόνιμη υποστήλωση και έχουν αρκετή αντοχή στην ξηρασία. Επίσης, εάν οι αποστάσεις φύτευσης είναι κατάλληλες, επιτρέπουν τη διέλευση των γεωργικών μηχανημάτων.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όταν το αμπέλι είναι νέο, δηλαδή τα πρώτα δύο ή τρία χρόνια, ο αμπελουργός θα πρέπει να αποφασίσει το πώς θα το διαμορφώσει. Δε θα πρέπει να βιαστεί σε καμία περίπτωση στο να του δώσει το επιθυμητό σχήμα, αφού τα τρία τουλάχιστον πρώτα χρόνια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να "ψηλώσει" και να "δυναμώσει" το κλήμα, μια πολύ βασική και απαραίτητη εργασία. Σε κάθε περίπτωση και μετά τα πρώτα χρόνια αν διαπιστωθεί ότι η διαμόρφωση που έγινε κάπου "πήγε στραβά", πρέπει να γίνει αυστηρό κλάδεμα επανορθωτικό, έτσι ώστε να διορθωθεί το σφάλμα. Π.χ. ένα σφάλμα μπορεί να είναι στα γραμμικά σχήματα, το σημείο διακλάδωσης των δύο οριζόντιων βραχιόνων να γίνει πάνω από το πρώτο οριζόντιο σύρμα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επανέλθουμε με κλάδεμα επαναφοράς ώστε να "κατέβει" το σημείο σταυρώματος κάτω από το πρώτο σύρμα (κοίτα εικ.).




Το σημείο σταυρώματος των βραχιόνων πρέπει να βρίσκεται κάτω από το πρώτο σύρμα, όπως δηλαδή φαίνεται στην εικόνα. Διαφορετικά, οι παραγωγικές μονάδες και ο οριζόντιος κορμός “ξεφεύγουν” προς τα επάνω, οπότε τότε το σχήμα, μαζί με τη στήριξη και τη βλάστηση του πρέμνου να αλλοιώνονται.

Παρακάτω θα περιγραφεί ο τρόπος σχηματισμού των διαφόρων σχημάτων στο αμπέλι. Πλην όμως πρέπει να επισημανθεί ότι μπορούν να τροποποιηθούν οι τρόποι αυτοί, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι αυτό είναι λάθος, ανάλογα με τις ιδιομορφίες του κάθε φυτού, τον καλλιεργητή, την ποικιλία, την περιοχή κ.λπ.

1.Κυπελλοειδές

Κατά το πρώτο χειμερινό κλάδεμα της φυτείας, τον πρώτο χειμώνα, επιλέγουμε να κρατήσουμε μία κληματίδα του εμβολίου, συνήθως τη ζωηρότερη, την οποία και κλαδεύουμε στο ύψος ενός γονάτου, πάνω από το ύψος που θα πρέπει να έχει ο κορμός του κυπέλλου. Εδώ χρειάζεται μια παρατήρηση για το κλάδεμα των φυτών μας τον πρώτο χρόνο, η οποία ισχύει ανεξαρτήτου σχήματος μόρφωσης των πρέμνων μας. Εφόσον τα φυτά μας δεν έχουν τη δύναμη να “ανέβουν” στο σύρμα και έχουν βέργες λεπτές και αδύναμες, δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να τα “βιάζουμε” και να τα “τραβάμε” για να πάρουν το ύψος που θέλουμε. Ξανακλαδεύουμε στην ανάγκη στο ένα ή στα δύο μάτια, έως ότου το φυτό μας “πετάξει” με “όρεξη” τον εύρωστο βλαστό που θέλουμε για να τον διαμορφώσουμε (τον εύρωστο αυτό βλαστό) σε κορμό, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο βλαστός αυτός προσδένεται σε έναν κάθετο πάσσαλο ώστε να πάρει κατακόρυφη διάταξη και την άνοιξη που ακολουθεί αφήνονται να βλαστήσουν οι δύο ανώτεροι οφθαλμοί του, ενώ οι κατώτεροι όταν βλαστήσουν αφαιρούνται με το χέρι.



Σε περίπτωση που ο κύριος βλαστός δεν έχει την κατάλληλη ευρωστία, ξανακλαδεύουμε αυστηρά για να πάρουμε το βλαστό με την επιθυμητή ευρωστία, ο οποίος θα εξελιχτεί σε κορμό του πρέμνου. Επιλέγουμε τον πιο εύρωστο βλαστό και τον δένουμε στον πάσσαλο "σφιχτά" κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευθύς και κατακόρυφος και να μην κάνει "κοιλίες".

Το να γίνει ο κορμός κάθετος στο έδαφος, δεν εξυπηρετεί μόνο αισθητικούς λόγους, αλλά καθαρά λειτουργικούς και πρακτικούς. Δηλαδή, μπορούν να κινηθούν με ευκολία τα διάφορα γεωργικά μηχανήματα μέσα στον αμπελώνα μας και γίνεται καλύτερη στήριξη και ισορροπία των πρέμνων μας.

Προσοχή επίσης χρειάζεται, όταν πρόκειται να αφαιρεθεί ένας βλαστός. Πρέπει να αφαιρείται το συντομώτερο δυνατό, ώστε να μη δημιουργούνται μεγάλες τομές οι οποίες είναι εστίες μόλυνσης.

Τον επόμενο χειμώνα οι δυο αυτές κληματίδες (που προέκυψαν από τους δύο ανώτερους οφθαλμούς που τους αφήσαμε να βλαστήσουν) κλαδεύονται στους δυο οφθαλμούς για τη δημιουργία τριών ή τεσσάρων βραχιόνων. Εάν το ύψος του κυπέλλου είναι πολύ μικρό δε χρειάζεται υποστήριξη με πάσσαλο. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, η παραπάνω κλασική διαδικασία υφίσταται πολλές τροποποιήσεις, ανάλογα με τον καλλιεργητή, τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, την ποικιλία κ.λπ.

Η διάταξη που θα έχει η ετήσια βλάστηση στο κύπελλο εξαρτάται από τον αριθμό των βραχιόνων καθώς επίσης και από τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, εάν έχει δηλαδή

ορθόκλαδη ή πίπτουσα βλάστηση.



Αμπέλι διαμορφωμένο σε κύπελλο.

Το κύπελλο είναι το παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας της αμπέλου, ευρύτατα διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Το κλασσικό κύπελλο αποτελείται από έναν κατακόρυφο κορμό, μήκους 10-60 εκ. και από 3-6 συνήθως βραχίονες, κατά το δυνατόν περιμετρικά-συμμετρικά κατανεμημένους, στους οποίους σχηματίζονται τα καρποφόρα όργανα (ή αλλιώς παραγωγικές μονάδες) του φυτού, δηλαδή οι κεφαλές και οι αμολυτές. Όσο πιο ξηροθερμικό και άγονο το περιβάλλον τόσο πιο χαμηλόκορμο το κύπελλο και μικρότερου μήκους οι βραχίονες. Όσο πιο γόνιμο το έδαφος και ψυχρό, υγρό το περιβάλλον, τόσο πιο ψηλός ο κορμός και μεγαλύτερου μήκους οι βραχίονες, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των ματιών από τους ανοιξιάτικους παγετούς, ο καλός αερισμός των φύλλων και των σταφυλιών και να διευκολύνεται η μηχανική καλλιέργεια του εδάφους και όλες οι

χειρωνακτικές εργασίες του αμπελιού.

Το κύπελλο ταιριάζει κυρίως σε ορθόκλαδες και λιγότερο σε πλαγιόκλαδες ποικιλίες. Μερικοί αμπελουργοί που έχουν επιλέξει το κύπελλο για πλαγιόκλαδες ποικιλίες, όπως πχ στο Αγιωργίτικο, για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν μηχανικά τα αμπέλια τους, δένουν όλες τις κληματίδες μαζί στην κορυφή, αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών, δυσκολεύοντας την ωρίμανση των σταφυλιών και μειώνοντας τη γονιμότητα των οφθαλμών λόγω σκίασης. Επίσης, ως σύστημα διαμόρφωσης το κύπελλο ταιριάζει καλύτερα στις ποικιλίες που δέχονται κοντό κλάδεμα (επειδή έχουν γόνιμους τους κατώτερους οφθαλμούς της κληματίδας), αν και εφαρμόζεται και σε επιτραπέζιες ποικιλίες που δέχονται μακρύ κλάδεμα, όπως π.χ. στη Σουλτανίνα.

Στα Κυκλαδονήσια, λόγω των εξαιρετικά δυνατών ανέμων και της ιδιαίτερα χαμηλής βροχόπτωσης, ο κορμός του κυπέλλου είναι μικρός, μόλις ξεπερνά τα 10εκ. και οι βραχίονες είναι 3-5. Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής παραγωγής στις άγονες αυτές περιοχές, οι κληματίδες κλαδεύονται σε μεγάλο μήκος (όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες) με αποτέλεσμα είτε να έρπουν στο έδαφος δημιουργώντας τις απλωταριές, είτε να περιστρέφονται αναμεταξύ τους σχηματίζοντας κουλούρες ή αλλιώς σαντορινιές καλαθιές, όπως συνηθίζεται στη Σαντορίνη, για να προστατεύονται τα σταφύλια, που βγαίνουν μέσα στην κουλούρα, από τον άνεμο, την ξηρασία και τα εγκαύματα από τον ήλιο (κοίτα παρακάτω εικόνες).



Απλωταριά στη Σαντορίνη



Σαββατιανό σε χαμηλό κύπελλο στην Αττική



Σαντορινιά καλαθιά ή κουλούρα. Ο ιδιόμορφος Σαντορινιός αμπελώνας είναι γνωστός καταρχάς για τα μοναδικά ηφαιστειογενή εδάφη του. Μάλιστα είναι ο πιο γηραιός στον Ελλαδικό χώρο, κι αξιοσημείωτο είναι πως μερικά αμπέλια μπορεί να είναι και 300 χρόνων, αφού η φυλλοξήρα δεν "έφτασε" ποτέ στη Σαντορίνη. Από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του μικροκλίματος στο νησί αυτό είναι η μεγάλη ανομβρία, οι σφοδροί βοριάδες που σαρώνουν τα πάντα, αλλά και η πυκνή νυχτερινή ομίχλη που "ανεβαίνει" από την καλντέρα (δηλαδή τον κρατήρα του ηφαιστείου) και προσφέρει την αναγκαία υγρασία. Αν και οι αμπελουργοί έχουν εφεύρει το μοναδικό αυτό τρόπο κλαδέματος των αμπελιών που είναι πλεγμένα σαν κουλούρες, για να προφυλάσσουν τα σταφύλια από τους ανέμους, ωστόσο οι στρεμματικές αποδόσεις στη Σαντορίνη είναι απίστευτα χαμηλές, περί τα 300–400 κιλά ανά στρέμμα! Εδώ καλλιεργείται σε σημαντική έκταση το Ασύρτικο, η λευκή αυτή ποικιλία με την υψηλή οξύτητα και την ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Απ' αυτή την ποικιλία, σε συνοינוποίηση με το Αθήρι και το Αηδάνι, φτιάχνεται ο οίνος Π.Ο.Π. Σαντορίνη, αλλά και το γλυκό κρασί Vinsanto. Συγκεκριμένα για την παραγωγή του Vinsanto τα σταφύλια, πριν "πατηθούν" λιάζονται για 10-12 ημέρες και το παραγόμενο κρασί παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια.



Στις κουλούρες της Σαντορίνης τα σταφύλια προστατεύονται από την ξηρασία, τον ήλιο και τους αέρηδες διότι βγαίνουν μέσα στην κουλούρα.

2.Γραμμικό



Αμπελώνας σε γραμμικό σύστημα στην Ισπανία, όπου όλες σχεδόν οι εργασίες γίνονται μηχανικά.



Αμπελώνας σε γραμμικό σύστημα καλυμμένος με δίχτυ για προστασία των σταφυλιών από τα πουλιά, τις σφήκες κλπ.



Τα γραμμικά συστήματα βοηθούν στη μηχανοποίηση της καλλιέργειας



Αμπελώνας σε γραμμικό σύστημα.



Αμπελώνας σε γραμμικό σύστημα.

Τα κυπελλοειδή συστήματα διαμόρφωσης έχουν δώσει σταδιακά τη θέση τους σε πιο ανεπτυγμένα σχήματα, αφού αποδείχτηκε στην πράξη ότι η καλύτερη σχέση ποιότητας σταφυλιών και ποσότητας εξασφαλίζεται από ανεπτυγμένα σχήματα, όπως είναι τα γραμμικά συστήματα διαμόρφωσης, τα οποία με την υποστύλωση εξασφαλίζουν ικανοποιητική φυλλική επιφάνεια, καλά διευθετημένη στο χώρο, ώστε να φωτοσυνθέτει στο μέγιστο βαθμό. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των γραμμών, τόσο ψηλότεροι θα πρέπει να είναι οι πάσσαλοι, ώστε ο λόγος φυλλική επιφάνεια / απόσταση φύτευσης μεταξύ των γραμμών να είναι περίπου 1. Η τιμή αυτή εξασφαλίζει ότι η ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, θα προσλαμβάνεται από τα φύλλα και όχι από το έδαφος. Επιπλέον, η απόσταση των φυτών επί της γραμμής είναι καλό να μην είναι μικρότερη από 1 μέτρο ώστε να αποφεύγεται η αλληλοσκίαση των φυτών, ο υπερβολικός ανταγωνισμός των ριζών αλλά και να δίνεται επαρκής χώρος στην ποικιλία να εκφράσει την ευρωστία της μέσω της κατάλληλα διευθετημένης στο χώρο φυλλικής επιφάνειας και της αντίστοιχης παραγωγής, ιδιαίτερα σε εύρωστες και ζωηρές ποικιλίες όπως π.χ. στο Ξινόμαυρο Ναούσης.

Τα πλέον διαδεδομένα γραμμικά συστήματα είναι το **Guyot** και το **Royat**. Και τα δύο αυτά διακρίνονται σε μονό και σε αμφίπλευρο. Επίσης, ένα σχετικά καινούργιο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των φυτών αμπέλου, με διάφορες φυσικά παραλλαγές, είναι η **λύρα**, γνωστή και ως **γραμμική σκάφη** ή **V**.

Κοινό χαρακτηριστικό έχουν την στήριξη των πρέμνων σε σειρές συρμάτων, συνήθως τρία σύρματα, τα οποία βρίσκονται σε μέτριου ύψους πασσάλους, από 1,2 έως και 2,2 μ., ανάλογα με την περιοχή και τους ανέμους. Η απόσταση από σύρμα σε σύρμα είναι

συνήθως 0,40 εκ.

Η υποστύλωση των πρέμνων είναι αναγκαία για να διατηρηθούν ο κορμός και οι βραχίονες στη διευθέτηση που τους δόθηκε με το κλάδεμα σχήματος και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις και οι κάμψεις τους. Η υποστήριξη έχει επίσης σκοπό να δώσει στο φυτό ορισμένη διάταξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσδεση και διευθέτηση των κληματίδων και των βλαστών. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την υποστύλωση είναι οι πάσσαλοι (ξύλινοι, τσιμεντένιοι, σιδερένιοι), τα σύρματα και οι αντηρίδες.

Αναλυτικότερα, τα **πλεονεκτήματα των γραμμικών συστημάτων** είναι:

- Το μεγαλύτερο μήκος κορμού με αποτέλεσμα τα σταφύλια να κατανέμονται σε μεγαλύτερη απόσταση αναμεταξύ τους και να διευθετούνται καλύτερα (κοίτα παραπάνω εικόνες).
- Τα σταφύλια, αλλά και η βλάστηση στηρίζονται και έτσι προστατεύονται καλύτερα από τους αέρηδες και κατά συνέπεια από τους τραυματισμούς. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιτραπέζιες ποικιλίες που συνήθως έχουν μεγάλα και βαριά σταφύλια και η εμφάνισή τους "μετράει" τα μέγιστα στην εμπορικότητά τους.
- Χρειάζονται λιγότερες ώρες εργασίας, με οτιδήποτε θετικό αυτό συνεπάγεται.
- Τα φυτά βρίσκονται σε φωτεινότερο και υγιεινότερο περιβάλλον, με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα όπως με λιγότερους κινδύνους προσβολών, μεγαλύτερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, περισσότερους γόνιμους οφθαλμούς κ.λπ.
- Διευκολύνουν την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, τόσο αυτών που γίνονται μηχανικά, όσο και αυτών που γίνονται χειρωνακτικά.
- Ο παραγωγός εργάζεται σε πιο ευχάριστο περιβάλλον, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ψυχολογίας του άρα και της αποδοτικότητας της εργασίας του.
- Η ίση περίπου απόσταση των σταφυλιών από το έδαφος οδηγεί σε ομοιόμορφο χρωματισμό και ωρίμανση.
- Ο παραγωγός μπορεί να ελέγξει καλύτερα την παραγωγή του, αφού "βλέπει" καλύτερα όλα τα σταφύλια του. Επιπλέον, η διάταξη αυτή των σταφυλιών τα "προβάλλει" καλύτερα, που είναι θετικό και για τον καλλιεργητή και για τον υποψήφιο αγοραστή.
- Οι διάφορες εργασίες είναι πιο τυποποιημένες, άρα μπορεί να τις μάθει πιο εύκολα ένας

καινούργιος αμπελοκαλλιεργητής.

Μειονεκτήματα των γραμμικών συστημάτων:


- Το μεγαλύτερο κόστος υποσύλωσης, λόγω των υλικών και των εργατικών εξόδων.
- Η αναγκαιότητα άρδευσης και αυξημένης γονιμότητας στο έδαφος, διότι τα πρέμνα έχουν αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις λόγω της μεγαλύτερης ανάπτυξής τους.



Μηχανική συγκομιδή γραμμικού αμπελώνα. Εννοείται ότι οι επιτραπέζιες ποικιλίες δε συγκομίζονται μηχανικά τα σταφύλια.

Guyot Το σχήμα αυτό αποτελεί την πιο απλή μορφή γραμμικής υποστηριγμένης διαμόρφωσης. Εφαρμόζεται σε ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών που οι πρώτοι οφθαλμοί των κληματίδων είναι συνήθως άγονοι όπως π.χ. στο Ραζακί, σε οινοποιήσιμες ποικιλίες μικρής γονιμότητας π.χ. στο Traminer, σε ποικιλίες που καλλιεργούνται σε φτωχά εδάφη ή σε ψυχρές περιοχές π.χ. στο Ασύρτικο στο Αμύντεο καθώς και σε ποικιλίες με πολύ πυκνό σταφύλι όπως π.χ. στη Μαλαγουζιά. Γενικά, είναι ένα σύστημα που θεωρείται κατάλληλο όταν ο στόχος είναι η αυξημένη παραγωγή.


Στο απλό Guyot το φυτό αποτελείται από έναν κορμό μήκους 40-70cm, στα ανώτερο τμήμα του οποίου (και κάτω από το πρώτο σύρμα της υποστήλωσης) δημιουργούνται τα καρποφόρα όργανα του πρέμνου, συνήθως μια κεφαλή των 2 ματιών (ανάλογα με την περιοχή και την ποικιλία και για λόγους ασφαλείας μπορούμε να αφήσουμε και 3 μάτια) και μια αμολυτή, το μήκος της οποίας ποικίλει ανάλογα με την απόσταση φύτευσης επί της γραμμής, την ποικιλία και την επιδιωκόμενη παραγωγή. Η αμολυτή, απλώνεται στο πρώτο σύρμα της υποστήλωσης και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή, αφαιρείται από τη βάση της και η νέα αμολυτή δημιουργείται από την ανώτερη κληματίδα της κεφαλής, ενώ η κατώτερη κληματίδα της κεφαλής κλαδεύεται στα 2-3 μάτια. Στα γόνιμα εδάφη ή στην περίπτωση που επιδιώκουμε αυξημένη παραγωγή συνηθίζεται και το διπλό Guyot, το οποίο αποτελείται από έναν κορμό, μια κεφαλή των 2-3 ματιών και δύο αμολυτές.



Αμφίπλευρο Γκιγιότ

Royat γνωστό και ως γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι. Είναι το πιο συνηθισμένο σύστημα διαμόρφωσης των περισσότερων ποικιλιών στην Ελλάδα. Στο σύστημα αυτό το φυτό, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, αποτελείται από έναν κορμό ύψους 40-70 εκ. και δύο μόνιμους βραχίονες που απλώνονται στο πρώτο σύρμα της διαμόρφωσης, μήκους 50-70 εκ. Πάνω στους βραχίονες δημιουργούνται 5-6 κεφαλές των 2 ματιών (2-3 κεφαλές σε κάθε βραχίονα). Οι κεφαλές απέχουν αναμεταξύ τους 10-20εκ. ώστε να μην αλληλοκαλύπτεται το φύλλωμα και να εξασφαλίζεται ο φωτισμός και ο αερισμός των κληματίδων και των σταφυλιών. Σε περίπτωση που οι δύο βέργες, που θα αποτελέσουν τους οριζόντιους βραχίονες, δεν είναι πολύ εύρωστες, τις πλαγιάζουμε στο οριζόντιο σύρμα και τις κλαδεύουμε αυστηρά, αλλά προσέχουμε το ακραίο μάτι να είναι από την κάτω μεριά της βέργας, για να συμπληρώσουμε τον επόμενο χρόνο το απαραίτητο μήκος του βραχίονα.

Το γεγονός ότι το σύστημα αυτό είναι εύκολο στην εφαρμογή του και σε συνδυασμό με το ότι οι περισσότερες ελληνικές ποικιλίες όπως Ξινόμαυρο, Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο, Ασύρτικο, Αθήρι, Κοτσιφάλι, Μαυροδάφνη αλλά και οι πιο συνηθισμένες διεθνείς ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay κλπ. δέχονται κοντό κλάδεμα, δηλαδή στα 1-3 μάτια, οδήγησε στην επικράτηση του Royat στις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές της χώρας.



Αμφίπλευρο Ρουαγιά



Αμφίπλευρο Ρουαγιά.

Λύρα. Είναι σχετικά καινούργιο στη χώρα μας, με διάφορες παραλλαγές. Εδώ θα αναφερθούμε στην κλασσική λύρα. Το φυτό αποτελείται από έναν κορμό ύψους 40-70 εκ. και 4 βραχίονες, δύο κάθετοι στην κατεύθυνση της γραμμής και δύο παράλληλοι στη γραμμή με αντίθετη φορά μεταξύ τους, πάνω στους οποίους δημιουργούνται 10-12 κεφαλές των 2 ματιών (κοίτα παρακάτω εικόνες).



Διακρίνονται οι βραχίονες στη Λύρα



Πάσσαλοι υποστήριξης αμπελώννα σε σχήμα λύρας



Αμπέλι σε σχήμα λύρας




Αμπέλι διαμορφωμένο σε λύρα.

Το σύστημα αυτό απαιτεί πασσάλους υποστήριξης σε σχήμα λύρας όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες. Η βάση της λύρας έχει μήκος περίπου 40-50 εκ. ενώ το άνοιγμα στην κορυφή φθάνει περίπου 90-100 εκ. Έτσι κάθε φυτό φέρει δυο φυλλικά “τείχη” που απέχουν στη βάση τους 40-50 εκ. και στην κορυφή τους 90-100 εκ. Αυτή η κλίση των κληματίδων, σε σχέση με την κάθετη τοποθέτηση των κληματίδων στα δυο άλλα γραμμικά συστήματα (Ρουαγιά, Γκιγιό), είναι που εξασφαλίζει τη μέγιστη φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα και σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ποσότητα παλαιού ξύλου (διπλάσιοι βραχίονες από ότι στα κλασσικά συστήματα) εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ποσότητας και ποιότητας παραγωγής.



Ποικιλία Grimson στο Κυκλίκ διαμορφωμένο σε λύρα

Η λύρα πλεονεκτεί έναντι των άλλων γραμμικών υποστυλωμένων συστημάτων ως προς το κόστος των φυτών που είναι μικρότερο αφού απαιτούνται λιγότερα φυτά στο στρέμμα (180-250), στην παραγωγή που είναι μεγαλύτερη στο στρέμμα και κυρίως στη σχέση ποιότητας- ποσότητας. Βέβαια, το κόστος υποστύλωσης είναι ψηλότερο των άλλων συστημάτων, καθώς και το κόστος των θερινών κλαδεμάτων, αφού χρειάζονται περισσότερα ημερομίσθια για να διατηρηθεί το εσωτερικό του πρέμνου καθαρό ώστε να υπάρχει το επιθυμητό μικροκλίμα.



Αμπελώνας σε σχήμα "τύπου" γραμμικής σκάφης.



Στους αμπελώνες "τύπου" γραμμικής σκάφης, οι κληματίδες που φέρουν τα σταφύλια δε "δένονται". Έτσι, ωθούνται προς τα κάτω, από το βάρος των σταφυλιών, τα οποία κρέμονται στο ίδιο περίπου επίπεδο από το έδαφος. Πριν την άνθηση αφαιρούνται όλα τα φύλλα και οι ταχυφυείς βλαστοί μέχρι το τελευταίο σταφύλι, οπότε τα σταφύλια δε σκεπάζονται από τα φύλλα. Έτσι, μπορεί ο καλλιεργητής και να τα ελέγχει καλύτερα και να κάνει ευκολότερα τους ψεκασμούς φυτοπροστασίας.



Αμπελώνας σε γραμμική σκάφη. Διακρίνονται τα αντιβρόχια δίχτυα, τα οποία είναι μαζεμένα.

3.Κρεβατίνα

Τον πρώτο χρόνο ακολουθείται η ίδια διαδικασία με το κυπελλοειδές σύστημα. Στο δεύτερο χρόνο υπάρχουν δύο βραχίονες από τους οποίους θα κρατηθεί ο πιο γερός και θα δεθεί σε στήριγμα αρκετού ύψους. Επιλέγεται η πιο γερή κληματίδα και κλαδεύεται στο ύψος της κρεβατίνας, αφήνοντας δύο οφθαλμούς. Τον επόμενο χρόνο, ο πιο δυνατός βραχίονας δένεται στο κέντρο της κρεβατίνας, δίνοντας έτσι την επιθυμητή κατεύθυνση. Το χειμώνα, αφήνονται στον κεντρικό βραχίονα 6-8 μπράτσα σε κάθε πλευρά, ανάλογα με το μήκος της κρεβατίνας και την ευρωστία του πρέμνου.



Αμπελώνας σε γραμμικό σχήμα με διαπλατύνσεις προς την κορυφή, σε σχήμα "Τ" και το σχηματισμό "καπέλλου" προκειμένου να προφυλαχθούν τα σταφύλια από τα ηλιακά εγκαύματα.

Στα υποστηριγμένα σχήματα μόρφωσης του αμπελιού, πρέπει να προσέξουμε το εξής: Δεν επιχειρούμε ποτέ να απλώσουμε τους βλαστούς στα οριζόντια σύρματα κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου και όσο είναι ακόμη τρυφεροί, γιατί με την κάμψη που επιχειρούμε, σπάζουν πολύ εύκολα. Γι' αυτό, τους αφήνουμε ελεύθερους όταν είναι ακόμη

τρυφεροί και όταν κλαδεύουμε τον επόμενο χειμώνα και είναι πλέον ευλύγιστοι τους “ξαπλώνουμε” πάνω στο σύρμα.

Γενικά, οι όψιμες ποικιλίες όπως η Φράουλα, ο Σιδερίτης, η Καλμέρια κ.λπ. προτιμούν τα υψηλόκορμα γραμμικά σχήματα ή την κρεβατίνα γιατί έτσι καθυστερείται η ωρίμανση των σταφυλιών, τα σταφύλια αερίζονται καλύτερα και αποφεύγουν την υγρασία του εδάφους από τις φθινοπωρινές βροχές.

Επίσης, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε σχολαστικά και με κάθε λεπτομέρεια το κάθε πρέμνο στο σχήμα που επιθυμούμε. Πρακτικά, οι παραλλαγές όχι απλώς επιτρέπονται, αλλά επιβάλλεται πολλές φορές να γίνονται αρκεί να μην είναι σε βάρος της ποσότητας και της ποιότητας παραγωγής.

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

Το χειμωνιάτικο κλάδεμα καρποφορίας γίνεται κάθε χειμώνα και καθορίζει τον αριθμό των παραγωγικών μονάδων ανά βραχίονα και τον αριθμό των λανθανόντων οφθαλμών ανά παραγωγική μονάδα, με άλλα λόγια τον αριθμό των σταφυλιών που θα έχει κάθε πρέμνο. Το κλάδεμα απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες. Το ακλάδευτο πρέμνο έχει ένα μεγάλο αριθμό κληματίδων. Από αυτές ο αμπελουργός θα εξαιρέσει τις περισσότερες από τη βάση τους και θα κρατήσει λίγες μόνο, τις οποίες θα συντμήσει σε λίγους οφθαλμούς. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, το τμήμα της κληματίδας που παραμένει στο βραχίονα και περιέχει κάποιο αριθμό λανθανόντων οφθαλμών, ονομάζεται παραγωγική μονάδα.



Στην επάνω εικόνα το πρέμνο είναι ακλάδευτο και στην κάτω εικόνα είναι κλαδεμένο. Πάντα φροντίζουμε να “επαναφέρουμε” τους βλαστούς “πίσω” στον κορμό του πρέμνου. Δηλαδή αφαιρούμε την ανώτερη κληματίδα και κρατάμε την κατώτερη. Έτσι αποφεύγουμε να σχηματίζουμε μεγάλο κορμό στο αμπέλι, διότι ο μεγάλος κορμός γερνά γρήγορα το αμπέλι μας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής της κληματίδας που θα διατηρήσουμε ως παραγωγική μονάδα, πρέπει να είναι η ζωηρότητά της, η υγιεινή της κατάσταση, η θέση της και η κατεύθυνσή της. Κατά κανόνα εξαιρούμε την ανώτερη (γνωστή ως καβαλάρης) και διατηρούμε την κατώτερη (γνωστή ως πεζός). Επίσης, πρέπει να προσέξουμε να αφήσουμε κληματίδες που θα τις χρησιμοποιήσουμε για βραχίονες την επόμενη χρονιά εάν φυσικά χρειάζονται (ως αντικαταστάτες των παλιών) και εφόσον βρίσκονται στη σωστή θέση.

Το κλάδεμα είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, γι' αυτό συνήθως ο χρόνος κλαδέματος αποφασίζεται από τον αμπελουργό ανάλογα με τα εργατικά χέρια που διαθέτει και τον προγραμματισμό των εργασιών του. Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι το όψιμο κλάδεμα καθυστερεί την εκβλάστηση, πράγμα το οποίο είναι επιθυμητό σε περιοχές με ανοιξιάτικους παγετούς.

Το εάν θα εφαρμοστεί βραχύ, μακρύ ή μικτό κλάδεμα, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας αλλά και από το εδαφοκλιματικό περιβάλλον. Όταν οι ποικιλίες έχουν γόνιμους και τους οφθαλμούς της βάσης, εφαρμόζουμε κλάδεμα βραχύ. Αντίθετα, σε ποικιλίες που οι οφθαλμοί της βάσης είναι άγονοι, εφαρμόζουμε μακρύτερο κλάδεμα. Έτσι, για παράδειγμα οι ποικιλίες Carignan, Cinsault, Σαββατιανό, Κορινθιακή Σταφίδα δέχονται κατά κανόνα βραχύ κλάδεμα γιατί έχουν και τους κατώτερους οφθαλμούς γόνιμους. Αντίθετα, οι ποικιλίες Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Λημνιό, που έχουν τους κατώτερους οφθαλμούς άγονους, δέχονται μακρύτερο κλάδεμα.

Η Σουλτανίνα π.χ. που έχει άγονα τα μάτια της βάσης της κληματίδας μέχρι ακόμα και τον 5^ο και 6^ο κόμβο, κλαδεύεται συνήθως σε 4-5 αμολυτές των 8-10 ματιών. Τέλος, πολλές ελληνικές οινοποιήσιμες ποικιλίες γενικά, επειδή έχουν γόνιμα τα κατώτερα μάτια, δέχονται συνήθως βραχύ κλάδεμα.

Κατά κανόνα, στο μικτό κλάδεμα καρποφορίας, η αμολυτή βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο από την κεφαλή.

Από τους κλιματικούς παράγοντες, η θερμοκρασία και η κατανομή των βροχοπτώσεων επηρεάζουν το κλάδεμα καρποφορίας, ιδιαίτερα στους μη αρδευόμενους αμπελώνες. Σε ξηρές και θερμές περιοχές συνιστάται βραχύ κλάδεμα καρποφορίας, ενώ σε υγρά εδάφη συνήθως εφαρμόζεται μακρύ κλάδεμα καρποφορίας.

Οποιοδήποτε βέβαια κλάδεμα καρποφορίας και εάν εφαρμόζει ο αμπελουργός (κοντό,

μακρύ, μικτό) θα πρέπει να είναι ανάλογο της ευρωστίας του κάθε φυτού. Ζωηρά και εύρωστα φυτά μπορούν και πρέπει να θρέψουν περισσότερα σταφύλια για να ισορροπήσουν, ενώ αδύναμα φυτά λιγότερα για να δυναμώσουν.

Ένα σημείο που πρέπει να προσέξει ο κλαδευτής στα γραμμικά σχήματα και στην κρεβατίνα, είναι να μην αφήνει κεφαλές πάνω στο γύρισμα των οριζόντιων κορμών, στην “κούρμπα” δηλαδή, διότι στο συγκεκριμένο αυτό σημείο θα βγούν λαίμαργοι, οι οποίοι θα χαλάσουν το σχήμα του πρέμνου.

Επίσης, κληματίδες υποτονικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα όταν φέρουν προσβολές από πάσης φύσεως αίτια, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρούνται με το κλάδεμα και τα εργαλεία κλαδέματος στη συνέχεια να απολυμαίνονται. Καλό είναι κατά τη θερινή περίοδο να κάνουμε μια βόλτα στο αμπέλι και να τσεκάρουμε τα “ύποπτα” πρέμνα μας, τα οποία τα σημαδεύουμε και τα παρακολουθούμε μέχρι το τέλος έτσι ώστε στο κλάδεμα, να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς. Κατά προτεραιότητα αφαιρούνται οι ασθενικές κληματίδες και εκείνες που απομακρύνονται από τους βραχίονες του κλήματος.



Μηχανικό κλάδεμα αμπελών



Μηχανικό χειμερινό κλάδεμα αμπελώνων

Τα τελευταία χρόνια, που λίγο πολύ όλες οι γεωργικές εργασίες γίνονται μηχανικά και το κλάδεμα των αμπελιών έχει και αυτό μηχανοποιηθεί, όπως δείχνουν και οι παραπάνω εικόνες. Βέβαια, για να είναι αποδοτικό το μηχανικό κλάδεμα των αμπελώνων πρέπει τα χωράφια να είναι ισοπεδωμένα, να έχουμε μεγάλους αμπελώνες, τα φυτά να είναι διαμορφωμένα σε γραμμικά σχήματα και να είναι φυτεμένα σε ίσιες αποστάσεις αναμεταξύ τους και οι γραμμές φύτευσης να είναι ευθείες.

ΘΕΡΙΝΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

Είναι οι επεμβάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Με τα θερινά κλαδέματα επιδιώκουμε τη διόρθωση σφαλμάτων που έγιναν κατά το χειμερινό κλάδεμα και τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικότερων σταφυλιών.

Τα θερινά κλαδέματα είναι : 1. το βλαστολόγημα 2. το κορυφολόγημα, 3. το ξεφύλλισμα, 4. η χαραγή 5. η αφαίρεση σταφυλιών.

Βλαστολόγημα

Το βλαστολόγημα αφορά την αφαίρεση διογκωμένων οφθαλμών, ή βλαστών στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους, όταν δηλαδή έχουν μήκος το πολύ 20εκ. Όποιος κάνει βλαστολόγημα, πρέπει να γνωρίζει καλά και να κλαδεύει, γιατί πιθανόν μερικοί βλαστοί ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ως παραγωγικές μονάδες, οπότε δεν πρέπει να αφαιρεθούν. Συνήθως οι αφαιρούμενοι βλαστοί είναι άγονοι και δεν είναι χρήσιμοι για τη διαμόρφωση του κλήματος το επόμενο χειμερινό κλάδεμα ή ευρίσκονται σε ακατάλληλες θέσεις όπως π.χ. στον κορμό του πρέμνου ή στην “κούρμπα” του κορμού. Είναι όμως δυνατόν να γίνει αφαίρεση και γόνιμων βλαστών που είναι κακοσχηματισμένοι ή που η θέση τους είναι τέτοια ώστε να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων βλαστών.

Το βλαστολόγημα έχει σκοπό να προσαρμόσει τη βλάστηση στις συνθήκες του περιβάλλοντος και στην εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική. Επίσης, έχει σκοπό να συμπληρώσει το προηγούμενο χειμερινό κλάδεμα και να προετοιμάσει το επόμενο. Η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή του συμβάλλει στην καλύτερη διατροφή των βλαστών που απομένουν καθώς και των σταφυλιών που αυτοί φέρουν. Επειδή όμως αυτό στοχεύει στην εξοικονόμηση υγρασίας και θρεπτικών στοιχείων στο κλήμα, πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνεται πριν την άνθηση. Έτσι, και τα φύλλα των βλαστών που αφαιρούνται δεν έχουν συμπληρώσει την ανάπτυξή τους και κατά συνέπεια φωτοσυνθέτουν ελάχιστα ή καθόλου, δηλαδή πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για “παράσιτα” του κλήματος των οποίων η αφαίρεση θα ωφελήσει τους βλαστούς που απομένουν. Εάν η πραγματοποίηση του βλαστολογήματος καθυστερήσει, τότε αφαιρούνται φύλλα ικανά να φωτοσυνθέτουν, για τα οποία το κλήμα κατανάλωσε προϊόντα φωτοσύνθεσης, νερό και ανόργανα στοιχεία δηλαδή θα γίνει ζημιά στο κλήμα.





Από έναν οφθαλμό εκπτύχθηκε και ο κύριος (που δείχνει το κόκκινο βέλος) και ο αντικαταστάτης. Ο αντικαταστάτης αφαιρείται.

Το βλαστολόγημα αρχίζει με αφαίρεση των βλαστών από τον κορμό, δηλαδή λαίμαργων, που βγαίνουν είτε από το υποκείμενο είτε από το εμβόλιο. Στη συνέχεια γίνεται αφαίρεση αυτών που βγαίνουν από τους βραχίονες και οι οποίοι δε θα μας χρησιμεύσουν στο χειμερινό κλάδεμα, των κακοσχηματισμένων και των διπλών ή τριπλών (που προέρχονται από τη βλάστηση δύο ή τριών βλαστικών αξόνων του οφθαλμού), έτσι ώστε να αφήσουμε μόνο τον κύριο βλαστικό άξονα. Βέβαια, κατά το βλαστολόγημα δεν αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί που δεν έχουν σταφύλι, διατηρούνται μερικοί για να βοηθήσουν με το φύλλωμά τους στην αύξηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας του κλήματος.



Βλαστολόγημα αμπελιού

Στις ζωηρές ποικιλίες το βλαστολόγημα μπορεί να προκαλέσει ανθόρροια. Στην περίπτωση αυτή είναι καλύτερα να αυξηθεί το φορτίο κατά το χειμερινό κλάδεμα και να ακολουθήσει ένα ελαφρό βλαστολόγημα. Τα μικρά φυτά δεν τα βλαστολογούμε αυστηρά γιατί έτσι περιορίζουμε τη φυλλική τους επιφάνεια. Επίσης, σε περιοχές που επικρατούν ισχυροί άνεμοι δεν αφαιρούμε τους βλαστούς από τους βραχίονες γιατί μπορεί να χρειαστούν στο επόμενο κλάδεμα. Επίσης, στις περιοχές αυτές καλό είναι να μην κάνουμε αυστηρό βλαστολόγημα γιατί διαπερνώντας ο αέρας μέσα από τα κλήματα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές.

Στην πράξη, στις αμπελουργικές περιοχές όπου τα εδάφη είναι ξηρά και άγονα και που στις κριτικές για την άμπελο περιόδους υπάρχει πρόβλημα ακόμα και επιβίωσης των κλημάτων, είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο το έγκαιρο και σωστό βλαστολόγημα για εξοικονόμηση υγρασίας και προσαρμογή των κλημάτων στις εξαιρετικά δύσκολες αυτές συνθήκες. Επίσης, στα γόνιμα και αρδευόμενα εδάφη και στις ζωηρές ποικιλίες όπως Ραζακί, Σουλτανίνα, Sauvignon, Σιδηρίτη, Φράουλα κ.λπ., χρειάζονται πολλές φορές περισσότερα τον ενός βλαστολογήματα.

Με το σωστό και έγκαιρο βλαστολόγημα ο αμπελουργός επιτυγχάνει εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών συστατικών, καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των βλαστών και των σταφυλιών, καλύτερη αντιμετώπιση του περονόσπορου καθώς και άλλων μυκητολογικών ασθενειών και διευκόλυνση του επόμενου χειμερινού κλαδέματος.

Το βλαστολόγημα γίνεται με το χέρι. Ο εργάτης που το πραγματοποιεί πρέπει να γνωρίζει κλάδεμα, όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα και να σκέπτεται το παρόν και το μέλλον του κάθε κλήματος. Έτσι, επιλέγει τους βλαστούς που θα αφαιρέσει και κρατάει αυτούς που θα χρειαστούν για αντικατάσταση βραχιόνων και παραγωγικών μονάδων, καθώς και αυτούς που είναι κατάλληλοι για κάλυψη κενών στο σχήμα, ανεξάρτητα αν φέρουν ή όχι σταφύλια.

Κορυφολόγημα

Με το κορυφολόγημα αφαιρούμε τις κορυφές των βλαστών με τα μικρά φύλλα, περισσότερο ή λιγότερο κάθε φορά, ανάλογα με την ποικιλία, το σκοπό που επιδιώκουμε και την εποχή. Το κορυφολόγημα βοηθά το αμπέλι μας για τον παρακάτω λόγο:

Αν αφαιρέσουμε την κορυφή, τότε κόβουμε το ρεύμα χυμού που πηγαίνει στην κορυφή

των βλαστών και τότε οι τροφές “γυρίζουν προς τα πίσω” και τρέφουν καλύτερα τα σταφύλια. Τα σταφύλια όμως θα τραφούν καλύτερα για ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα διότι, μετά από λίγο, θα “πετάξουν” οι ταχυφυείς οπότε θα αρχίσουν και αυτοί να καταναλώνουν τροφές. Άρα με το κορυφολόγημα θα “θρέψουμε” καλύτερα τα σταφύλια μας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αν αυτό το χρονικό διάστημα το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να είναι όταν χρειάζονται τα σταφύλια μας περισσότερες τροφές (δηλαδή η περίοδος της άνθησης και η περίοδος πριν τον περκασμό) τότε μονάχα θα έχουμε το επιδιωκόμενο θετικό αποτέλεσμα από το κορυφολόγημα.

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

- Σε ποικιλίες με μεγάλη ζωηρότητα βλάστησης και επίσης σε ποικιλίες που ανθορροούν, το κορυφολόγημα ενδείκνυται να γίνεται πριν την άνθηση και μάλιστα να γίνεται σε ένα ή σε λίγα γόνατα πάνω από το ψηλότερο σταφύλι. Έτσι, ενισχύεται η καρπόδεση και οι ρώγες αποκτούν ομοιόμορφο μέγεθος. Απεναντίας, καλό είναι να μην κορυφολογούνται οι ποικιλίες που δίνουν “πυκνά” και “συμπαγή” σταφύλια, διότι με το κορυφολόγημα γίνονται πιο συμπαγή.
- Όταν βλέπουμε ότι το αμπέλι μας “διψάει” έντονα, τότε καλό είναι να κάνουμε ένα ελαφρύ κορυφολόγημα πριν τον περκασμό ή και λίγο ενωρίτερα. Έτσι, τα σταφύλια θρέφονται καλύτερα και κατά συνέπεια βελτιώνεται η ποιότητά τους.
- Κληματίδες που είναι αστήριχτες και κινδυνεύουν να σπάσουν από τον αέρα ή και εμποδίζουν την εκτέλεση διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών, πρέπει να κορυφολογούνται.
- Σε περίπτωση που η ποικιλία δεν έδωσε επαρκή παραγωγή από τους κύριους βλαστούς, τότε κορυφολογούμε ώστε να πάρουμε μια συμπληρωματική παραγωγή από τους ταχυφυείς, τα γνωστά κουδούνια ή παρατσάμπουρα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όψιμες ποικιλίες, όπως π.χ. στο Ξινόμαυρο, διότι δεν προλαβαίνουν να ωριμάσουν τα κουδούνια. Εφαρμόζεται μόνο σε πρώιμες ή μέσης εποχής ωρίμανσης ποικιλίες όπως π.χ. στο Κάρντιναλ, στη Βικτώρια κ.λπ. Η ποικιλία Φωκιανό γνωστή και ως Ερικαρά, δεν έχει ποτέ παρατσάμπουρα στους ταχυφυείς βλαστούς.
- Κορυφολογούμε τους μακριούς βλαστούς που είναι αστήριχτοι διότι εμποδίζουν την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών, κινδυνεύουν να ξεκουμπιστούν από τη

βάση τους με τον αέρα και εάν ακουμπούν σε υγρό έδαφος μολύνονται εύκολα από περονόσπορο.

- Κορυφολογούμε τους βλαστούς που εξέχουν πάνω από τα σύρματα στήριξης και “χαλάνε” το σχήμα των φυτών μας.

Σε κάθε περίπτωση η αφαίρεση πρέπει να γίνεται μετά από μελέτη του κάθε πρέμνου ξεχωριστά για την δυναμικότητά του και οπωσδήποτε πάντα διατηρώντας πέντε (5) καλά σχηματισμένα και υγιή φύλλα μετά το τελευταίο τσαμπί.

Σε κάποιες αμπελοκομικές ζώνες όπου η ξηρασία είναι πρόβλημα, εφαρμόζεται κορυφολόγημα κατά τον περκασμό (στο γυάλισμα δηλαδή των σταφυλιών) διότι τότε περιορίζεται η επιφάνεια των φύλλων που χάνουν νερό λόγω διαπνοής και ταυτόχρονα κατευθύνονται τα φωτοσυνθετικά προϊόντα στον καρπό, δυναμώνοντάς τον.

Σε μεγάλες αμπελοκομικές μονάδες το κορυφολόγημα γίνεται με μηχανές, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. Παρόλα τα μειονεκτήματα του μηχανικού κορυφολογήματος, τελικά, για να έχει επικρατήσει, σε μεγάλες φυσικά εκμεταλλεύσεις, φαίνεται ότι τα πλεονεκτήματά του (κυρίως το μειωμένο κόστος) υπερτερούν.



Μηχανικό κορυφολόγημα αμπελώνων.



Μηχανικό κορυφολόγημα στο αμπέλι.



Μηχανικό κορυφολόγημα αμπελώνα.

Ξεφύλλισμα

Το ξεφύλλισμα γίνεται για τους ίδιους περίπου λόγους με το κορυφολόγημα. Αφορά την αφαίρεση ενός αριθμού φύλλων από τη βάση των βλαστών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια (πριν την άνθηση έως και κατά την ωρίμανση) και έχει ως σκοπό κυρίως την καλύτερη έκθεση των σταφυλιών στον αέρα και τον ήλιο. Όταν το ξεφύλλισμα πραγματοποιείται πριν από την άνθηση έχει αρνητική επίδραση στην καρπόδεση και στην

ωρίμανση. Στη φάση αυτή μπορούν να αφαιρεθούν μόνο τα "πατόφυλλα" τα οποία είναι συνήθως άχρηστα. Μετά την άνθηση, το ξεφύλλισμα μπορεί να προκαλέσει καρπόρροια σε ορισμένες ποικιλίες. Κατά την ωρίμανση το ξεφύλλισμα μπορεί να έχει ευνοϊκές επιδράσεις εάν γίνεται σωστά, ενώ εάν γίνει έντονα, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δημιουργίας εγκαυμάτων στις ρώγες. Βέβαια, αν και το πρώιμο ξεφύλλισμα μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις συνιστάται να γίνεται, γιατί έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών και ασθενειών.

Αφαιρούμε τα μικρά, κακοσχηματισμένα φύλλα, ιδιαίτερα αυτά που φύονται κάτω από το πρώτο τσαμπί της κάθε καρποφόρου κληματίδας. Πάντα αφήνουμε τα μεγάλα, υγιή και καλοσχηματισμένα φύλλα που χρειάζεται το φυτό για τη φωτοσύνθεση και προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα και τους δυνατούς ανέμους.

Σε κάθε περίπτωση, οι αμπελουργοί θα πρέπει να ενεργούν ξεχωριστά για κάθε ποικιλία και ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους.

Χαράκι

Η επινόηση του χαρακώματος, δηλαδή της περιφερειακής χάραξης του φλοιού, είναι αρχαιοτάτη. Στην Ελλάδα, η χρήση της χαραγής γίνεται για πρώτη φορά γνωστή στην Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην ποικιλία Κορινθιακή σταφίδα. Από εκεί αρχικά διαδόθηκε το 1948 σε περιοχές της Πελοποννήσου και στην συνέχεια με την πάροδο του χρόνου η εφαρμογή της έγινε γνωστή και σε άλλες αμπελοκαλλιεργητικές περιοχές. Τα παλιά χρόνια, το μεροκάματο για το χαράκι της Κορινθιακής σταφίδας, που γινότανε χαμηλά στον κορμό του πρέμνου, ήταν μια χρυσή λίρα. Ήταν δικαιολογημένο βέβαια το υψηλό κόστος της συγκεκριμένης αυτής εργασίας διότι πρώτον ήταν (και) είναι μια λεπτή, δύσκολη και εξειδικευμένη εργασία και δεύτερον ο εργάτης "σουρνώνανε" κάτω στο έδαφος.

Σήμερα η χαραγή είναι μία καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζεται από πολλούς καλλιεργητές, σε πολλές ποικιλίες αγίγαρτες ή εγίγαρτες, με διαφορετικό σκοπό σε κάθε περίπτωση. Στις αγίγαρτες ποικιλίες η εφαρμογή της (που γίνεται συνήθως στην ανθοφορία) αποσκοπεί στην αύξηση του ποσοστού της καρπόδεσης, στη μείωση της ανθόρροιας και της καρπόρροιας και στην αύξηση του όγκου τις ρώγας. Στις εγίγαρτες ποικιλίες όπως πχ στην πρώιμη επιτραπέζια ποικιλία Κάρντιναλ, η χρήση της, σκοπό έχει

την πρωίμιση της παραγωγής και τον καλύτερο χρωματισμό των σταφυλιών της. Για την πρωίμιση της παραγωγής η χαραγή γίνεται κατά τον περκασμό. Η χαραγή κατά την περίοδο της ωρίμανσης έχει συνήθως αρνητικά αποτελέσματα.

Στην Κορινθιακή σταφίδα η εφαρμογή της χαραγής θεωρείται απαραίτητη για την παραγωγή εμπορεύσιμων σταφυλιών.

Με τη χαραγή αφαιρείται ένας δακτύλιος φλοιού 2-5 χιλιοστά από τον κορμό, τους βραχίονες, ακόμη και από τις παραγωγικές μονάδες του πρέμνου με ειδικό, κυρτό και πολύ κοφτερό μαχαιρίδιο (κοίτα παρακάτω εικόνες). Έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της καθόδου των προϊόντων φωτοσύνθεσης και ορμονών από τα αγγεία του φλοιού προς τις ρίζες, με αποτέλεσμα να διοχετεύονται περισσότερες τροφές στα σταφύλια. Λέμε προσωρινά γιατί η πληγή από το χαράκι επουλώνεται μετά από 20 περίπου ημέρες. Το πλάτος της χαραγής αυξάνεται με την ζωρότητα του πρέμνου και μειώνεται με την ηλικία αυτού. Κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό σημείο και για αυτό το λόγο συνήθως αυτή ξεκινά από την βάση του κορμού και κάθε έτος 5 cm ψηλότερα από το προηγούμενο σημείο. Φυσικά η χαραγή θα πρέπει να είναι μικρή σε πλάτος όταν γίνεται σε διετές ξύλο. Τα αποτελέσματά της είναι εντονότερα στην τελευταία περίπτωση. Όταν η χαραγή γίνεται σε διετές ξύλο υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν από αέρα ή από μηχανική πίεση οι βλαστοί αυτοί. Η πραγματοποίηση αυτής θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά καθώς πολύ βαθιά χαραγή (πέρα από το κάμβιο) μπορεί να βλάψει το ξύλο με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα με την κίνηση του νερού από τις ρίζες στους βλαστούς που μπορεί να επιφέρει ακόμη και ξήρανση αυτού. Επίσης πρόβλημα μπορεί να υπάρξει από την δημιουργία πληγών (μολύνσεις) αν δεν εφαρμοστούν σωστά μέτρα προφύλαξης.

Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω του υψηλού κόστους του, έχει αντικατασταθεί με το ψέκασμα των φυτών με διάφορα φυτορμονικά σκευάσματα (κυρίως γιββερελλίνες) που κυκλοφορούν στο εμπόριο και τα οποία δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε βιολογικές καλλιέργειες όμως, εάν χρειάζεται, πρέπει να γίνεται χαράκι, διότι (στις βιολογικές καλλιέργειες) απαγορεύεται η χρήση φυτορμονών. Όσον αφορά τη δόση της φυτορμόνης (ή του μίγματος φυτορμονών), την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο κάθε παραγωγός, είναι διαφορετική για κάθε φυτεία γιατί εξαρτάται από εδαφολογικούς, κλιματολογικούς και καλλιεργητικούς παράγοντες. Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέχουν να μη χρησιμοποιούν υπερβολικές ποσότητες διαλύματος ορμόνης, γιατί υπάρχει περίπτωση

ξηράνσης των βλαστών ή και ολόκληρων των κλημάτων ακόμα.



Χαράσσοντας με ένα ειδικό ψαλίδι τη φλούδα του κορμού, οδηγεί τους χυμούς του φυτού να σταματήσουν ακριβώς εκεί και να δώσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά στη ρώγα, γεμίζοντάς τη θρεπτικές ουσίες.



Στάδιο χαρακώματος.



Ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για χαράκι.

Στην άσπερμη ποικιλία Σουλτανίνα, προκειμένου τα σταφύλια της να είναι κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση, εφαρμόζονται συνήθως τρεις ψεκασμοί με φυτορμονικά σκευάσματα. Ένας πριν την άνθηση για την επιμήκυνση του σταφυλιού, ένας στην άνθηση για να γίνουν αραιές οι ρώγες και να μη γίνει τσουπωτό και πυκνό το σταφύλι και ένας μετά την καρπόδεση για να γίνουν μεγαλύτερες και πιο επιμήκεις οι ρώγες. Η τεχνική αυτή βέβαια εξελίσσεται συνεχώς δεδομένου ότι δοκιμάζονται συνεχώς καινούργια ορμονικά σκευάσματα ή και μίγματα ορμονικών σκευασμάτων.

Αφαίρεση σταφυλιών



Αφαίρεση ή "αραίωμα" σταφυλιών.

Εάν το αμπέλι έχει υπερβολικό φορτίο, αφαιρούμε μερικά σταφύλια, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Καλό είναι να αφαιρούμε τα σταφύλια ενωρίς, όταν οι ρώγες έχουν μέγεθος κεφαλής σπύρτου. Αφαιρούμε κυρίως τα σταφύλια που βρίσκονται στο πάνω μέρος της κληματίδας, αυτά τα οποία είναι κακοσχηματισμένα ή ευρίσκονται σε ακατάλληλες θέσεις. Στην ανάγκη όμως, όπως σε περιπτώσεις έντονης ξηρασίας, μπορούμε να κάνουμε αραίωμα σταφυλιών και αργότερα. Επίσης μπορούμε να αφαιρέσουμε και μέρος του σταφυλιού, όπως π.χ. το κάτω μέρος του, που σε μερικές ποικιλίες όπως Ραζακί και Σουλτανίνα είναι κακοσχηματισμένο. Το αραίωμα σταφυλιών γίνεται για τους ίδιους λόγους που γίνεται και σε ορισμένες πολυετείς καλλιέργειες όπως στη μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά κ.λπ. Δηλαδή, για να αποκτήσουν τα υπόλοιπα σταφύλια καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και το φυτό μας να μας δίνει "σταθερή" κάθε χρόνο παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή η εργασία αυτή είναι χρονοβόρα και έχει και σημαντικό κόστος, έχει αντικατασταθεί με ψέκασμα των πρέμνων με διάφορα ορμονικά σκευάσματα, με κατάλληλα βλαστολογήματα κ.λπ. Εφαρμόζεται μόνο από μεμονωμένους παραγωγούς και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν τα σταφύλια προορίζονται για απαιτητικούς καταναλωτές, ή για να είναι πιο ανταγωνιστικά στο εμπόριο, ή όταν θέλουμε να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος ώστε να είναι κατάλληλα για συσκευασία κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ- ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ -ΠΟΤΙΣΜΑ



Στάγδην άρδευση



Αμπελώνας καλυμμένος με δίχτυ για προστασία από τα πουλιά, τις σφήκες κλπ.

ZIZANIOKTONIA

Οι επιδράσεις των ζιζανίων

Το αμπέλι είναι ευαίσθητο στον ανταγωνισμό των ζιζανίων, ιδίως τα πρώτα χρόνια από την εγκατάστασή του και συνεπώς απαιτείται συνεχής έλεγχος της παρουσίας τους στον αμπελώνα.

Η πιο επιζήμια επίδραση των ζιζανίων, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ότι ανταγωνίζονται τα πρέμνα για το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους και μέσω αυτού μειώνουν την απόδοση και την ποιότητα των σταφυλιών. Οι δυσμενείς επιδράσεις των ζιζανίων εκδηλώνονται κυρίως κατά την περίοδο που το αμπέλι αναπτύσσει τη βλάστηση και τα σταφύλια του και συγκεκριμένα μόλις το νερό ή τα θρεπτικά στοιχεία αρχίσουν να μην επαρκούν για το αμπέλι, αφού τα ζιζάνια θα έχουν ήδη αφαιρέσει ένα σημαντικό μερίδιο. Επαναλαμβάνεται εδώ ότι τα νεαρά πρέμνα είναι πιο ευάλωτα στον ανταγωνισμό των ζιζανίων.

Μια άλλη, λιγότερο σημαντική αλλά μη αμελητέα επίδραση των ζιζανίων είναι ότι δυσκολεύουν ή ακόμα εμποδίζουν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και τη συγκομιδή και αυξάνουν το κόστος τους. Τα ζιζάνια τέλος, αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές εχθρών (εντόμων, ακάρεων κ.λπ.) του αμπελιού και με την παρουσία τους δημιουργούν στον αμπελώνα συνθήκες που ευνοούν τις προσβολές.

Η παρουσία όμως ζιζανίων στον αμπελώνα κατά την περίοδο του ληθάργου μπορεί να έχει ορισμένες σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

- Στα επικλινή εδάφη μειώνουν την απορροή και αυξάνουν τη συγκράτηση του νερού των βροχών ενώ παράλληλα συγκρατούν τα εδάφη από τη διάβρωση.
- Στα επίπεδα και στα βαθιά εδάφη συμβάλλουν στην απομάκρυνση της υπερβολικής υγρασίας από τις χειμερινές βροχές και τα καθιστούν βατά για την έγκαιρη έναρξη των ανοιξιάτικων εργασιών.
- Σε όλα τα εδάφη συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής δομής, προσθέτοντας οργανική ουσία, βελτιώνοντας τον αερισμό με την ανάπτυξη των ριζών τους και αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα.
- Η παρουσία ζιζανίων κατά τη χειμερινή περίοδο μέσα στον αμπελώνα και κατά την

καλοκαιρινή περίοδο σε νησίδες στα άκρα του αμπελώνα τέλος, μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό ωφελίμων αρθροπόδων τα οποία βοηθούν στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών του αμπελιού.

Η προτεινόμενη διαχείριση των ζιζανίων

Το πρόγραμμα διαχείρισης των ζιζανίων επομένως θα πρέπει να επιδιώκει την αξιοποίηση των ευεργετικών και τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων που αναφέρθηκαν ενωρίτερα.

Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στο αμπέλι ενδείκνυται να γίνεται ή με κατεργασία του εδάφους, όπως με μηχανικό σκάλισμα, με φρεζάρισμα κ.λπ., ή με χορτοκοπή (κοίτα παρακάτω εικόνες) ή με τη χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων. Εννοείται βέβαια ότι μπορεί να γίνει συνδυασμός αυτών των μεθόδων. Στους νέους αμπελώνες, προτιμάται η εφαρμογή καλλιεργητικών μεθόδων, επειδή τα νεαρά πρέμνα είναι ευαίσθητα στα ζιζανιοκτόνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πιο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων, ενώ η επανειλημμένη χρήση φρέζας πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα σε εδάφη επικλινή και φτωχά σε οργανική ουσία, επειδή κοκκοποιεί υπερβολικά το έδαφος και συμβάλλει ευθέως στην υποβάθμιση της δομής του. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει εδώ ο γενικός κανόνας, δηλαδή ότι πρέπει να γίνονται οι απολύτως απαραίτητες καλλιεργητικές επεμβάσεις στο έδαφος του αμπελώνα και ποτέ περισσότερες από τις αναγκαίες. Τους θερινούς μήνες μάλιστα, καλό είναι να μη γίνεται καμμία κατεργασία του εδάφους σε ξηρικούς αμπελώνες γιατί καταστρέφονται τα πολύ λεπτά ριζικά τριχίδια, τα οποία αναπτύσσονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως στο επάνω μέρος του εδάφους και τα οποία απορροφούν τις ελάχιστες διαθέσιμες ποσότητες εδαφικής υγρασίας. Τα λεπτά αυτά ριζικά τριχίδια, τα οποία είναι πολύτιμα για το αμπέλι, καταστρέφονται κατά τους χειμερινούς μήνες. Εάν η αντιμετώπιση των ζιζανίων γίνει με την εφαρμογή ενός ζιζανιοκτόνου, ο ψεκασμός θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν δε φυσάει αέρας και με χαμηλή πίεση ψεκασμού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε το ψεκαστικό υγρό να μην έρθει σε επαφή με τα πράσινα μέρη του πρέμνου.

Τα πολυετή ζιζάνια καλό θα είναι να αντιμετωπίζονται πριν από την εγκατάσταση του αμπελώνα. Στη συνέχεια τα ζιζάνια αυτά πρέπει να είναι σε στενή παρακολούθηση από τον

αμπελοκαλλιεργητή και να καταπολεμούνται έγκαιρα όταν εμφανίζονται σε μικρές κηλίδες μέσα στον αμπελώνα. Αν αφεθούν και δεν απομακρυνθούν έγκαιρα, σταδιακά θα επικρατήσουν σε ολόκληρο τον αμπελώνα και στη συνέχεια θα είναι δύσκολο να εξοντωθούν. Τα ζιζάνια αυτά αντιμετωπίζονται συνήθως με χρήση ζιζανιοκτόνων σε συνδυασμό με φρεζάρισμα.

Στον αμπελώνα συνιστώνται κατά σειρά οι παρακάτω επεμβάσεις:

- **Κατά τη διάρκεια του χειμώνα** μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών την άνοιξη, καλό είναι να μη γίνεται καμμία επέμβαση με ζιζανιοκτόνα, εκτός βέβαια και έχουν αναπτυχθεί μεγάλα ζιζάνια τα οποία πρέπει αναμφίβολα να εξαλειφθούν το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια από τον αμπελοκαλλιεργητή ώστε κατά τη διάρκεια του χειμώνα να υπάρχουν στον αμπελώνα ζιζάνια χαμηλού ύψους όπως η οξαλίδα, το αγριοτριφύλλο, η ήρα, διάφορα είδη βρώμης κ.λπ. (κοίτα παρακάτω εικόνες).

Τελευταία επικρατεί η άποψη ότι το χειμώνα στο έδαφος του αμπελώνα πρέπει να υπάρχει μόνο, εάν είναι δυνατόν, το ζιζάνιο οξαλίδα ή αλλιώς ξινήθρα το οποίο σχηματίζει το γνωστό "χαλί της οξαλίδας" (κοίτα εικ.). Το ζιζάνιο αυτό δεν αφήνει τα άλλα ζιζάνια να αναπτυχθούν. Επιπλέον, η οξαλίδα εξαφανίζεται από μόνη της όταν αρχίζουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι και αφήνει το έδαφος σε πολύ καλή κατάσταση. Το παραπάνω 'χαλί' είναι χρήσιμο και για την προστασία του αμπελώνα από τις παγωνιές του χειμώνα.

Ο καθηγητής κ. Δαμανάκης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που έχει μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η δράση της ξινήθρας *Oxalis pes-caprae*, στα αμπέλια είναι ευεργετικότατη. Αυτό οφείλεται στο ότι το ριζικό της σύστημα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιείται για την επέκταση της κυριαρχίας της, δρα περίπου ως υπόγειο τρυπάνι. Όταν βρεθεί σε αμπέλια και αρχίσει να προχωρεί υπόγεια δημιουργεί πολλά ανοίγματα στο έδαφος, και έτσι το έδαφος γίνεται αφράτο σαν να είναι σκαμμένο πρόσφατα. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το καλοκαίρι η οξαλίδα ξεραίνεται από μόνη της, σημαίνει ότι δε δρα ανταγωνιστικά προς το αμπέλι σε ότι αφορά το σπάνιο για εκείνη την εποχή νερό στους ξηρικούς αμπελώνες.



Το χαλί της οξαλίδας



Οξαλίδα



Αγριοτρίφυλλο (*Trifolium repens*)



Ήρα (*Lolium temulentum*)

- **Λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών της αμπέλου την επόμενη άνοιξη** πρέπει πρώτα πρώτα να καταστραφούν τα ζιζάνια που υπάρχουν κατά μήκος των γραμμών φύτευσης (κοίτα παρακάτω εικόνες). Αυτό μπορεί να γίνει ή με καλλιεργητή εδάφους ή με ζιζανιοκτονία.

-Μετά την απομάκρυνση των ζιζανίων που ευρίσκονται πάνω στις γραμμές φύτευσης των πρέμνων, θα πρέπει να απομακρυνθούν τα ζιζάνια που βρίσκονται στον υπόλοιπο αμπελώνα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μηχανικά, δηλαδή με φρεζάρισμα ή με χορτοκοπή, είτε με τη χρήση ζιζανιοκτόνου. Ανάλογα με την ανάπτυξη νέων ζιζανίων μπορεί να χρειαστεί να γίνουν επανειλημμένες επεμβάσεις. Καλό είναι να μην υπάρχουν ζιζάνια στο έδαφος μέχρι τον τρύγο. Με άλλα λόγια, **κατά τους θερινούς μήνες** δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου ζιζάνια στο έδαφος του αμπελώνα, ειδικά εάν ο αμπελώνας είναι ξηρικός.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η καλλιέργεια του εδάφους του αμπελώνα γίνεται συνήθως με φρέζα σε μικρό βάθος και αποτελεί μια αποτελεσματική και οικονομική μέθοδο αντιμετώπισης των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών. Οι βαθιές αρόσεις στο έδαφος του αμπελώνα απαγορεύονται γιατί και δαπανηρές είναι και καταστρέφουν τις ρίζες των φυτών. Βαθιά άροση ενδείκνυται να γίνεται μόνο πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνεται ότι καλό είναι το καλοκαίρι να μη γίνεται φρεζάρισμα στον αμπελώνα, ειδικά κοντά στα πρέμνα, ώστε να μην καταστρέφονται επουδενί οι πολύ λεπτές επιφανειακές ριζούλες τις οποίες αναπτύσσουν τα πρέμνα τους θερινούς μήνες για να απορροφήσουν τα ελάχιστα εδαφικά αποθέματα υγρασίας. Οι λεπτές αυτές ριζούλες καταστρέφονται μπαίνοντας ο χειμώνας.

Είναι σημαντικό επίσης κατά την κατεργασία του εδάφους να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους. Γι' αυτό το φρεζάρισμα πρέπει να γίνεται μόνον εφόσον έχει στεγνώσει καλά το έδαφος και να μη χρησιμοποιούνται ελκυστήρες μεγάλου βάρους. Το φρεζάρισμα βέβαια μπορεί να συνδυάζεται με εφαρμογή ζιζανιοκτόνων.



Καλλιέργεια εδάφους αμπελώνων με φρεζάκι. Η μέθοδος αυτή βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρής έκτασης αμπελώνες.



Καλλιέργεια εδάφους αμπελώνων κοντά στον κορμό των πρέμνων με φρεζάκι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να μην τραυματιστούν και καταστραφούν τα πρέμνα, γιατί μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον, να αντικατασταθούν με νέα φυτά. Αν τυχόν δηλαδή καταστραφούν, είναι πολύ δύσκολο ή μάλλον αδύνατον στη θέση του παλιού φυτού να αναπτυχθεί ένα καινούργιο. Γι' αυτό πολλοί παραγωγοί (στα γραμμικά σχήματα) συμπληρώνουν τα κενά, επεκτείνοντας τη βλάστηση των διπλανών φυτών.



Καλλιέργεια αμπελώνων με φρεζάκι. Πρέπει να γίνεται όταν έχει στεγνώσει καλά το έδαφος, δηλαδή όταν βγάνει “σκόνη” ή “μπουχό” στην καθομιλουμένη. Όταν φρεζάρουμε υγρό έδαφος, εξατμίζεται πιο γρήγορα το νερό του εδάφους, αυξάνεται η υγρασία κοντά στα φυτά και ευνοείται η εκδήλωση ωιδίου ή αλλιώως μπάστρας.



Κατεργασία εδάφους αμπελώνων



Φρεζάρισμα αμπελών

Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, αντί για φρεζάρισμα μπορεί να γίνει και κόψιμο των ζιζανίων με ειδικά χορτοκοπτικά μηχανήματα, προπαντός όταν το έδαφος είναι βαρύ. Η χορτοκοπή είναι ταχύτερη και οικονομικότερη μέθοδος από το φρεζάρισμα και επιπλέον μετά τη χορτοκοπή το έδαφος "πατιέται". Τα κομμένα χόρτα αφήνονται στην επιφάνεια του εδάφους και έτσι αυξάνουν την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, μειώνουν τις απώλειες νερού που εξατμίζονται από την επιφάνεια του εδάφους και επιπλέον προστατεύουν τα επικλινή εδάφη από τη διάβρωση. Εννοείται ότι όταν συνεχίζουν να βγαίνουν νέα ζιζάνια χρειάζονται επανηλειμμένες χορτοκοπές.



Χορτοκοπτικό μηχανήμα το οποίο καταστρέφει τα ζιζάνια και επί της γραμμής και μεταξύ των γραμμών. Για τη λειτουργία του απαιτεί επίπεδα εδάφη.

Άλλη μέθοδος αντιμετώπισης των ζιζανίων του αμπελώνα, τουλάχιστον κάτω από τα πρέμνα, είναι η κάλυψη του εδάφους με μαύρο πλαστικό (κοίτα εικόνα) ή με διάφορα οργανικά υλικά όπως πριονίδι, άχυρο κ.λπ. ή και πέτρες. Έτσι εμποδίζεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, ελαττώνεται η απώλεια νερού από το έδαφος λόγω εξάτμισης και αποφεύγεται η κατεργασία του εδάφους τουλάχιστον κοντά στον κορμό των πρέμνων.



Πριν από την έκπτυξη των οφθαλμών της αμπέλου την άνοιξη πρέπει απαραίτητα να έχουν εξαλειφθεί τα ζιζάνια κατά μήκος των γραμμών φύτευσης.



Η καταπολέμηση των ζιζανίων κατά μήκος των γραμμών μπορεί να γίνει μηχανικά. Βέβαια χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην τραυματιστούν τα φυτά.

Πολλοί βιοκαλλιεργητές αμπέλου το φθινόπωρο σπέρνουν βίκο (κοίτα εικόνα) ή άλλα ψυχανθή στον αμπελώνα τα οποία τα κόβουν την άνοιξη με χορτοκοπτικά. Τα κομμένα χόρτα παραμένουν στο έδαφος και μετατρέπονται σιγά σιγά σε οργανική ουσία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το άσκοπο όργωμα και φρεζάρισμα του αμπελώνα, προστατεύονται τα χρήσιμα στα αμπέλια έντομα που κατοικούν στο έδαφος, γίνεται εξαιρετική οικονομία νερού και βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους.



Κατά μήκος των γραμμών φύτευσης έχει τοποθετηθεί μαύρο πλαστικό για καταπολέμηση των ζιζανίων και για καλύτερη αποθήκευση της εδαφικής υγρασίας



Βίκος

Καλλιέργεια εδάφους

Παραδοσιακά, η πρώτη εργασία που γινότανε στο αμπέλι το φθινόπωρο ήταν το γνωστό ξελάκκωμα. Κατά το ξελάκκωμα σκάβεται γύρω γύρω ο λαιμός το πρέμνου με την αξίνα και γίνεται μια λεκάνη κατά κάποιο τρόπο, για την εναπόθεση των λιπασμάτων, για να μπορεί να αναπνέει καλύτερα η ρίζα και ο κορμός του και να εκτίθενται αρκετό διάστημα στον ήλιο και στον αέρα, που παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο για την καλή ανάπτυξη και καρποφορία του. Επίσης, κόβονται οι ρίζες που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έτους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι βαθιές ρίζες, που θα έμεναν καχεκτικές αν δεν γινόταν το ξελάκκωμα. Η σπουδαιότερη όμως ωφέλεια που προκύπτει από το ξελάκκωμα είναι ότι μαζεύεται αρκετό νερό από τις βροχές που το "πίνει" η γη ώστε την εποχή της βλάστησης και της καρποφορίας να μη διψάει πολύ το αμπέλι, πράγμα που ξέρουν οι παραγωγοί πόσο μεγάλη σημασία έχει. Βέβαια αυτό ίσχυε παλιά που όλα σχεδόν τα αμπέλια ήταν ξηρικά. Σήμερα όμως, ιδιαίτερα σε επιχειρηματικούς αμπελώνες αυτή η εργασία, το να ξελακκώνεται δηλαδή ένα ένα φυτό δεν εφαρμόζεται πρώτον γιατί σήμερα τα περισσότερα αμπέλια είναι αρδευόμενα και δεύτερον γιατί είναι πολύ επίπονη εργασία και οικονομικά ασύμφορη. Συνήθως πραγματοποιείται ένα φρεζάρισμα το φθινόπωρο, σε βάθος 10-15 εκ. για τη συγκράτηση του νερού της βροχής, για την ανάμειξη της κοπριάς που τυχόν έχει προστεθεί ή γενικά των λιπασμάτων. Δεύτερο φρεζάρισμα μπορεί να γίνει και την άνοιξη, αν κριθεί αναγκαίο, σε μικρότερο βάθος, ώστε να μην καταστραφούν οι επιφανειακές ρίζες. Επαναλαμβάνεται ότι χρειάζεται προσοχή να μη χρησιμοποιούνται βαριά μηχανήματα στον αμπελώνα, προπαντός όταν το έδαφος είναι υγρό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί αδιαπέραστο στρώμα στο υπέδαφος. Επίσης, όταν το έδαφος είναι υγρό, η απλή αναμόχλευση του εδάφους δημιουργεί υψηλή υγρασία γύρω από τα πρέμνα, πράγμα που ευνοεί την εξάπλωση του ωιδίου.

Η τάση που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια είναι η ελαχιστοποίηση της κατεργασίας του εδάφους με μηχανικά μέσα, γνωστή ως ακαλλιεργησία. Η εφαρμογή της στην αμπελουργία άρχισε, μετά τη χρησιμοποίηση των ζιζανιοκτόνων. Η ακαλλιεργησία μπορεί να συνδυαστεί είτε με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, κατά την οποία καταργείται η μηχανική καλλιέργεια του εδάφους και τα ζιζάνια αντιμετωπίζονται με χημικά μέσα, είτε με κάλυψη του εδάφους με διάφορα μέσα όπως άχυρο ή οργανική ουσία έτσι ώστε να αποτρέπεται το φύτευμα των ζιζανίων. Η ακαλλιεργησία του εδάφους, εκτός του ότι μειώνει το κόστος

παραγωγής, παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα όπως είναι η προστασία των επιφανειακών ριζών και η βελτίωση της υφής και των λοιπών ιδιοτήτων του εδάφους.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Το αμπέλι δεν είναι από τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες σε νερό, διότι παραδοσιακά καλλιεργείται σε ξηροθερμικές, μη αρδευόμενες περιοχές της Μεσογειακής ζώνης (δεδομένου ότι αγαπά την ξηρή ατμόσφαιρα) όμως, όπως όλα τα φυτά αντιδρά στην άρδευση με την αύξηση της ζωηρότητας και κατά συνέπεια της παραγωγής. Η επέκταση της αμπελοκαλλιέργειας σε ξηρές, θερμές περιοχές, η υιοθέτηση των γραμμικών σχημάτων, αλλά κυρίως ο καθοριστικός ρόλος του νερού στην ποιότητα των αμπελοκομικών προϊόντων, έχουν καταστήσει την άρδευση αναγκαία καλλιεργητική φροντίδα, ιδιαίτερα στους επιχειρηματικούς αμπελώνες. Σήμερα, στις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές της χώρας μας, η άρδευση αποτελεί πλέον μια καθιερωμένη πρακτική.

Η άμπελος, ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως το στάδιο βλάστησης, το εάν πρόκειται για κρασοστάφυλα ή για επιτραπέζιες ποικιλίες κ.λπ., έχει λιγότερες ή περισσότερες ανάγκες σε νερό.

Καταρχάς **την άνοιξη, όταν αρχίζει να "πετάει" το αμπέλι**, πρέπει στο έδαφος να υπάρχει επάρκεια υγρασίας ώστε να μπορέσει να απορροφήσει τα λιπάσματα και ιδιαίτερα το άζωτο, που έχουν προστεθεί στο έδαφος, διαφορετικά τα λιπάσματα θα μείνουν αδιάλυτα. Εάν βρέξει αργότερα, τότε τα λιπάσματα θα διαλυτοποιηθούν και θα απορροφηθούν αργότερα, σε ένα στάδιο που μπορεί να είναι επιζήμια στο αμπέλι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αζωτούχα λιπάσματα, η περίσσεια των οποίων στο έδαφος μετατρέπει τα εδάφη σε όξινα. Γι' αυτό, πρέπει να φροντίζουμε, κατά την έκπτυξη των οφθαλμών της αμπέλου την άνοιξη, να υπάρχει πάντα στο έδαφος επάρκεια υγρασίας και στην ανάγκη, εάν φυσικά υπάρχει διαθέσιμο αρδευτικό νερό, να ποτίζουμε.

Ένα άλλο κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο το αμπέλι έχει ανάγκη από νερό είναι **από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών** (δηλαδή έως το γυάλισμα ή αλλιώς περκασμό) ιδιαίτερα εάν πρόκειται για επιτραπέζιες ποικιλίες οι οποίες έχουν πάντα αυξημένες απαιτήσεις σε εδαφική υγρασία. Κατά το στάδιο αυτό γίνεται η ολοκλήρωση της αύξησης του φυλλώματος και η πρώτη φάση αύξησης της ρώγας (πράσινη

ρώγα), κατά την οποία η ρώγα αυξάνει γρήγορα σε μέγεθος. Συνεπώς, ανεπάρκεια νερού σε αυτό το στάδιο συνεπάγεται μειωμένη φυλλική επιφάνεια, μικρορραγία και μειωμένη παραγωγή. Κατά την **ανθοφορία και την καρπόδεση**, που είναι ένα ευαίσθητο στάδιο, η έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει κακή καρπόδεση (ανθόρροια), αλλά και περιορισμένες ανθικές καταβολές (που θα δώσουν την καρποφορία το επομένου έτους). Επομένως, ανάλογα οπωσδήποτε και με άλλους παράγοντες, όπως από το ύψος των βροχοπτώσεων, από τη μηχανική σύσταση του εδάφους κ.λπ. απαιτείται άρδευση κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Στη συνέχεια, **κατά την περίοδο της ωρίμανσης** (δηλαδή από το γυάλισμα μέχρι τη συγκομιδή) μέτριες ή μικρές ποσότητες νερού έχουν ευνοϊκή επίδραση στην ποιότητα, στο μέτρο που καθυστερούν την αύξηση των βλαστικών κορυφών. Το πρέμνο στο στάδιο αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κρασοστάφυλα, δεν πρέπει να ποτίζεται εκτός φυσικά και εάν επικρατεί μεγάλη ξηρασία, οπότε τότε αναγκαστικά πρέπει να γίνει ένα ελαφρύ πότισμα. Πιο ευαίσθητα στη έλλειψη εδαφικής υγρασίας στο στάδιο αυτό είναι τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία απαιτούν περισσότερη εδαφική υγρασία. Καλό είναι βέβαια ο καλλιεργητής να έχει πάρει όλα τα απαραίτητα καλλιεργητικά μέτρα (τα οποία αναφέρονται παρακάτω) ιδιαίτερα στα κρασοστάφυλα, ώστε να μην αναγκαστεί να ποτίσει στο στάδιο αυτό. Υπερεπάρκεια νερού πάνω στην ωρίμανση έχει σαν αποτέλεσμα τα μεν επιτραπέζια σταφύλια να μην ωριμάσουν σωστά και να γίνουν ευαίσθητα στους χειρισμούς ενώ τα κρασοστάφυλα να έχουν μικρό σακχαρικό τίτλο και τάση να σαπίζουν.

Οι όψιμες ποικιλίες, ιδιαίτερα οι επιτραπέζιες, θέλουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, γιατί μπορεί το φυτό λόγω ξηρασίας να έλθει σε κατάσταση stress και να παραχθούν στα φύλλα ορμόνες ληθάργου, οι οποίες επιταχύνουν την ωρίμανση, πράγμα ανεπιθύμητο, ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται η ποιότητα των σταφυλιών. Γι' αυτό οι ποικιλίες αυτές πρέπει να φυτεύονται σε εδάφη με αρκετή υδατοικανότητα ή να δέχονται επιπλέον άρδευση για να "υποστηριχτεί" η καλή και όψιμη ωρίμανση των σταφυλιών.

Μετά τη συγκομιδή, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για πρώιμες ποικιλίες και εφόσον το έδαφος "διψάει", πρέπει απαραίτητα να το ποτιστούν τα φυτά έτσι ώστε να μην πέσουν γρήγορα τα φύλλα και δεν προλάβουν να ξυλοποιηθούν "καλά" οι κληματίδες. Η καλή ξυλοποίηση των κληματίδων είναι απολύτως απαραίτητη έτσι ώστε πρώτον να αντέξουν τις χαμηλές

χειμερινές θερμοκρασίες και δεύτερον να αποθηκευτούν αρκετές τροφές προκειμένου να ξεκινήσει με “προθυμία” η έκπτυξη των οφθαλμών την επόμενη άνοιξη.

Πάντως, η πράξη έχει δείξει ότι κρασιά ποιότητας παράγονται κυρίως από ξηρικούς αμπελώνες, δηλαδή από αμπελώνες που δε δέχονται καθόλου άρδευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει με κάθε τρόπο ο παραγωγός να φροντίζει ώστε να υπάρχει μόνιμη υγρασία στο βάθος του ριζοστρώματος του αμπελώνα διότι από τη μόνιμη και όχι από την ευκαιριακή υγρασία διαλυτοποιούνται ορισμένα δυσδιάλυτα ιχνοστοιχεία στο έδαφος που δίνουν εκλεκτά χαρακτηριστικά ποιότητας στο κρασί. Αυτό άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι σε μερικά μέρη της Γαλλίας, όπου παράγονται εκλεκτά κρασιά, απαγορεύεται δια νόμου η άρδευση των αμπελώνων.

Αλλά και στη χώρα μας για την παραγωγή οίνων ποιότητας υπάρχουν νομοθετικοί περιορισμοί, μεταξύ των οποίων η ποσότητα παραγωγής σταφυλιών ανά καλλιεργούμενη έκταση που συνεπάγεται, έμμεσα, τον περιορισμό των αρδεύσεων. Π.χ. για την παραγωγή οίνου ΠΟΠ Μαντινεία, πρέπει, μεταξύ των άλλων περιορισμών, η απόδοση νωπών σταφυλιών ανά δέκα στρέμματα να μην υπερβαίνει τα 11000 κιλά.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2014, στο Νέο Κόσμο το 83% των καλλιεργούμενων κρασοστάφυλων είναι αρδευόμενα ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 10%.

Γενικά, όταν υπάρχει υπερεπάρκεια εδαφικού νερού στο αμπέλι, η ζωηρότητα της βλάστησης αυξάνει, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για την ωρίμανση της παραγωγής εξαιτίας του ανταγωνισμού για τα προϊόντα φωτοσύνθεσης αλλά και της κακής διευθέτησης του φυλλώματος που οδηγεί σε μείωση της ωφέλιμης φυλλικής επιφάνειας και σε αυξημένη σκίαση στο περιβάλλον των σταφυλιών. Επίσης, τα επιτραπέζια σταφύλια μαυρίζουν και μαραίνονται εύκολα. Απεναντίας, **σε συνθήκες σημαντικής έλλειψης νερού**, η φυλλική επιφάνεια περιορίζεται σημαντικά, η παραγωγή μειώνεται (την ίδια αλλά και την επόμενη χρονιά), παρεμποδίζεται η ομαλή ωρίμανση των σταφυλιών αλλά και των βλαστικών οργάνων λόγω της επιβράδυνσης του μεταβολισμού και οι ρώγες γίνονται μικρές και χοντρόφλοιες.

Το αμπέλι συνήθως διψάει όταν τα κάτω φύλλα των βλαστών, κατά μήκος της γραμμής, αρχίζουν να κιτρινίζουν. Βέβαια οι καλλιεργητές έχουν πολλές φορές δικά τους κριτήρια τα

οποία έχουν αποκτήσει από την μακρόχρονη ενασχόλησή τους.

Όσον αφορά τη συχνότητα άρδευσης, αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από τη μηχανική σύσταση του εδάφους, την παροχή νερού του αρδευτικού συστήματος, το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, το εάν πρόκειται για επιτραπέζια ή οινοποιήσιμη ποικιλία κ.λπ. Αμπελώνες σε βαθιά γόνιμα εδάφη μπορούν να συμπεριφέρονται καλά και με λιγότερα ποτίσματα σχετικά με αμπελώνες σε αμμουδερά εδάφη. Γενικά, τα ποτίσματα θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του αμπελώνα. Η υπερβολική υγρασία του εδάφους μπορεί να συντελέσει στη διήθηση των θρεπτικών στοιχείων και η υπερβολική χρήση νερού είναι σπάταλη.

Το αμπέλι κατά κανόνα προσλαμβάνει σχεδόν το 100% του αναγκαίου νερού από τα επιφανειακά 0-60 cm του εδάφους, συνεπώς κατά την άρδευση δεν πρέπει να εφοδιάζεται το αμπέλι με νερό σε μεγαλύτερο βάθος από 90 cm αφού το βάθος του ενεργού του ριζοστρώματος φτάνει συνήθως τα 60-80 cm.

Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, η κάλυψη των υδατικών αναγκών και η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι τα δυο καίρια σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί σημασία κατά τα πρώτα χρόνια **εγκατάστασης των φυτών αμπελού**. Το πότισμα των νεαρών φυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σύσταση του εδάφους και το ύψος των βροχοπτώσεων της συγκεκριμένης περιοχής. Τα νεαρά φυτά πρέπει να έχουν αρκετό νερό για την ανάπτυξή τους. Πρέπει όμως να μη γίνεται υπερβολικό πότισμα των νεαρών φυτών γιατί το ριζικό σύστημα δεν πηγαίνει βαθιά αλλά αναπτύσσεται ρηχά και έτσι και τα φυτά δε στερεώνονται καλά στο έδαφος και επιπλέον κινδυνεύουν να ξεραθούν σε περιόδους ξηρασίας.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει λαμβάνεται μέριμνα, ώστε το αμπέλι, προπαντός όταν προορίζεται για παραγωγή κρασιού, να μη “φτάνει στην ανάγκη” να χρειάζεται πότισμα πάνω στην ωρίμανση. Οι φροντίδες αυτές που μπορούν να “προλάβουν” το δίψασμα του αμπελιού είναι οι παρακάτω:

- Σε ξηρές περιοχές τα πρέμνα πρέπει να φυτεύονται σε μεγάλες αποστάσεις αναμεταξύ τους και σε χαμηλόκορμα σχήματα. Τα υψηλόκορμα σχήματα προτιμώνται κυρίως σε επιτραπέζιες ποικιλίες και έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε εδαφική υγρασία.

- Επιλογή κατάλληλου υποκειμένου και ποικιλίας. Τα πιο ανθεκτικά σήμερα στην ξηρασία

υποκείμενα είναι το Paulsen 1103, το 140 Ruggeri και το Richter 110. Ισχύει βέβαια αυτό που είπαμε ενωρίτερα, ότι τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης του αμπελώνα τα φυτά δεν πρέπει να δέχονται μεγάλες ποσότητες νερού, ώστε το ριζικό σύστημα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου υποκειμένου να αναπτύσσεται βαθιά. Ανθεκτικές στην ξηρασία ποικιλίες είναι το Λημνιό, το Σαββατιανό, το Carignan κ.λπ.

-Επιλογή περιοχών βορινών, με μικρότερη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

-Προσθήκη κοπριάς στο έδαφος (ανά 3 χρόνια περίπου). Η κοπριά αυξάνει την υδατοχωρητικότητα του εδάφους.

-Εφαρμογή αυστηρού κλαδέματος στα πρέμνα και αν υπάρξει ανάγκη αραίωμα φορτίου.

- Ελαφρύ κορυφολόγημα των βλαστών κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.

-Πρέπει να γίνεται μία διευθέτηση του ανάγλυφου στα επικλινή εδάφη, σε τρόπο ώστε να περιορίζεται η επιφανειακή απορροή και η διάβρωση του εδάφους και το νερό να εισέρχεται στο βάθος του ριζοστρώματος (κοίτα παρακάτω εικ.). Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σε αυτά τα εδάφη πρέπει να διατηρούνται τα ζιζάνια στο έδαφος κατά την περίοδο των βροχών.



Αμπελώνας σε επικλινές έδαφος

- Επιλογή εδαφών για εγκατάσταση αμπελώνα που συγκρατούν το νερό. Τέτοια εδάφη είναι τα σχιστολιθικά.
- Κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους με οποιοδήποτε μέσο ελαττώνει την εξατμισοδιαπνοή του εδάφους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στη Γαλλία μερικοί παραγωγοί καλύπτουν το έδαφος του αμπελώνα με πέτρες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται και η βλάστηση των ζιζανίων, που και αυτά κάνουν τα φυτά της αμπέλου να διψάσουν.



Αμπελώνας καλυμμένος με πέτρες έτσι ώστε να αποτρέπεται και η βλάστηση των ζιζανίων και η εξάτμιση της εδαφικής υγρασίας.

- Ταχεία απομάκρυνση των ζιζανίων κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.

Σήμερα έχει επικρατήσει η μέθοδος της **στάγδην άρδευσης** που βασίζεται στην αρχή της συχνότερης παροχής νερού σε περιορισμένο όγκο εδάφους. Τα πολλά πλεονεκτήματα της στάγδην άρδευσης συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της μεθόδου, με πολλές παραλλαγές ως προς τον εξοπλισμό και τις επιμέρους λειτουργίες. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων περιλαμβάνονται οικονομία νερού άρδευσης με τη μείωση των απωλειών από την εξάτμιση, ομοιόμορφη κατανομή νερού κατά μήκος της γραμμής φύτευσης, καλύτερη διήθηση του νερού στο έδαφος, αποφυγή ύγρανσης του φυλλώματος άρα και περιορισμός των μυκητολογικών ασθενειών, διευκόλυνση της κυκλοφορίας μεταξύ των γραμμών φύτευσης, μείωση των εργατικών λόγω της αυτοματοποίησης του συστήματος, δυνατότητα

άρδευσης μεγάλων εκτάσεων λόγω της χαμηλής πίεσης λειτουργίας των σταλακτήρων, δυνατότητα άρδευσης εδαφών με κλίση ή ανώμαλο ανάγλυφο, δυνατότητα οικονομικής άρδευσης χαλικωδών εδαφών που απαιτούν συχνή άρδευση και δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής της υδρολίπανσης. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, φυσικά, να διαβρέχεται όλο το ριζικό σύστημα και όχι ένα μέρος του ριζικού συστήματος.



Πότισμα με στάγδην άρδευση στη επιτραπέζια άσπερμη ποικιλία Crimson στην περιοχή του Κιλκίς.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος εγκατάστασης, το κόστος συντήρησης των σωληνώσεων και απόφραξης των σταλακτήρων και η δυσχέρεια καταπολέμησης των ζιζανίων που αναπτύσσονται επί της γραμμής. Η στάγδην άρδευση είναι η άρδευση που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στις μέρες μας.



Στάγδην άρδευση

Μηχανικός εξοπλισμός


Σήμερα, όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, για την καλύτερη και ευκολότερη εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων με μηχανικά μέσα, η φύτευση του αμπελιού γίνεται σε γραμμική διάταξη. Απαραίτητα μηχανήματα για την αμπελοκαλλιέργεια, είναι οι ελκυστήρες μεγάλης ισχύος για την προετοιμασία του χωραφίου (βαθύ όργωμα, ισοπέδωση, αφαίρεση ή θρυμματισμός λίθων), οι αμπελουργικοί ελκυστήρες μεσαίας και μικρής ισχύος για τις καλλιεργητικές φροντίδες, καθώς και τα σχετικά παρελκόμενα τους, όπως είναι ειδικές φρέζες, ψεκαστικά, κλαδευτικά, βλαστοκοπτικά, λιπασματοδιανομείς, κοπροδιανομείς, θειωτήρες, κ.ά. Απαραίτητα θεωρούνται και διάφορα γεωργικά εργαλεία, όπως είναι τσάπες, ψαλίδες, ψεκαστήρες, κ.ά.



Εικόνα 1 Κατά μήκος των γραμμών φύτευσης έχει τοποθετηθεί μαύρο πλαστικό για καταπολέμηση των ζιζανίων και για καλύτερη αποθήκευση της εδαφικής υγρασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΘΡΕΨΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



B: Σταφύλι Cabernet Sauvignon με ξήρανση της ράχης. Παρατηρούμε το χρώμα των μίσχων των σταφυλιών. **D:** Υγιές σταφύλι. Πρόκειται για τη σοβαρότερη μη παρασιτική ασθένεια του αμπελιού. Τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών. Τα αίτια της συγκεκριμένης πάθησης δεν είναι πλήρως διευκρινισμένα. Οι μέχρι στιγμής μελέτες έχουν δείξει ότι η ισορροπία μεταξύ των στοιχείων ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου και αζώτου επηρεάζουν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Γενικά

Η άμπελος, όπως και όλα τα καλλιεργούμενα φυτά, απορροφά τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται από το έδαφος, μειώνοντας σταδιακά τη γονιμότητά του. Οι ετήσιες ανάγκες των πρέμνων σε άζωτο και κάλιο έχουν προσδιοριστεί, κατά μέσο όρο, σε 75 και 83 γραμμάρια ανά πρέμνο από τα οποία απομακρύνονται με τον τρυγητό 30 και 45 γραμ. αντίστοιχα. Οι ανάγκες σε μαγνήσιο και φωσφόρο είναι πολύ μικρότερες (τουλάχιστον πέντε φορές), με αυτές του μαγνησίου να υπερτερούν του φωσφόρου. Η άμπελος, συγκρινόμενη με άλλα καλλιεργούμενα φυτά, είναι περισσότερο απαιτητική σε κάλιο και μαγνήσιο. Γενικά, οι ανάγκες της αμπέλου σε θρεπτικά στοιχεία διαφοροποιούνται σημαντικά επηρεαζόμενες κυρίως από τους εξής παράγοντες:

α) Κλίμα. Η θερμοκρασία και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας επηρεάζουν τη βλάστηση και το φορτίο και κατά συνέπεια την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα πρέμνα. Όσο πιο έντονη είναι η βλαστική και αναπαραγωγική δραστηριότητα των πρέμνων, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις τους σε θρεπτικά στοιχεία.

β) Έδαφος. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των ριζών και της βλάστησης, επιδρώντας έτσι στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

γ) Συνδυασμός υποκειμένου και ποικιλίας. Τα υποκείμενα και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Υποκείμενα και ποικιλίες με αυξημένη ζωρότητα απορροφούν μεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.

δ) Καλλιέργεια. Η πυκνότητα φύτευσης των πρέμνων, το σύστημα μόρφωσης και το κλάδεμα καρποφορίας, διαμορφώνουν σημαντικά το φορτίο, επηρεάζοντας τις απαιτήσεις μιας ποικιλίας σε θρεπτικά στοιχεία.

Επίσης σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων απομακρύνονται από το έδαφος με έκπλυση. Η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων εξαρτάται από το ύψος των βροχοπτώσεων, την τοποθεσία και τη σύσταση του εδάφους. Η χαμηλή διαθεσιμότητα έστω και ενός θρεπτικού στοιχείου στο έδαφος μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα παραγωγής σε μια καλλιεργητική περίοδο και ταυτόχρονα να επιδράσει

αρνητικά και στην παραγωγή της επόμενης περιόδου. Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος του αμπελώνα σε επιθυμητά επίπεδα, πρέπει να αναπληρώνονται οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται.

Οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται από το έδαφος με την παραγωγή των σταφυλιών δίνονται στον παρακάτω πίνακα, αλλά είναι μόνο ενδεικτικές των πραγματικών αναγκών λίπανσης του αμπελιού.

Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα σταφύλια

Απόδοση (τον./στρεμ.)	Κιλά ανά στρέμμα/έτος				
	Άζωτο	Φωσφόρος	Κάλιο	Μαγνήσιο	Ασβέστιο
0,7-2,5	2,2-8,4	0,5-3,5	4,1-14,8	0,6-2,5	2,8-20,4

Ιδιαίτερη ευαισθησία παρουσιάζει το αμπέλι στην έλλειψη μαγνησίου, καθώς και στις τροφοπενίες των μικροθρεπτικών στοιχείων σιδήρου, βορίου και ψευδαργύρου. Οι λιπαντικές απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από την απομάκρυνση θρεπτικών στοιχείων από τα σταφύλια, διότι περιλαμβάνουν τις ανάγκες θρέψης του πρέμνου καθώς και τις αναπόφευκτες απώλειες. Οι προτεινόμενες τιμές επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος αμπελώνα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Προτεινόμενες τιμές επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος αμπελώνα		
Θρεπτικό στοιχείο	Συγκέντρωση στο έδαφος (ppm)	
	Έλλειψη	Επάρκεια
Άζωτο (NO_3^-)	<1	10
Φώσφορος	<20	20-50
Κάλιο	<50	150-250
Ασβέστιο	<500	>500

Μαγνήσιο	<100	100-250
Σίδηρος		>5
Βόριο	<0,5	0,5-1,5
Μαγγάνιο	<1,5	2-4
Ψευδάργυρος	1	1-2
Χαλκός	<0,1	0,5

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα κατάλληλα επίπεδα στα οποία πρέπει να ευρίσκονται τα θρεπτικά στοιχεία, στο μίσχο των φύλλων που ευρίσκονται απέναντι από την ταξιανθία, κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

Προτεινόμενες τιμές επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων στο μίσχο των φύλλων απέναντι από την ταξιανθία στη διάρκεια της άνθησης στην άμπελο			
Θρεπτικό στοιχείο		Συγκέντρωση στους μίσχους φύλλων	
		Έλλειψη	Επάρκεια
Άζωτο (NO_3^-)	ppm	<350	>500
Φώσφορος	%	<0,1	0,15-0,3
Κάλιο	%	<1	1,5-2,5
Ασβέστιο	%		1-3
Μαγνήσιο	%	<0,2	0,3-0,5
Σίδηρος	ppm	<30	40-100
Βόριο	ppm	<25	30-50
Μαγγάνιο	ppm	<20	>25
Ψευδάργυρος	ppm	<15	30-60
Χαλκός	ppm		5-15

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι απαιτήσεις το αμπελιού σε λίπανση.

Λιπαντικές απαιτήσεις του Αμπελιού (κιλά/στρέμμα ανά έτος)

Τύπος καλλιέργειας	Άζωτο	Φώσφορος	Κάλιο	Μαγνήσιο
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	15-20	6-10	18-22	6-8
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ	8-15	5-8	12-16	4-6

Η ορθολογική λίπανση, αυτή δηλαδή που διαμορφώνεται με βάση τους παραπάνω παράγοντες, θα διασφαλίσει την ικανοποιητική παραγωγή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους, φύλλων και νερού άρδευσης. Οι αναλύσεις φύλλων δίνουν πολύ καλή εικόνα της θρεπτικής κατάστασης των πρέμνων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ανάλυση πραγματοποιείται στο μίσχο των φύλλων τα οποία βρίσκονται στον ίδιο κόμβο με την ταξιανθία, στη διάρκεια της άνθησης. Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση μπορεί να γίνει και αργότερα, στο έλασμα των φύλλων, κατά την έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών. Η ανάλυση του νερού άρδευσης είναι απαραίτητη σε αρδευόμενους αμπελώνες, για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αύξησης της αλατότητας στο έδαφος, μετά από συχνή χρήση νερού με αυξημένη συγκέντρωση αλάτων, κυρίως νατρίου.

Μορφές λίπανσης

Η προσθήκη των λιπασμάτων στον αμπελώνα γίνεται ως εξής:

α) Βασική λίπανση. Γίνεται πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα και αναφέρεται στην ενσωμάτωση απλών λιπασμάτων φωσφόρου και καλίου στο έδαφος, με βαθύ όργωμα (80εκ.), αν φυσικά απαιτούνται, σύμφωνα με την ανάλυση εδάφους που έχει προηγηθεί. Ταυτόχρονα γίνεται και η εφαρμογή της οργανικής ουσίας. Στη βασική λίπανση δεν προστίθεται άζωτο.

β) Επιφανειακή λίπανση στο έδαφος του αμπελώνα κάθε έτος. Η προσθήκη των λιπασμάτων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πρέμνων σε θρεπτικά στοιχεία και οι οποίες προσδιορίζονται από τις αναλύσεις του εδάφους και των φύλλων.

Σε ξηρικούς αμπελώνες, η επιφανειακή λίπανση μπορεί να γίνει με χύδην εφαρμογή των στερεών λιπασμάτων στην επιφάνεια του αμπελώνα και με ενσωμάτωση αυτών στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους για να διασφαλιστεί η διαλυτοποίησή τους. Στην περίπτωση αρδευομένων αμπελώνων η λίπανση μπορεί να γίνει μέσω του νερού άρδευσης κατά τη διάρκεια του θέρους, σε συνδυασμό με τη χειμερινή εφαρμογή λιπασμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις αποφεύγεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων το χειμώνα.

γ) Διαφυλλική λίπανση η οποία γίνεται μόνο όταν επιδιώκεται η άμεση διόρθωση διαπιστωμένης τροφопενίας, κυρίως σιδήρου και ιχνοστοιχείων.



Διαφυλλική λίπανση στο αμπέλι

Ανάλογα με την ποσότητα που απαιτούνται τα θρεπτικά στοιχεία στο αμπέλι, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Μακροστοιχεία: Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Θείο, Ασβέστιο και Μαγνήσιο, τα οποία απαιτούνται σε μεγάλες ποσότητες.

Μικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία: Μαγγάνιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Βόριο και Μολυβδαίνιο, τα οποία απαιτούνται σε πολύ μικρές ποσότητες.

Ο σίδηρος απαιτείται σε ενδιάμεσες ποσότητες.

Το Αζωτο (N) .

Το άζωτο συμβάλλει όχι μόνο στην καλύτερη ανάπτυξη της βλάστησης και των ριζών αλλά και στην αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας παραγωγής, όταν φυσικά δίδεται σε κανονική δόση. Το αμπέλι απορροφά από το εδαφικό διάλυμα και τις δύο ανόργανες μορφές αζώτου, την αμμωνιακή και τη νιτρική. Μεγάλο ποσοστό του απορροφούμενου αζώτου αφομοιώνεται στις ρίζες. Το ποσοστό αφομοίωσης του αζώτου από τις ρίζες εξαρτάται κυρίως από το υποκείμενο, τη μορφή, την ποσότητα του αζώτου και την εποχή.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στην πρώτη περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης της αμπέλου, δηλαδή της αύξησης των βλαστών και της εμφάνισης των ταξιανθιών, τα πρέμνα χρησιμοποιούν τα δικά τους αποθέματα αζώτου (τα οποία έχουν αποταμιεύσει από την προηγούμενη χρονιά) κινητοποιώντας και απορροφώντας δηλαδή το άζωτο από τις ρίζες και τα μόνιμα μέρη του πρέμνου. Η απορρόφηση του αζώτου από το έδαφος ξεκινά ουσιαστικά λίγο πριν την άνθηση.

Η **έλλειψη αζώτου** στην άμπελο μειώνει την παραγωγή. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της τροφοπενίας αζώτου είναι η χλώρωση των κατώτερων φύλλων, λόγω της μετακίνησης του αζώτου, (σε συνθήκες έλλειψης), από τα παλιά φύλλα στα νεώτερα. Το φύλλωμα γίνεται αρχικά ανοιχτόχρωμο πράσινο, ενώ αργότερα κιτρινοπράσινο, έως κίτρινο. Τα κατώτερα φύλλα εμφανίζουν νεκρώσεις και οι νέοι βλαστοί έχουν μικρή ανάπτυξη. Οι καρποί είτε απουσιάζουν, είτε είναι πολύ μικρού μεγέθους.



Τροφοπενία αζώτου

Η **περίσσεια** αζώτου έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της βλάστησης σε βάρος της καρποφορίας, την πρόκληση ανθόρροιας, την παράταση της βλαστικής περιόδου, τη μη καλή ωρίμανση του ξύλου, την κακή ποιότητα των σταφυλιών, τη μεγαλύτερη ευπάθεια των φυτών στις διάφορες μυκητολογικές ασθένειες και την οψίμιση της παραγωγής. Σε περίπτωση περίσσειας αζώτου, το “περιττό” άζωτο δεν αποθηκεύεται στις ρίζες και στα μόνιμα μέρη του φυτού της αμπέλου.

Φάσεις του κύκλου της αζωτούχου λίπανσης στο αμπέλι

Φάση	Περίοδος του ετήσιου κύκλου	Ειδικά χαρακτηριστικά της πρόσληψης αζώτου
A	Από την έκπτυξη των λανθανόντων οφθαλμών μέχρι την άνθηση	Η αύξηση της νέας βλάστησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αποταμιευμένο άζωτο της προηγούμενης περιόδου
B	B ₁ Από την άνθηση μέχρι την αναστολή της αύξησης των βλαστών	Πρόσληψη του N από τις ρίζες σε ποσότητες που είναι επαρκείς για τις ανάγκες της νέας βλάστησης
	B ₂ Από την αναστολή της αύξησης των βλαστών μέχρι τον περκασμό	Τα φύλλα και οι ταξικαρπίες είναι οι σημαντικότεροι αποδέκτες του N που προσλαμβάνεται
Γ	Από τον περκασμό μέχρι τη συγκομιδή των σταφυλιών	Η πρόσληψη από τις ρίζες μπορεί να μειωθεί. Οι ταξικαρπίες είναι ο κυριότερος αποδέκτης του N το οποίο ανακατανέμεται από τις ρίζες στους βλαστούς και στα φύλλα
Δ	Από τη συγκομιδή μέχρι τη φυλλόπτωση	Ενεργοποίηση της πρόσληψης N από τις ρίζες. Ανακατανομή του N από τους βλαστούς και τα φύλλα στα μόνιμα μέρη του πρέμνου

Ο Φώσφορος (P).

Επιδρά στην ποιότητα γιατί ευνοεί την ανθοφορία και την ωρίμανση των σταφυλιών. Συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει τη στερεότητα των κληματίδων και τις ωριμάζει ταχύτερα.

Η **τροφοπενία φωσφόρου** εμφανίζεται αρχικά στα κατώτερα φύλλα και προχωράει σταδιακά προς τα ανώτερα. Τα φύλλα αποκτούν έντονο σκούρο πράσινο χρώμα ενώ αργότερα εμφανίζονται ερυθροί, πορφυροί ή και μωβ μεταχρωματισμοί στην κάτω επιφάνεια των φύλλων ή ακόμα και στους μίσχους. Η εικόνα του φυτού είναι καχεκτική ενώ η βλάστηση είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης παρατηρείται μείωση της καρπόδεσης και της παραγωγής. Γενικά έλλειψη φωσφόρου δεν παρατηρείται συχνά στην άμπελο και εάν παρατηρηθεί παρατηρείται κυρίως σε όξινα και αλκαλικά εδάφη. Σε αυτό συμβάλλει σημαντικά η προσθήκη φωσφόρου στη βασική λίπανση κατά την εγκατάσταση του αμπελώνα.



Τροφοπενία φωσφόρου

Το Κάλιο (K).

Το κάλιο παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της σπαργής των κυττάρων και κατά συνέπεια στη δομή του φυτού και στην ωρίμανση των σταφυλιών. Η μεγαλύτερη ποσότητα καλίου απορροφάται από το έδαφος στο χρονικό διάστημα από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των σταφυλιών και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού συγκεντρώνεται στις ρώγες των σταφυλιών.

Το κάλιο βελτιώνει την ποιότητα των σταφυλιών, τα οποία ωριμάζουν νωρίτερα και

αποκτούν περισσότερα σάκχαρα και καλό χρώμα. Επίσης ευνοεί την καλύτερη ωρίμανση των κληματίδων και αυξάνει την αντοχή τους στην ξηρασία, στο ψύχος και στους παγετούς της άνοιξης.



Τροφοπενία καλίου

Η **έλλειψη** καλίου έχει ως αποτέλεσμα μείωση της συγκέντρωσης των σακχάρων στις ρώγες, καθυστέρηση στην ωρίμανση των σταφυλιών, μικροκαρπία και ανισορραγία, μείωση της παραγωγής και της γονιμότητας των λανθανόντων οφθαλμών καθώς και πρόωρη ωρίμανση του ξύλου. Οι ρώγες πέφτουν ή παραμένουν μικρές χωρίς σπέρματα, ή παρουσιάζουν φελλοποίηση ενός τμήματος της σάρκας τους, ρωγμές, βυθισμένα τμήματα και ανομοιόμορφη ωρίμανση.

Στα φύλλα εμφανίζεται περιφερειακή και μεσονεύρια χλώρωση η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις εξελίσσεται σε νέκρωση της περιφέρειάς τους. Επίσης, χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η συστροφή της περιφέρειας των φύλλων προς τα κάτω. Σε περίπτωση έλλειψης καλίου, οι κληματίδες έχουν μικρά μεσογονάτια διαστήματα, τα ακραία μάτια νεκρώνονται και εκπτύσσονται τα πλάγια, δίνοντας μικρούς παραμορφωμένους βλαστούς.

Το ασβέστιο (Ca)


Είναι απαραίτητο σε μεγάλες ποσότητες κατά την κυτταρική διαίρεση.

Έλλειψη ασβεστίου παρατηρείται συνήθως σε όξινα εδάφη. Η τροφοπενία ασβεστίου εμφανίζεται στα ανώτερα και νεώτερα φύλλα. Συνήθως συνοδεύεται με νέκρωση των οφθαλμών της κορυφής, παραμόρφωση και κάμψη των φύλλων. Τα φύλλα αρχικά εμφανίζουν χλώρωση και κατόπιν νέκρωση στην κορυφή ή στις πλευρές του ελάσματος.


Βόριο (B)

Το βόριο **συμμετέχει** στην αύξηση του γυρεοσωλήνα, στην ανάπτυξη των ανθέων και των καρπών και στη μεταφορά των σακχάρων στα κύτταρα. Σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι φυτοτοξικό (κοίτα παρακάτω εικόνες).

Η έλλειψη βορίου εμφανίζεται στα νεώτερα φύλλα με χλώρωση, παραμόρφωση και ασύμμετρη ανάπτυξη αυτών. Στους βλαστούς εμφανίζεται βραχυγονάτωση, μειωμένη ανάπτυξη και έκπτυξη ταχυφυών. Στις ανθοταξίες παρατηρείται μειωμένη καρπόδεση ενώ τα σταφύλια παρουσιάζουν ανισορραγία και αραιορραγία.



Έλλειψη βορίου στην ποικιλία Thompson seedless



Τοξικότητα βορίου

Ψευδάργυρος (Zn)

Συμμετέχει στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και σε άλλες λειτουργίες του φυτού. Σε περίπτωση έλλειψής του η καρποφορία είναι μικρή και τα σταφύλια γίνονται αραιά και παραμορφωμένα.

Μαγγάνιο (Mn)

Στο φυτό δεν κινείται εύκολα και επομένως τα πρώτα συμπτώματα της έλλειψης του στοιχείου αυτού εμφανίζονται στα παλιά φύλλα. Σε περίπτωση έλλειψής του εμφανίζονται χλωρωτικές κηλίδες κυρίως στα παλιά φύλλα σε αντίθεση με παρόμοια συμπτώματα που οφείλονται σε έλλειψη ψευδαργύρου και εμφανίζονται στα νεαρά φύλλα.

Η Τροφοπενία Μαγγανίου εμφανίζεται στα ανώτερα και νεώτερα φύλλα, χωρίς να συνοδεύεται, συνήθως, με νέκρωση των οφθαλμών της κορυφής. Τα νεαρά φύλλα αρχικά εμφανίζουν μικρή μεσονεύρια χλώρωση, που δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Αργότερα εμφανίζονται νεκρωτικές κηλίδες στους ιστούς που έχουν επηρεαστεί, ενώ τα νεύρα αποκτούν καστανή απόχρωση.



Έλλειψη μαγγανίου

Σίδηρος (Fe)

Είναι απαραίτητος για την ομαλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και τη σύνθεση της χλωροφύλλης. Σε περίπτωση έλλειψής του τα ανώτερα και νεώτερα φύλλα παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό πράσινο δίκτυο νεύρων ενώ το έλασμα σταδιακά αποκτά όλο και πιο ανοιχτό πράσινο χρώμα. Αργότερα εμφανίζεται αποχρωματισμός σε όλο το έλασμα και

σπανιότερα νέκρωση στην κορυφή και στην περιφέρεια.



Τροφοπενία σιδήρου

Μαγνήσιο (Mg)

Τα συμπτώματα έλλειψης μαγνησίου εμφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα με περιφερειακή και μεσονεύρια χλώρωση του ελάσματος στις λευκές ποικιλίες, ενώ στις έγχρωμες οι χλωρωτικοί ιστοί είναι κοκκινωποί. Σπάνια τα φύλλα νεκρώνονται, αλλά συχνά το σύνολο των φύλλων του φυτού μπορούν να αποχρωματιστούν. Στο αμπέλι είναι συχνή η περίπτωση ανταγωνισμού στην πρόσληψη του μαγνησίου από το κάλιο, ιδίως σε εδάφη φτωχά σε μαγνήσιο. Η προσθήκη στο έδαφος μεγάλης ποσότητας καλίου είναι δυνατόν να προκαλέσει τροφοπενία μαγνησίου.



Τροφοπενία μαγνησίου στο αμπέλι

Άλλα, μη παρασιτικής φύσεως προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στο αμπέλι, είναι:

Τοξικότητα από χλωριούχα άλατα

Σε αμπελώνες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή σε εκείνους που αρδεύονται με αλατούχο νερό μπορεί να εμφανιστεί περιφερειακή νέκρωση του ελάσματος των φύλλων που ακολουθείται από φυλλόπτωση.

Ξήρανση της ράχης

Τα συμπτώματα της μη παρασιτικής αυτής πάθησης εμφανίζονται κατά την έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών και η έκταση που παίρνουν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αρχικά νεκρώνονται ο κύριος ή οι πλάγιοι άξονες της ράχης του τσαμπιού (όπως φαίνεται στην εικόνα στην αρχή του κεφαλαίου) και βαθμιαία η νέκρωση επεκτείνεται, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των χυμών, ξεραίνεται το τμήμα της ράχης, οι ρώγες μαραίνονται και ζαρώνουν. Όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, τα αίτια της συγκεκριμένης πάθησης δεν είναι πλήρως διευκρινισμένα. Οι μέχρι στιγμής μελέτες έχουν δείξει ότι η ισορροπία μεταξύ των στοιχείων ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου και αζώτου επηρεάζουν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ευνοείται όταν μετά από παρατεταμένη ξηρασία ακολουθήσουν μεγάλες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Η μακρόχρονη χρήση καλιούχων λιπασμάτων, η χρήση φρέσκιας κοπριάς και εδάφη ελαφρά και φτωχά σε οργανική ουσία είναι παράγοντες που ευνοούν τη συγκεκριμένη διαταραχή. Αντιμετωπίζεται κυρίως με ορθολογική χρήση λιπασμάτων.

Σχετικά με το χρόνο χορήγησης των αζωτούχων, φωσφοροκαλιούχων και οργανικών λιπασμάτων στο αμπέλι, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

Η αζωτούχος λίπανση πρέπει να γίνεται την άνοιξη. Τα αμμωνιακά λιπάσματα και κυρίως η θειική αμμωνία χορηγούνται ενωρίτερα και καλό είναι να ενσωματώνονται ελαφρώς μέσα στο έδαφος γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο και νερό για να δράσουν. Τα νιτρικά λιπάσματα χορηγούνται μέχρι νωρίς την άνοιξη γιατί ενεργούν πολύ γρηγορότερα.

Το είδος της αζωτούχου λίπανσης εξαρτάται από το pH του εδάφους. Σε ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη προτιμούνται οι μορφές με βάση τη θειϊκή ρίζα. Σε όξινα εδάφη εφαρμόζουμε νιτρικό ασβέστιο.

Το καλιούχο λίπασμα ενσωματώνεται στο έδαφος τον Ιανουάριο στα βαριά εδάφη και το

Φεβρουάριο στα ελαφρά εδάφη.

Ο φώσφορος χορηγείται το φθινόπωρο.

Για την οργανική λίπανση χρησιμοποιείται κοπριά, κομπόστ, τύρφη και άλλα οργανικά σκευάσματα που υπάρχουν στο εμπόριο τα οποία καλό είναι να χορηγούνται στο τέλος του φθινοπώρου πριν την είσοδο του χειμώνα.

Σχετικά με τις συνιστώμενες ποσότητες των λιπαντικών στοιχείων πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

1. Επιτραπέζιες ποικιλίες

1.α) Αρδευόμενοι αμπελώνες

Άζωτο : μέχρι 15 μονάδες /στρέμμα

Φώσφορος : 5 μονάδες ετησίως ή 15 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

Κάλι : 8 μονάδες ετησίως ή 24 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

1.β) Ξηρικοί αμπελώνες

Άζωτο : μέχρι 8 μονάδες /στρέμμα

Φώσφορος : 4 μονάδες ετησίως ή 12 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

Κάλι : 7 μονάδες ετησίως ή 21 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

2. Οινοποιήσιμες ποικιλίες

2.α) Αρδευόμενοι αμπελώνες

Άζωτο : μέχρι 15 μονάδες /στρέμμα κάθε χρόνο

Φώσφορος : 5 μονάδες ετησίως ή 15 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

Κάλι : 8 μονάδες ετησίως ή 24 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

2.β) Ξηρικοί αμπελώνες

Άζωτο : μέχρι 8 μονάδες /στρέμμα κάθε χρόνο

Φώσφορος : 4 μονάδες ετησίως ή 12 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

Κάλι : 7 μονάδες ετησίως ή 21 μονάδες/στρέμμα κάθε 3 χρόνια

3. Νέοι Αμπελώνες

Κατά την εγκατάσταση νέων αμπελώνων στη βαθιά άροση συνιστώνται:

Φώσφορος : 20 μονάδες/στρέμμα

Κάλι : 40 μονάδες/στρέμμα

Το αμπέλι απορροφά το 75% της συνολικής ποσότητας Αζώτου (N) από την έναρξη της βλάστησης έως και την άνθιση, το 90% της συνολικής ποσότητας Φωσφόρου (P₂O₅) από την έναρξη της βλάστησης έως και την πλήρη άνθιση και το 65 – 70% της συνολικής ποσότητας Καλίου (K₂O) αμέσως μετά την άνθιση και για χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ



Μηχανική συγκομιδή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, μιλώντας για ωρίμανση στα σταφύλια διακρίνουμε:

- τη **βιολογική ωρίμανση**, που λαμβάνει χώρα όταν τα σπέρματα είναι έτοιμα να βλαστήσουν,
- τη **βιομηχανική ωρίμανση**, όταν έχει συντεθεί η μέγιστη ποσότητα σακχάρων στη ρώγα και τέλος,
- την **τεχνολογική ωρίμανση** που ενδιαφέρει, κυρίως, την οινολογία και που θα μπορούσε να περιγραφεί σαν η στιγμή εκείνη που το σταφύλι έχει χημική σύσταση ανάλογη του κρασιού που θέλουμε να φτιάξουμε. Με άλλα λόγια, το ίδιο σταφύλι, εάν θέλουμε να παρασκευάσουμε διαφορετικά είδη κρασιών, όπως γλυκά ή ξηρά, μπορούμε να το τρυγήσουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γιατί η τεχνολογική ωριμότητα είναι διαφορετική κάθε φορά. Οι ποικιλίες σταφυλιού που έχουν περισσότερους από ένα βαθμούς τεχνολογικής ωριμότητας χαρακτηρίζονται ως πολυδύναμες. Τέτοιες είναι το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, το Pinot Noir, η Ντεμπίνα το Ξινόμαυρο κ.ά.

Τα σταφύλια όσο ωριμάζουν αποκτούν χρώμα και γλυκύτητα. Τα σταφύλια είναι μη κλιμακτηριακοί καρποί με χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα. Έτσι, τα σταφύλια δεν ωριμάζουν μετά τη συγκομιδή και γι' αυτό πρέπει να έχουν αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα πριν τη συγκομιδή. Η ώρα της ωρίμανσης και του τρύγου του σταφυλιού έχουν φτάσει όταν οι ρώγες αποκτήσουν το επιθυμητό χρώμα και άρωμα, καθώς και την κατάλληλη αναλογία σακχάρων και οξέων, ανάλογα φυσικά με τον προορισμό τους, εαν δηλαδή προορίζονται για επιτραπέζια κατανάλωση, για κρασί (και τι είδους κρασί), για αποξήρανση κ.λπ. Ο τρύγος είναι η τελευταία φάση της δραστηριότητας της αμπελοκομίας και αφορά το μάζεμα των σταφυλιών. Ο καθορισμός του χρόνου του τρυγητού έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα των σταφυλιών. Τα σταφύλια που είναι έτοιμα για μάζεμα πρέπει να είναι ώριμα και ο βαθμός ωριμότητας βρίσκεται ή εμπειρικά με το μάτι, ή με δοκιμή στη γεύση, ή με χημικές μεθόδους όπως είναι η πυκνομέτρηση (γραδάρισμα), κυρίως όταν πρόκειται για σταφύλια που προορίζονται για παραγωγή κρασιού.

Για την κοπή των τσαμπιών χρησιμοποιούνται ειδικοί σουγιάδες, ψαλίδια ή λεπίδες. Στην

ελληνική ύπαιθρο, ο τρύγος των κρασοστάφυλων, μαζί με το πάτημα των σταφυλιών που τον ακολουθούσε, ήταν μια από τις σημαντικότερες αγροτικές εργασίες και γινόταν αφορμή για γιορτή, συνοδευόμενος από τα ανάλογα έθιμα.

Τον Αύγουστο τον χαίρεται ο...που `χει να τρυγήσει

Κρασοστάφυλα

Από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σταφυλιού και του παραγόμενου από αυτό οίνου, άλλους μπορούμε να επηρεάσουμε και άλλους όχι. Η χρονική στιγμή του τρύγου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία, την περιοχή, το φορτίο του αμπελώνα, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου κ.λπ. Ως γνωστόν, δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για την εποχή της συγκομιδής, για όλες τις ποικιλίες σταφυλιού και για όλα τα είδη κρασιού που θέλουμε να φτιάξουμε. Η οινοποίηση είναι τέχνη και επιστήμη μαζί και έχει πολλές παραμέτρους. Κάθε περιοχή, κάθε ποικιλία και κάθε είδος οίνου, έχουν τις δικές τους διαφορετικές απαιτήσεις.

Αν προηγουμένως έχει βρέξει, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν γίνει η συγκομιδή των σταφυλιών. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο ώστε να αναπτυχθούν ξανά στο φλοιό των σταφυλιών οι ζυμομύκητες που είναι απαραίτητοι για την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης. Σε γενικές γραμμές ο τρύγος στην Ελλάδα γίνεται τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Σε ορισμένες ορεινές περιοχές όμως, όπως π.χ. στο Μέτσοβο (που είναι η πιο ορεινή αμπελουργική περιοχή της Ελλάδας δεδομένου ότι εκεί οι αμπελώνες καλλιεργούνται σε υψόμετρο 900-1000 μέτρων και καλλιεργούνται κυρίως οι ξενικές ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Traminer, Syrah, Pinot Noir καθώς επίσης και το Βλάχικο και μερικές ντόπιες ποικιλίες) στην ορεινή Αιγιαλεία (όπου καλλιεργείται κυρίως ένας κλώνος του Ροδίτη, γνωστός ως Ροδίτης Αλεπού) και στην ορεινή Κορινθία (όπου καλλιεργείται κυρίως το Αγιωργίτικο) κ.λπ., ο τρύγος ολοκληρώνεται περί τα μέσα Οκτώβρη. Ο τρύγος δεν πρέπει να γίνεται όταν το σταφύλι είναι άγουρο ή υπερώριμο, διότι χάνονται πολλά αρωματικά συστατικά του σταφυλιού που μεταφέρονται στο κρασί. Ο καθορισμός της ημερομηνίας συγκομιδής των ποικιλιών οινοποιίας γίνεται με βάση την

τεχνολογική ωριμότητα των σταφυλιών η οποία υπολογίζεται κυρίως με τις παρακάτω μεθόδους:

- Εμπειρικά με το μάτι, από το χρώμα της ρώγας και του τσαμπιού, τον όγκο της ρώγας, τη σκληρότητά της, από το πόσο εύκολα αποσπάται ο φλοιός από τη ρώγα και η ρώγα από τον ποδίσκο της.
- Με δοκιμή στη γεύση, που δείχνει κυρίως τη γλυκύτητα (καθώς και την οξύτητα) της ρώγας, τη στυφάδα της, το εαν έχει αποκτήσει το χαρακτηριστικό άρωμα της ποικιλίας και την κατάλληλη τραγανότητα.
- Με χημικές μεθόδους όπως είναι π.χ. με μέτρηση των βαθμών Baume, τα «γράδα» δηλαδή του μούστου, από ρώγες που παίρνονται από διάφορα σημεία του αμπελιού. Η δειγματοληψία αρχίζει από την περίοδο αλλαγής του χρώματος, σε σύγκριση με τα δεδομένα παλαιότερων ετών για την ίδια περιοχή και σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι, όταν οι μετρήσεις δείχνουν τους βαθμούς Baume που επιθυμούμε, τότε πρέπει να γίνει ο τρύγος. Τότε το σταφύλι μπορεί να δώσει το μέγιστο των αρωμάτων του. Δεν πρέπει να τρυγάμε τα λευκά σταφύλια πριν πιάσουν τους 12 – 12,5 βαθμούς Baume και τα μαύρα τους 13 – 13,5 βαθμούς Baume.

Ο πρόωρος τρύγος θα μας δώσει οίνους “λεπτούς” με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη, ενώ ο όψιμος τρύγος θα μας δώσει οίνους με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και με χαμηλή οξύτητα. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και ενωρίτερα, οι διάφορες ποικιλίες σταφυλιών και οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν την ημερομηνία συγκομιδής.

Κατά τη συγκομιδή πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην τραυματίζονται τα σταφύλια γιατί έτσι δημιουργούνται “πληγές” που αποτελούν εισόδους παθογόνων τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά την τελική ποιότητα του κρασιού. Η συγκομιδή καλό είναι να γίνεται μόνο πρωινές ώρες και να σταματά τις μεσημβρινές ώρες επειδή επιταχύνεται η φθορά των σταφυλιών αν συγκομιστούν όταν έχουν υψηλή θερμοκρασία. Η μεταφορά των σταφυλιών πρέπει να γίνεται με σκεύη από υλικά που έχουν αρκετές τρύπες για αερισμό. Πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή για να αποφεύγονται όσο το δυνατόν οι τραυματισμοί και το σπάσιμο της ρώγας μέσα στα δοχεία μεταφοράς, επειδή δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αρχίσει η οξείδωση του μούστου που οδηγεί σιγά-σιγά στο ξύνισμά του.

Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην ωρίμανση των σταφυλιών, θα πρέπει να δοθεί σημασία στην προφύλαξή τους από εχθρούς και ασθένειες, καθώς και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί οι ουσίες αυτές μπορεί να περάσουν στο κρασί. Επιβάλλεται αυστηρά η τήρηση του χρονικού ορίου, εάν αναγράφεται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος, κατά την τελευταία εφαρμογή πριν γίνει η συγκομιδή.



Συγκομιδή των σταφυλιών με το χέρι.

Η μειωμένη εύρεση εργατικών χεριών και τα υψηλά κόστη οδήγησαν στη μηχανική συγκομιδή των κρασοστάφυλων, όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες. Αυτό προϋποθέτει βέβαια τα πρέμνα να είναι διαμορφωμένα σε γραμμικό σχήμα, οι γραμμές να είναι ευθείες, ο αμπελώνας να είναι σε επίπεδη έκταση και φυσικά συμφέρει εφόσον ο αμπελώνας είναι μεγάλης έκτασης. Οι περισσότερες μηχανές “ταρακουνούν” τη σειρά των πρέμνων και τα σταφύλια ή και οι ρώγες πέφτουν πάνω σε μάντες μεταφοράς.

Επιτραπέζια

Τα επιτραπέζια σταφύλια, σε αντίθεση με τα κρασοστάφυλα και τη σταφίδα, δε συγκομίζονται μονομιάς σε έναν αμπελώνα. Ανάλογα με την πορεία ωρίμανσης, εφαρμόζονται δύο ή περισσότερα "χέρια" ώστε να συγκομίζονται μόνο οι ώριμοι καρποί. Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλή. Σταφύλια με χαμηλή θερμοκρασία σημαίνει λιγότερη "ταλαιπωρία" και λιγότερη σπατάλη ενέργειας που απαιτείται για την πρόψυξή τους.

Η συγκομιδή των σταφυλιών πρέπει να αποφεύγεται όταν οι καρποί είναι υγροί από πρωινή δροσιά ή από βροχή. Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή μωλωπισμού της ρώγας και οι εργάτες καλό είναι να φορούν κατάλληλα γάντια. Επίσης, τα εργαλεία κοπής πρέπει να είναι καλά ακονισμένα ώστε να μη "μασάνε". Επιπλέον, καλό είναι τα εργαλεία να απολυμαίνονται πριν χρησιμοποιηθούν στο επόμενο φυτό για να μη μεταδοθούν τυχόν ασθένειες.

Τα κιβώτια συλλογής πρέπει να είναι να είναι ρηχά και να έχουν τρύπες ώστε να αερίζονται τα σταφύλια.



Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να χειρίζονται με πολύ μεγάλη προσοχή.

Τα σταφύλια, μετά τη συγκομιδή, πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό μέρος ώστε να προστατεύονται από την άμεση επίδραση του ήλιου και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στα σταφύλια είναι απώλεια νερού, που εκδηλώνεται με την ξήρανση των βοστρύχων και μίσχων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση των ρωγών και συνεπώς τη μείωση της αγοραστικής αξίας των σταφυλιών. Επίσης οι βόστρυχοι χάνουν το πράσινο χρώμα και αποκτούν καφέ απόχρωση, ενώ οι ρώγες συρρικνώνονται και στην επιδερμίδα τους εμφανίζονται πτυχές.

Επεξεργασία στο συσκευαστήριο:

Τα σταφύλια πρέπει να παραλαμβάνονται από την ύπαιθρο άμεσα και χωρίς χρονοτριβές και να προωθούνται στα συσκευαστήρια, ώστε να αποφεύγεται η πολύωρη έκθεσή τους στις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής.

Στο συσκευαστήριο γίνεται η διαλογή των σταφυλιών, η οποία είναι μια από τις σπουδαιότερες εργασίες. Κατά τη διαλογή αφαιρούνται κυρίως οι μειονεκτικές ρώγες ή και οι κακοσχηματισμένοι βόστρυχοι.

Στη συνέχεια τα σταφύλια συσκευάζονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Οι τρόποι και τα υλικά συσκευασίας ποικίλουν διεθνώς, ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Γενικά, χρησιμοποιούνται ξύλινα ή χάρτινα κιβώτια των 5 ως 10 κιλών. Κατά τη συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθούν προστατευτικά “χαρτιά” τα οποία είναι εμποτισμένα με συντηρητικά και τα οποία έχουν την ικανότητα να εκλύουν διοξείδιο του θείου προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τα συσκευασμένα σταφύλια από προσβολές του Βοτρύτη.

Η ενεργή ουσία σε αυτά τα “χαρτιά” είναι μεταδιθειώδες νάτριο (sodium metabisulfite).



Συσκευασμένα σταφύλια σε χάρτινο κιβώτιο

Η εφαρμογή του διοξειδίου του θείου για την προστασία των σταφυλιών από προσβολές μυκήτων, κυρίως του Βοτρύτη, είναι μια διεθνής πρακτική που χρησιμοποιείται για την καλή διατήρηση της ποιότητάς τους. Λόγω της τοξικότητας του διοξειδίου του θείου, έχει διεθνώς καθιερωθεί ένα ελάχιστο επιτρεπτό όριο στα επιτραπέζια σταφύλια. Επίσης, λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού των συσκευαστηρίων.



Κάλυψη των σταφυλιών με "χαρτί" (με την εμπορική ονομασία unasys) που εκλύει διοξείδιο του θείου.

Αποθήκευση – συντήρηση των επιτραπέζιων σταφυλιών:

Τα σταφύλια που προορίζονται για αποθήκευση, υπόκεινται σε ταχεία πρόψυξη και εφαρμογή ατμών διοξειδίου του θείου. Η ανάγκη για πρόψυξη των επιτραπέζιων σταφυλιών καθίστανται επιτακτική για τρεις κυρίως λόγους:

- α) Ελαχιστοποιείται η απώλεια νερού από τα σταφύλια.
- β) Μειώνεται η προσβολή από διάφορα παθογόνα (μύκητες, κυρίως Βοτρύτη).
- γ) Μειώνεται ο ρυθμός αναπνοής των σταφυλιών και συνεπώς και ο μεταβολισμός τους.

Η θερμοκρασία συντήρησης κυμαίνεται μεταξύ -1°C και -0.5°C . Ευαίσθητα σημεία του σταφυλιού για πιθανή ζημιά από θερμοκρασίες κάτω του -1°C είναι οι ποδίσκοι, οι βόστρυχοι και οι ανώριμες ρώγες.

Οι ώριμες ρώγες αντέχουν θερμοκρασίες μέχρι -2°C . Για τους παραπάνω λόγους, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται σταθερή χωρίς αποκλίσεις. Επίσης, ο σωστός έλεγχος της θερμοκρασίας και η απουσία αποκλίσεων ευνοεί περισσότερο τη διατήρηση της σχετικής υγρασίας των σταφυλιών σε υψηλά επίπεδα.

Η σχετική υγρασία των χώρων συντήρησης των σταφυλιών, πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα του 90 – 95 % .

Η ταχύτητα ροής του ψυχρού αέρα στους χώρους συντήρησης πρέπει να ελέγχεται, για να αποφεύγεται η απώλεια νερού από τα σταφύλια. Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των προσβολών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, συνήθως πραγματοποιούνται περιοδικές εφαρμογές ατμών διοξειδίου του θείου.

Ο χρόνος αποθήκευσης μερικών επιτραπέζιων σταφυλιών, εφόσον εφαρμοστούν όλοι οι κατάλληλοι χειρισμοί, είναι: Cardinal 1 – 2 μήνες, Ribier 2 – 4 μήνες, Emperor 3 – 4 μήνες, Σουλτανίνα 1,5 – 2,5 μήνες.



Τρύγος

Στη χώρα μας, η συγκομιδή των επιτραπέζιων σταφυλιών “πρωτοξεκινά” συνήθως στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου με τη συγκομιδή των ποικιλιών Prime, Superior, Perlette, Ralli και Αττική.

Ακολουθεί συνήθως η περιοχή του Τυρνάβου με τις ποικιλίες Κάρντιναλ και Βικτώρια.

Στην Κόρινθο η συγκομιδή της πρώιμης Σουλτανίνας συνήθως ξεκινά μετά τα μέσα Ιουλίου.

Παρακάτω εικονίζονται τρεις πρώιμες ποικιλίες (Prime, Ralli, Morro) και η πολύ όψιμη ποικιλία Autumn Royal.



Prime. Επιτραπέζιο λευκό σταφύλι. Ποικιλία ισραηλινής καταγωγής, προωθείται ως το πρωιμότερο λευκό σταφύλι. Νοστιμότατο, τραγανό, με πολύ όμορφη ρώγα και τσαμπιά. Ζωηρό φυτό με αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη.



Ralli

Ralli. Επιτραπέζιο σταφύλι με "σπαστό" ρόδινο χρώμα. Τραγανό, με υπόγλυκη δροσερή γεύση. Αν λιπανθεί σωστά έχει τη γεύση κρασιού. Χωρίς κουκούτσι. Ωριμάζει αρχές με μέσα Ιουλίου, αλλά αξίζει να μείνουν τα σταφύλια πάνω στα πρέμνα μερικές μέρες παραπάνω. Γενικά στην Ελλάδα συγκομίζεται από αρχές Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου. Αρκετά ζωνηρό φυτό, με πολύ "όρεξη" στην ανάπτυξη του.



Marroo. Επιτραπέζιο μαύρο σταφύλι, με μεσαίου μεγέθους ρώγες. Ήπια γεύση, ζουμερή και γεμάτη σάρκα. Αυστραλιανή ποικιλία, τρύγος από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο.



Autumn Royal. Επιτραπέζιο μαύρο - μωβ σταφύλι, με μεγάλες μακριές ρώγες. Φλοιός τραγανός, γεμάτη σάρκα με ιδιαίτερη γεύση. Τρύγος από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο. Είναι από τις πιο όψιμες ποικιλίες.

Ποικιλίες σταφιδοποίησης

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι σημαντικότερες ποικιλίες σταφιδάμπελων είναι οι τρεις παρακάτω:


- Η **Σουλτανίνα**, γνωστή και ως Thompson Seedless στην Αμερική, με ρώγα άσπερμη, ωχροκίτρινη,

- Το **Μοσχάτο της Αλεξανδρείας**, γνωστό επίσης ως Gordo Blanco (στην Αυστραλία) ή White Hanepoot (στη Νότια Αφρική), που καλλιεργείται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιείται και ως επιτραπέζια ποικιλία και για την παρασκευή κρασιού και για την παραγωγή σταφίδας. Στη χώρα μας αποξηραίνεται σε ελάχιστες ποσότητες. Καλλιεργείται κυρίως στη Λήμνο, σε ορισμένα νησιά του Ιονίου, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και διάσπαρτα και σε άλλα μέρη.

- Η **Κορινθιακή σταφίδα** με μικρή, μαύρη, άσπερμη ρώγα. Υπάρχουν τρεις υποποικιλίες της Κορινθιακής σταφίδας: η μαύρη, η λευκή και η ερυθρά. Σε μεγαλύτερη όμως έκταση καλλιεργείται η μαύρη Κορινθιακή, η οποία είναι η πιο παραγωγική. Η λευκή απαντάται διάσπαρτα κατά κύριο λόγο στους αμπελώνες της Ζακύνθου. Η κόκκινη, που είναι μικρότερης παραγωγικότητας, σπανίζει αλλά απαντάται στην Κεφαλλονιά.



Σουλτανίνα



Μοσχάτο Αλεξανδρείας



Κορινθιακή σταφίδα



Σταφίδες: από Κορινθιακή (αριστερά), από Σουλτανίνα (δεξιά)



Σταφίδες από Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα μας, σε εμπορική κλίμακα αποξηραίνεται η Κορινθιακή σταφίδα, για μαύρη σταφίδα και ένα μέρος της παραγωγής της Σουλτανίνας, για λευκή σταφίδα. Σε οικογενειακή κλίμακα μπορεί όμως να αποξηραίνονται και άλλες ποικιλίες όπως το Μοσχάτο Αλεξανδρείας (το οποίο είναι τριπλής χρήσης όπως αναφέρθηκε ενωρίτερα), το Φωκιανό κ.ά.

Ο βαθμός ωριμότητας των ποικιλιών των σταφυλιών που προορίζονται για αποξήρανση, δηλαδή για την παραγωγή σταφίδων, επηρεάζει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των παραγομένων σταφίδων.

Οι χαρακτηριστικές ποιότητες των σταφίδων (μέγεθος και χρώμα σταφίδας, υφή του φλοιού και της σάρκας, χημική σύσταση, θερμιδική αξία) επηρεάζονται από το βαθμό ωριμότητας των σταφυλιών κατά την εποχή του τρύγου. Τα κριτήρια συγκομιδής είναι τα εμπειρικά κριτήρια όπως το χρώμα, το άρωμα, η γεύση, η υφή κ.λπ. και τα "μετρήσιμα" που είναι κυρίως τα ολικά διαλυτά στερεά (δηλαδή οι βαθμοί Brix). Τις περισσότερες φορές όμως, η συγκομιδή των ποικιλιών σταφιδοποιίας γίνεται εμπειρικά, χωρίς προσδιορισμό των βαθμών Brix.

Στην Κρήτη συγκεκριμένα, η συλλογή της Σουλτανίνας που προορίζεται για σταφιδοποίηση αρχίζει περί τις 10 Αυγούστου στις πρώιμες περιοχές και αρχές Σεπτεμβρίου στις όψιμες περιοχές. Στη Σουλτανίνα, στην Κρήτη, ο τρύγος πρέπει να γίνεται όταν έχουμε βαθμό ωριμότητας 21-23 βαθμούς Brix, λόγω του ότι τότε έχουμε την καλύτερη ποιότητα και την μεγαλύτερη ποσότητα σταφίδας. Για την ποικιλία Κορινθιακή σταφίδα, αντίστοιχα, τα σταφύλια πρέπει να έχουν βαθμό ωριμότητας μεταξύ 25-27 βαθμών Brix.

Ο χρόνος τρυγητού όμως επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως από τη διάθεση εργατικών χεριών, από τη διαθεσιμότητα των χώρων ξήρανσης και από τις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν η ξήρανση γίνεται έξω στην ύπαιθρο.



Η αποξήρανση γίνεται μέσα σε αλώνια από πιεσμένο χώμα, καλυμμένα με άσπρο χαρτί. Τη νύχτα τα αλώνια σκεπάζονται με σταφιδόπανα.



Σουλτανίνα στο αλώνι για αποξήρανση



Αποξήρανση Κορινθιακής σταφίδας υπό σκιά στην περιοχή της Νεμέας.



Αποξήρανση Κορινθιακής σταφίδας στον ήλιο

Ξήρανση Η ξήρανση της σταφίδας, (όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες) γίνεται σήμερα **στον ήλιο** ή **στη σκιά**:

Η **ξήρανση στον ήλιο** είναι η πιο διαδεδομένη. Γίνεται σε ακάλυπτα χωμάτινα ξηραντήρια (αλώνια) επάνω σε σταφιδόχαρτο, ή σε ξηραντήρια από σκυρόδεμα (τσιμέντο), ή σε τζιβιέρες (σιδερένια ή ξύλινα πλαίσια με συρμάτινη επιφάνεια). Επίσης μπορεί να γίνει σε χαμωτά ξηραντήρια με κάλυψη. Η διάρκεια της ξήρανσης στα ακάλυπτα ξηραντήρια κυμαίνεται από 10-12 ημέρες.

Η **ξήρανση στη σκιά** δίνει σταφίδα ανώτερης ποιότητας και συνίσταται συνήθως στην ανάρτηση των σταφυλιών σε σύρματα, σε μόνιμο ξηραντήριο - στέγαστρο. Παραλλαγή της είναι η ξήρανση που γίνεται υπό τη σκιά του φυλλώματος του πρέμνου. Η ξήρανση στη σκιά διαρκεί περίπου 20 ημέρες και ολοκληρώνεται με μετέπειτα έκθεση στον ήλιο για 2 ημέρες. Μετά την ξήρανση γίνεται το τρίψιμο, η απομάκρυνση δηλαδή των βοστρύχων και στη συνέχεια ακολουθεί το καθάρισμα της σταφίδας από ξερούς μίσχους, σκόνη και ξένες ύλες.


Αποθήκευση Η σταφίδα διατηρείται μέχρι την τελική της επεξεργασία σε αποθήκες. Οι αποθήκες πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών, με ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού και φωτισμού για την αποτροπή αλλοιώσεων. Οι κυριότερες αλλοιώσεις είναι το ζαχάρωμα, το σβόλιασμα, η αλλοίωση του χρώματος και η προσβολή από έντομα και μύκητες. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των σταφίδων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης παίζει η περιεκτικότητά τους σε υγρασία. Η υγρασία που πρέπει να έχουν οι σταφίδες ώστε να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης κυμαίνεται από 13 έως 15%. Στη χώρα μας, κατά την παράδοση από τον παραγωγό στο εργοστάσιο, η εκτίμηση της περιεκτικότητας σε υγρασία γίνεται συνήθως με εμπειρικά κριτήρια.-



Αποξήρανση Κορινθιακής σταφίδας υπό σκιά.



Τη νύχτα τα αλώνια σκεπάζονται με σταφιδόπανα



Μ'αγγαρεία αμπέλι δε γίνεται, τσαϊρι δεν προκόφτει

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έντυπη

Κανελλής Α. 1998. Τεχνολογία μετασυλλεκτικών χειρισμών επιτραπέζιων σταφυλιών. Η αμπελουργία στην Κρήτη: Προβλήματα και προοπτικές. Interreg II.

Κούσουλας Κ. 2002. Αμπελουργία 2η Έκδοση . Εκδοτική Αγροτεχνική & Εμπορική Α.Ε.

Νικολάου Α.Ν 2008. Αμπελουργία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα.

Σουφλερός Ε.Η. 2012 Το ελληνικό απόσταγμα στεμφύλων «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» Αφιέρωμα Γεωργία Κτηνοτροφία Αμπελοκαλλιέργεια και αμπελοοινικά προϊόντα, σελ. 130-133.

Σπινθηροπούλου Χ. 2012 Σχήματα διαμόρφωσης των πρέμνων και κλάδεμα καρποφορίας. Αφιέρωμα Γεωργία Κτηνοτροφία Αμπελοκαλλιέργεια και αμπελοοινικά προϊόντα, σελ.50-55.

Συμινής Χ.Ι. 2012 Η θρέψη της αμπέλου Αφιέρωμα Γεωργία Κτηνοτροφία Αμπελοκαλλιέργεια και αμπελοοινικά προϊόντα, σελ 60-61.

Συμινής Χ.Ι. 2012 Ανόργανη θρέψη και λίπανση της αμπέλου Ανόργανη θρέψη και λίπανση της αμπέλου Αφιέρωμα Γεωργία Κτηνοτροφία Αμπελοκαλλιέργεια και αμπελοοινικά προϊόντα, σελ.62-66.

Ηλεκτρονική

. . (,). Αμπέλι - Βικιπαίδεια () [Online]. Διαθέσιμο σε: <https://el.wikipedia.org/wiki/Αμπέλι> [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Αμπελος: η μυθική συνοδοιπόρος μας - science - Το Βήμα .. () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.tovima.gr/science/article/?aid=624940 [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Δεύτερη στη καλλιέργεια αμπέλου παγκοσμίως η Κίνα () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.kathimerini.gr/.../deyterh-sth-kalliergeia-ampeloy-pagkosmiws-h-k... [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Λίστα με γηγενείς ποικιλίες αμπέλου | newwinesofgreece.com () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_gigeneis.../index.html [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών (για κρασί ή τσίπουρο ... ()) [Online]. Διαθέσιμο σε: www.taralas.gr/grapes/for-wine [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ () [Online]. Διαθέσιμο σε: pikilies.blogspot.com/ [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη ... () [Online]. Διαθέσιμο σε:

www.nagref.gr/journals/dimitra/images/3/dmtr3p8-12.pdf [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 20. . 15].

(,). Σπάνιες ελληνικές ποικιλίες στο ποτήρι - Κρασί ... - Αθηνόραμα () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.athinorama.gr/umami/wine/articles/?id=2004833 [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Με μια παγκόσμια αμπελο-οινική ματιά - Wine Plus () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.wineplus.gr/4/173/624/ [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). 2-4 Οκτωβρίου 2015: Παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς .. () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.ethemis.gr/2-4-oktovriou-2015-pagkosmio-sinedrio-tis-diethnous-.. [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Η παραγωγή, η κατανάλωση και το παγκόσμιο εμπόριο οίνου () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.paseges.gr/.../H-paragwgh-h-katanalwsh-kai-to-pagkosmio-empori. [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου ... () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=86269 [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). BOTANA KAI YGEIA: 04/23/12 () [Online]. Διαθέσιμο σε: botanologia.blogspot.com/2012_04_23_archive.html [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Οίνος Archives - Food Business () [Online]. Διαθέσιμο σε: foodbusiness.gr/tag/οίνος/ [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Σαμπάνια...Ο πιο φημισμένος οίνος του κόσμου. () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.natsioulis.eu/2013/02/blog-post.html [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Η διατροφική αξία του σταφυλιού και των προϊόντων του () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.geoperi.gr/documents/Diatrofikh_aksia_stafyliou_kostarellh.pdf [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Σταφύλια ιδιότητες, θερμίδες και διατροφική αξία - myDiatrofi () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.mydiatrofi.gr/trofi/.../stafylia-idiotites-thermides-kai-diatrofiki-aksi... [Ανακτήθηκε: 8 Σεπτ. 2015].

. . (,). Wine Education Topic: The Effect of Irrigation on Wine Quality () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.aromadictionary.com/.../irrigation_ar.. [Ανακτήθηκε: 9 Οκτ. 2015].

. . (,). To irrigate or not to irrigate in the vineyard? | BKWine ... () [Online]. Διαθέσιμο σε: www.bkwine.com › Blog › News [Ανακτήθηκε: 9 Οκτ. 2015].